



**LABOR
WÜRZBURG MVZ**

Laboratoriumsmedizin. Mikrobiologie.

Allergiediagnostik

Autoantikörper

Blutgruppen

Endokrinologie

Hämatologie

Hämostaseologie

Infektionsserologie

Immunologie

Klinische Chemie

Medikamente

Mikrobiologie

Molekularbiologie

Mutterschaftsvorsorge

Tumormarker

Virologie



LaborGemeinschaft
Franken

UNTERSUCHUNGS- PROGRAMM 2026



Grombühlstr. 12
97080 Würzburg

Tel.: 0931-2090-100 (Zentrale, Fachlabor)
Tel.: 0931-2090-200 (LG Franken)
Fax: 0931-2090-111 (Fachlabor)
Fax: 0931-2090-222 (LG Franken)
EDV Hotline: 0931-2090-406
Logistik, Lager: 0931-2090-371

Weitere LG-Standorte:

Gemündener Str. 15-17
97753 Karlstadt

Tel.: 09353-9859-602
Fax: 09353-9859-599

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Anmerkungen	4
1. Allgemeine Hinweise	4
2. Untersuchungsauftrag und Probenkennzeichnung	4
3. Probenmaterial	6
4. Versand	9
5. Zeitablauf	9
6. Sprechstunden	10
7. Materialannahme	10
8. Abholdienst und Versandmaterial	10
9. Qualitätsmanagement	10
10. Abkürzungen der Analysenmethoden	12
Mikrobiologie	14
I. Allgemeine Vorbemerkungen	15
II. Untersuchungsauftrag	21
III. Untersuchungsmaterialien	24
IV. Multiresistente Keime	64
V. Antibiotogramme	67
VI. Antimykogramm	70
VII. Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz	71
Analysenverzeichnis	72
Index	540

Allgemeine Anmerkungen

1. Allgemeine Hinweise

Das vorliegende Untersuchungsprogramm enthält die derzeit gültigen Angaben zu den benötigten Untersuchungsmaterialien und -mengen sowie Referenzwerte und präanalytische Angaben zu den Untersuchungsmethoden. Der Bereich der Mikrobiologie (Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie) ist in einem separaten Kapitel zusammengefasst.

Im ersten Abschnitt des Leistungsverzeichnisses finden Sie die gewohnte alphabetische Auflistung der einzelnen klinisch-chemischen und serologischen Untersuchungen, im zweiten Abschnitt die Beschreibungen der mikrobiologischen Untersuchungen nach Materialien sortiert. Über Änderungen der Referenzwerte oder die Neueinführung von Untersuchungsmethoden werden Sie wie bisher durch Merkblätter oder Hinweise auf den Befunden informiert.

2. Untersuchungsauftrag und Probenkennzeichnung

Die Identität der eingesandten Proben muss zweifelsfrei sichergestellt sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Patientendaten bzw. der Barcode auf den Probengefäßen vorhanden sind und mit den Angaben auf dem Anforderungsschein (mit Praxisstempel und Unterschrift) übereinstimmen.

Klinische Angaben wie Diagnose, Medikation und Schwangerschaftswoche sind für eine fundierte medizinische Interpretation der Ergebnisse erforderlich.

Wegen der begrenzten Haltbarkeit des Probenmaterials für bestimmte Untersuchungen (z.B. Gerinnung, Blutkulturen) ist die Angabe des Entnahmezeitpunktes erwünscht.

Patientenidentifizierung

Zur Identifizierung stellt das Labor Etiketten mit 8-stelliger Auftragsnummer und einem Barcode zur Verfügung. Die ersten 4 Ziffern kennzeichnen den Einsender/Praxis, die letzten 4 Ziffern identifizieren den Patienten. Die Aufträge eines Patienten werden unter einer Auftragsnummer erfasst (Laborgemeinschaft, Facharztlabor, Mikrobiologie). Die Etiketten eines Etikettensatzes tragen alle die gleiche Auftragsnummer mit Verwendungszweck. Zur korrekten Positionierung der Etiketten ist die Oberkante rot markiert.

Auf den Etikettensatz tragen Sie bitte als erstes Name und Vorname Ihres Patienten in die entsprechende Spalte ein, um absolut sicherzustellen, dass dieser Etikettensatz nur für diesen Patienten verwendet wird. Für die verschiedenen Aufträge (Auftragschein- und Überweisungsschein und ggf. LG-Karte sowie Auftrag-Mikrobiologie) und Probenmaterialien eines Patienten kann ein Etikettensatz verwendet werden, sofern nur eine Abrechnungsart je Labor (LG oder Fachlabor) gewünscht ist (z.B. 10A-Schein in der LG und IGEL-Leistung im Fachlabor). Es sind ausreichend Duplikate der Auftragsnummer vorhanden.

Bei Blutröhrchen zur Blutgruppenbestimmung ist eine Beschriftung mit Name, Vorname und Geburtsdatum zwingend erforderlich. Hierfür ist das Namensetikett vorgesehen.

Bei Materialien, für die kein eigenes Etikett vorgesehen ist (Stuhl, Abstriche, Uriline, Liquor), verwenden Sie bitte ein beliebiges Etikett mit der entsprechenden Arzt-Patienten-Nummer und geben die Art des Untersuchungsmaterials an, falls dies nicht eindeutig erkennbar ist (z.B. bei Serum, Plasma oder Urin). Bei Abstrichen geben Sie bitte die genaue Abnahmestelle mit an.

Übrige Etiketten können auch für Ihr Laborprotokoll verwendet werden, wenn Sie in Ihrer Praxis den Versand an unser Labor protokollieren.

Eine zweite Auftragsnummer wird dann benötigt, wenn für einen Patienten zwei Abrechnungsarten gewünscht sind. Das gilt sowohl in der Laborgemeinschaft (z.B. 10A-Schein und Direktabrechnung – Hausarztmodell), als auch im Fachlabor (z.B. Muster 10 und IGEL-Leistung-privat). Für jede Abrechnungsart wird dann eine eigene Auftragsnummer mit Probenmaterial (Etikett) für diese Auftragsnummer benötigt. Diese Regelung gilt auch für zusätzliche genetische PCR-Untersuchungen. Der einmal benutzte Etikettensatz kann nicht für einen anderen Patienten verwendet werden!

Patientenvorbereitung

Idealerweise erfolgt eine Blutentnahme am ruhenden, nüchternen Probanden morgens gegen 7 bis 8 Uhr. Zumindest sollten Blutentnahmen immer unter denselben Bedingungen durchgeführt werden. Gewisse Parameter verlangen das Einhalten spezieller Diät- und Sammelvorschriften, wie sie im Laborbuch beschrieben sind. Der Patient ist über die korrekte Sammeltechnik genau zu instruieren.

3. Probenmaterial

Bei Entnahme von mehreren Blutproben sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Blutkultur
2. Nativblut (Vollblut, Serum)
3. Citratblut
4. EDTA-Blut bzw. Heparinblut
5. Fluorid-Blut

Für die Anforderung von Blutbild und HbA1c werden separate EDTA-Proben benötigt.

Informationen zur Bakteriologie - Mykologie - Parasitologie: siehe Mikrobiologie

Blut

Für verschiedene Untersuchungen ist ausdrücklich die Verwendung von Vollblut vorgeschrieben z.B. für die Blutgruppenbestimmung.

Serum

Falls nicht ausdrücklich anders vermerkt, sollte zur Vermeidung von Hämolyse kein Blut, sondern Serum eingesendet werden. Nach der Blutentnahme das Blut mischen und ca. 20 - 30 Minuten bei Raumtemperatur senkrecht stehen lassen bis das Blut vollständig geronnen ist, anschließend zentrifugieren und das Serum gewinnen. Bitte Blutröhrchen senkrecht stehen lassen und nicht liegend gerinnen lassen.

Bei Bestimmung von Medikamentenspiegeln sollten nur Abnahmesysteme ohne Trenngel eingesetzt werden (Absorption der Medikamente am Trenngel).

Wird das Serum bereits in der Praxis von Ihnen in ein separates Röhrchen abgetrennt (z. B. nach Abnahme mit einer Monovette ohne Gel oder für bestimmte Untersuchungen wie beispielsweise Medikamentenspiegel), dann senden Sie bitte nur das separierte Serum ein und werfen das Abnahmeröhrchen mit dem Blutkuchen. Der Versand von abgetrenntem Serum und gleichzeitig einer Serummonovette mit Blutkuchen führt ansonsten zu einer falschen Bewertung Ihrer Präanalytik (beide Röhrchen hätten die gleiche Proben-ID-Nummer und unterscheiden sich nicht in der späteren Bearbeitung).

Homocystein-Monovette

Monovette mit Stabilisator für die Homocystein-Bestimmung im Blut.

EDTA-Blut

Blut mit EDTA-Monovette abnehmen und bis zur Markierung füllen. Unmittelbar nach der Blutentnahme das Blut sorgfältig durchmischen (nicht schütteln), um ein Gerinnen der Probe zu verhindern. Die vorgesehene Füllmenge ist unbedingt zu beachten.

Auf keinen Fall darf das EDTA-Blut durch Umfüllen aus einer Serum-Monovette gewonnen werden! Generell sollten für die Analysen die vorgeschriebenen Probenröhrchen verwendet werden. Ein Umfüllen ist nicht erlaubt.

Für PCR- Untersuchungen ist wegen der Kontaminationsgefahr eine separate EDTA- Probe zwingend vorgeschrieben.

Weitere Angaben zur Präanalytik finden Sie unter den jeweiligen Untersuchungen.

Für humangenetische Untersuchungen wird zusätzlich eine Einwilligungserklärung des Patienten benötigt (siehe Gendiagnostik Gesetz).

Thromboexact-Monovette

Bei Verdacht auf eine EDTA-induzierte Thrombozytopenie fordern Sie bitte vorab Thromboexact-Monovetten an.

Citratblut (Gerinnung)

Die Blutentnahme erfolgt vorzugsweise in Citrat-Monovetten. Als Antikoagulans ist 1 Volumenteil Natriumcitratlösung (3,8%ig) für 9 Volumenteile Blut vorgelegt. Blut bis zur Markierung aufziehen und vorsichtig mischen. Die vorgesehene Füllmenge ist unbedingt einzuhalten, um Fehlmessungen zu vermeiden.

Wegen der beschränkten Haltbarkeit des Untersuchungsmaterials und zur Absicherung der Ergebnisse benötigen wir die Angabe des Abnahmezeitpunktes.

Heparinblut

Blut mit Li-Heparin-Monovette abnehmen und bis zur Markierung füllen. Unmittelbar nach der Blutentnahme das Blut sorgfältig durchmischen, um ein Gerinnen der Probe zu verhindern. Die vorgesehene Füllmenge ist unbedingt zu beachten.

Bei Abnahme mit Liquemin: 0,3 ml Heparinat (z.B. Liquemin 2500) vorgeben und 10 ml Blut aufziehen, gut mischen.

Auf keinen Fall darf das Heparinblut durch Umfüllen aus einer Serum-Monovette gewonnen werden!

Plasma (Citrat-, EDTA-, Heparinplasma)

Für bestimmte Untersuchungsparameter wird Plasma benötigt. Zur Plasmagewinnung wird das mit Antikoagulanzen versehene Blut sofort zentrifugiert, der Überstand/Plasma in eine neutrales Röhrchen (ohne Zusätze) pipettiert und tiefgefroren.

Blutzucker

NaF-Monovette sowie NaF-Citrat-Monovette (Glucoexact™) zur Blutzuckerbestimmung sind im Labor erhältlich.

Zur Bestimmung des Blutzuckerwertes in der Schwangerschaft verwenden Sie bitte möglichst Glucoexact-Monovetten (NaFCitrat-Monovetten).

Alternativ werden vom Labor zur Blutzuckerbestimmung Blutzuckerhütchen mit Kapillaren angeboten.

Für eine korrekte Handhabung lassen Sie die Kapillare vollständig (end to end) mit Blut oder frischem Serum volllaufen. Bei

Abnahme mit der Lanzette bitte den ersten austretenden Blutstropfen verwerfen. Dann halten Sie die Kapillare leicht schräg

an die Flüssigkeit und füllen diese end to end, wischen die Kapillare anschließend vorsichtig außen ab und geben sie in das Blutzuckerhütchen.

Wichtig: Jetzt das Hütchen verschließen und kräftig schütteln! Wenn das Blutzuckerhütchen zu wenig geschüttelt wird und

noch Blut in der Kapillare verbleibt, werden zu niedrige Messwerte erhalten.

Bei der Bestimmung von Blutzucker aus einer Serumprobe beachten Sie bitte die eingeschränkte Haltbarkeit von maximal 8 Stunden.

Punktat

Für Punktat bitte sterile Röhrchen ohne Trennhilfen oder sonstige Zusätze verwenden.

Ausnahme: Für die Bestimmung der Zellzahl im Punktat muss das Punktat im EDTA-Röhrchen transportiert werden.

Für alle anderen Untersuchungen im Punktat können die üblichen Gefäße verwendet werden.

Liquor

Zur Vermeidung der Adsorption von Proteinen an die Gefäßwand bitte sterile Polypropylenröhrchen ohne Trennhilfen oder sonstige Zusätze verwenden.

Urin

Urin bitte in sterilen Urinmonovetten einsenden.

Spontan-Urin: Urin in einem Gefäß auffangen und ein Aliquot mit einer Urinmonovette aufnehmen.

24 h-Sammelurin

Das Labor stellt für die Sammelperiode entsprechende Gefäße und die notwendigen Stabilisierungsmittel zur Verfügung.

Wichtige Informationen für den Patienten:

Am ersten Sammeltag den Morgenurin verwerfen. Die Sammelperiode endet mit dem Morgenurin des 2. Tages.

Nach Beendigung der Sammelperiode den Urin gut mischen und ein Aliquot mit einer Urinmonovette (10 ml) aufnehmen und einsenden.

Bitte unbedingt die 24 h-Sammelmenge mit angeben!

4. Versand

Für den Probentransport erhalten Sie vom Labor unterschiedliches Verpackungsmaterial:

Durchsichtige Versandtüten für Einsendungen ins Facharztlabor sowie an die LG-Franken.

Grüne Versandtüten für die Mikrobiologie sowie alle humangenetischen und molekularbiologischen Untersuchungen (PCR).

Rote Versandtüten für Notfalluntersuchungen und besondere Materialien wie Liquor, Vollblut zur Blutgruppenbestimmung,

EDTA-Blut für Kreuzprobe, Nabelschnurblut und EDTA-Blut für den Lymphozytenstatus.

Aufträge in roten Tüten werden

manuell bearbeitet und direkt an die Arbeitsplätze geleitet. Gleichzeitig wird die bevorzugte Befundübermittlung initiiert.

Das Labor hält weiterhin geeignete Entnahmebestecke, Verpackungs- und Versandmaterialien für Sie auf Abruf bereit.

Für verschiedene Untersuchungen (Mikrobiologie, PCR, Spurenanalytik, arbeitsmedizinische Untersuchungen) sind spezielle

Proben- und Versandgefäße erhältlich. Hinweise hierzu finden Sie im

Untersuchungsprogramm unter der jeweiligen

Untersuchungsart.

Sie erhalten die bestellten Utensilien umgehend durch unseren Fahrdienst.

5. Zeitablauf

Das Labor ist bemüht, die Untersuchungen möglichst zeitnah durchzuführen. Die Aufträge werden entsprechend ihres Eintreffens im Labor bearbeitet.

Ein Großteil der Befunde wird den Einsendern noch am gleichen Tag mitgeteilt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle Untersuchungen am Eingangstag fertiggestellt werden können. Die Befundmitteilung erfolgt mittels Datenfernübertragung (DFÜ) und schriftlich. Bei medizinisch auffälligen Ergebnissen bzw. auf Wunsch werden die Ergebnisse auch telefonisch oder per Fax mitgeteilt. Bitte beachten Sie hierbei, dass elektronisch übermittelte Befundberichte ggf. nur als 'vorläufig' angesehen werden können. Verbindlich ist der medizinisch validierte, schriftliche Endbefund.

6. Sprechstunden

Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr und nach Vereinbarung

7. Materialannahme

Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

Samstag 8.00 bis 10.00 Uhr

Abgabe im Laborbriefkasten möglich.

8. Abholdienst und Versandmaterial

Der Fahrdienst garantiert den regelmäßigen und sachgemäßen Transport Ihrer Proben in unsere Praxis.

Zu Ihren Abholzeiten bringt Ihnen der Fahrdienst die Laborbefunde sowie das von Ihnen angeforderte Versandmaterial und übernimmt gleichzeitig Ihr Probenmaterial.

Bereits bei der Abholung werden die unterschiedlichen Verpackungen den Abteilungen zugeordnet und so die rasche Verteilung vorbereitet.

Zur Bestellung von Versandmaterial benutzen Sie bitte unsere Vordrucke oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0931 2090371,

Fax: 0931 2090222.

Ansprechpartner für den Fahrdienst ist Herr Rock (Tel.: 0931 2090370).

9. Qualitätsmanagement

Qualität

Qualitätspolitik des Medizinischen Versorgungszentrums für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Würzburg

Im Medizinischen Versorgungszentrum für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Würzburg GmbH wird humanes Untersuchungsmaterial mittels chemischer, immunologischer, toxikologischer, mikrobiologischer oder molekularbiologischer Untersuchungsmethoden analysiert.

Das Ziel des Labors ist die zuverlässige und termingerechte Bereitstellung von validen Analysenergebnissen, die präzise, nachvollziehbar und mit denen anderer Laboratorien vergleichbar sind.

Die Laborleitung und ihre Vertreter sind für die Sicherstellung der Qualität verantwortlich und verpflichten sich zur Einhaltung der Norm DIN EN ISO 15189:2023, um auf dieser Grundlage eine gesicherte Diagnostik zu gewährleisten. Mit unserem Qualitätsmanagementsystem soll erreicht werden, dass die diagnostischen Möglichkeiten des Labors laufend optimiert werden und der hohe Leistungsstand erhalten bleibt.

Die Labortätigkeiten werden so durchgeführt, dass sie den Anforderungen des Nutzers, den in der Norm 15189:2023, dem Dokument R-15189 und alle sonst anwendbaren gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen entsprechen.

Im Anwendungsbereich der Medizinprodukte-Betreiberverordnung_MPBetreibV sind die Anforderungen der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen als Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Qualität, Sicherheit und Leistung bei der Anwendung der IVDR_Europäischen Verordnung für In-vitro-Diagnostika sowie zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit der damit erzielten Ergebnisse in Deutschland zugrunde zu legen.

Dies gilt für das gesamte Spektrum spezifizierter und dokumentierter Labortätigkeiten, unabhängig davon, wo die Dienstleistung durchgeführt wird (Würzburg, Ochsenfurt, Karlstadt). Das Management der zu beachtenden Anforderungen ist mit dem System zur Steuerung von Nichtkonformitäten gemäß Abschnitt 8.7 der Norm 15189:2023 zu verbinden. Für davon abweichende Vorgehensweisen muss das Labor, im Rahmen der Akkreditierung, die Gleichwertigkeit belegen.

Leitgedanke ist hierbei der Wunsch nach ständiger Verbesserung der Dienstleistungsqualität während aller Arbeitsschritte. Für das Labor stehen Patient und behandelnder Arzt (als unser Auftraggeber) im Mittelpunkt unserer Bemühungen und wir verpflichten uns zu guter fachlicher Praxis und Qualität der Untersuchungen.

Durch flexible Akkreditierung unseres Leistungsspektrums, durch Zuverlässigkeit und Kommunikation wollen wir eine dauerhafte Zufriedenheit bei unseren Einsendern und langfristige Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten, Dienstleistern und sonstigen Partnern aufrechterhalten.

Messunsicherheit

Auskünfte zur Messunsicherheit der quantitativen Prüfverfahren werden auf Anfrage jederzeit erteilt.

Die Messunsicherheit beschreibt summarisch die Streuung von Messergebnissen, die dadurch entsteht, dass bei jedem einzelnen Prozess innerhalb eines Analysenganges gewisse Abweichungen von den "wahren" Werten auftreten.

Die Angaben beziehen sich dabei auf die analytische Präzision und Richtigkeit.

Messunsicherheit in der Mikrobiologie

Die Angabe einer Messunsicherheit in der Mikrobiologie ist insbesondere bei mikroskopischen und kulturellen Verfahren meist nicht möglich. Zudem hängt die diagnostische Qualität des Erregernachweises wesentlich von einer optimalen Präanalytik ab, d.h. einer korrekten Probenentnahme, geeigneten Zwischenlagerung sowie schnellen Verarbeitung der Proben.

Unterauftragsvergabe

Die betroffenen Analysen werden mit einem Kringel (°) versehen und im Bereich der Fußnoten gibt es eine zusätzliche Zeile mit dem Hinweistext "° Fremdleistung".

Externe Qualitätssicherung

Die externe Qualitätssicherung erfolgt durch die **regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen** der folgenden Organisationen:

- Institut für Standardisierung und Dokumentation im Medizinischen Laboratorium e.V. (INSTAND)
- Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB) der Deutschen Vereinten Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin e. V. (DGKL)
- European Society for External Quality Assessment (ESfEQA)

Interne Qualitätssicherung

Die internen Qualitätskontrollen werden nach den Richtlinien der Bundesärztekammer (RiliBÄK) durchgeführt.

Standorte

Die Kennzeichnung hinter den Untersuchungsverfahren zeigt den Standort an, für den die Kompetenz bestätigt wird:

² Analyse gemessen am Standort Karlstadt.

³ Analyse gemessen am Standort Ochsenfurt.

10. Abkürzungen der Analysenmethoden

AAS	Atomabsorptionsspektrometrie
AGG	Agglutination
CAF	Celluloseacetatfolie-Elektrophorese
CLIA	Chemolumineszens-Immunoassay
EIA	Enzymimmunoassay
EIT	Enzymimmuntest

ELISA	Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay
ECLIA	Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay
FEIA	Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay
FPIA	Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay
GC	Gaschromatographie
HA	Hämagglutination
HPLC	High-Performance-Liquid-Chromatography
IFT	Immunfluoreszenz-Test
IHA	Indirekte Hämagglutination
ILMA	Immunoluminometric Assay
IRMA	Immunradiometrischer Assay
ISE	Ionenselektive Elektrode
KIMS	Kinetic Interaction of Microparticles in Solution
KBR	Komplement-Bindungs-Reaktion
LA	Latex-Test
LC	Liquid-Chromatographie
LIA	Lumineszenz-Immuno-Assay
MS	Massenspektrometrie
NT	Neutralisationstest
PAGE	Poly-Acrylamid-Gel-Elektrophorese
PCR	Polymerase-Chain-Reaktion
RIA	Radioimmunoassay
TRACE	Time Resolved Amplified Cryptate Emission
UV	Ultra-Violett-Test
°	Fremdleistung

Eingetragene Warenzeichen sind nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus der Bezeichnung einer Ware mit dem für diese Ware eingetragenen Warenzeichen nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Warename ist. Ebenso wenig ist zu entnehmen, ob Patente oder Gebrauchsmuster vorliegen.

Mikrobiologie

Bakteriologie - Virologie – Parasitologie - Mykologie

I. Allgemeine Vorbemerkungen

- 1.1 Untersuchungsauftragsformular
- 1.2 Probengewinnung
- 1.3 Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung und Transport
- 1.4 Abnahmesysteme

II. Untersuchungsauftrag

- 2.1 Pathogene Keime
- 2.2 Zielaufträge
- 2.3 Hefepilze, Schimmelpilze und Dermatophyten
- 2.4 Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik
- 2.5 Würmer, Wurmeier und Parasiten
- 2.6 Chlamydien und Gonokokken
- 2.7 Mykoplasmen / Ureaplasmen
- 2.8 Bilharziose (Schistosomen)
- 2.9 Hygieneuntersuchungen
- 2.9.3 Mikrobiologische Prüfung von Endoskopen

III. Untersuchungsmaterialien

- 3.1 Blutkulturen
- 3.2 Katheterspitzen
- 3.3 Urin und Uriline
- 3.4 Materialien aus dem Gastrointestinaltrakt (Stuhl, Magenbiopsien)
 - 3.4.1 Bakteriologische Untersuchung
 - 3.4.2 Virologische Untersuchung
 - 3.4.3 Parasitologische Untersuchung
- 3.5 Materialien aus dem Genitaltrakt
 - 3.5.1 STD (sexual transmitted disease)-Erreger
- 3.6 Materialien aus dem Zentralnervensystem (ZNS)
- 3.7 Materialien aus dem Augenbereich
- 3.8 Materialien aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich
- 3.9 Materialien aus dem unteren Respirationstrakt
 - 3.9.1 Hinweise zu einzelnen Erregern
- 3.10 Mykobakterien / Tuberkulose
- 3.11 Haut und subkutane Weichteile, Abszesse, Gewebeproben
- 3.12 Knochen und Knorpel
- 3.13 Punktate aus primär sterilen Bereichen (Gelenk-, Pleura-, Perikard-, Aszitespunktat)
- 3.14 Pilznachweis (Hefe-, Schimmelpilze, Dermatophyten)

IV. Multiresistente Keime

4.1 Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA)

4.2 Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE)

4.3 Extended Spektrum β -Laktamasen (ESBL), Metallo- β -Laktamasen (Carbapenemasen)

V. Antibiogramme

5.1 Antibiogramm bei grampositiven Keimen

5.2 Zusätzliche Antibiotika bei MRSA- bzw. VRE-Nachweis

5.3 Antibiogramm bei gramnegativen Keimen

5.4 Antibiogramm bei *Pseudomonas aeruginosa*

5.5 Antibiogramm bei Anaerobiern

VI. Antimykogramm

VII. Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Untersuchungsauftragsformular

Für mikrobiologische Untersuchungen steht ein separater Anforderungsschein zur Verfügung. Dieser kann bei Kassenpatienten als Anhang zum Überweisungsschein, bei Privatpatienten als Auftragsschein verwendet werden.

Auf dem Begleitschein müssen alle benötigten Angaben wie Patientendaten, Barcode, Untersuchungsmaterial, Entnahmeort, Diagnose, evtl. antibiotische/antimykotische Vorbehandlung, Entnahmezeitpunkt sowie alle Informationen, die für die Ergebnisinterpretation wichtig sind, angegeben werden. Das Formular ist in Felder für die häufigsten Untersuchungsmaterialien eingeteilt. Der Untersuchungsumfang wird durch Ankreuzen der gewünschten Anforderungen festgelegt.

Bei Kassenpatienten haben die oben aufgeführten Angaben auf dem Muster 10 Schein zu erfolgen. Hier sind insbesondere die Felder Diagnose/Verdachtsdiagnose, der Untersuchungsauftrag unter Angabe des Entnahmeortes sowie das Abnahmedatum anzugeben.

Nur korrekt ausgefüllte Anforderungsscheine mit ausreichenden klinischen und sonstigen relevanten Angaben (z.B. Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, Tropenaufenthalt, Tierkontakt) garantieren eine optimale, aussagekräftige mikrobiologische Diagnostik und sind unerlässlich für die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse.

1.2 Probengewinnung

Die Erstellung eines zuverlässigen mikrobiologischen Befundes hängt maßgeblich von der fachgerechten Probengewinnung sowie der Lagerung und des Transports in das Labor ab.

Hierbei sollte Folgendes beachtet werden:

Vermeiden Sie soweit wie möglich bei der Probenentnahme die Kontamination der Probe mit

Keimen der physiologischen

Haut- oder Schleimhautflora z.B. durch sorgfältige Desinfektion vor Punktionen.

Wählen Sie die korrekte anatomische Stelle (Ort der Infektion) aus und verwenden Sie zur Probenentnahme die korrekten

Abnahmesysteme (siehe 1.4).

Die Proben sollten möglichst vor der Gabe von antimikrobiellen Chemotherapeutika gewonnen werden. Falls dies nicht

möglich ist, bitten wir um Mitteilung der bereits begonnenen antimikrobiellen Therapie.

Mehrmalige Probenentnahmen

erhöhen die diagnostische Sensitivität. Kontrolluntersuchungen sollten frühestens 3 Tage nach Absetzen der antimikrobiellen

Therapie erfolgen.

Senden Sie bei Flüssigkeiten (Eiter, Punkate etc.) genügend Material in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen ein

(siehe 3.13). Verwenden Sie bitte in diesen Fällen keine Röhrchen mit Abstrichtupfern, da diese nicht dicht schließen und es

möglicherweise zu falsch positiven Ergebnissen kommen kann.

1.3 Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung und Transport

Zur Kennzeichnung der Untersuchungsmaterialien und Identifizierung der Patienten dienen die Barcode-Etiketten mit den

Arzt-Patienten-Nummern. Bitte bringen Sie diese auf allen Anforderungsscheinen und Untersuchungsmaterialien (nicht auf

der Umverpackung) so an, dass eine eindeutige Zuordnung des Materials zum Patienten gegeben ist. Es können mehrere

Materialien eines Patienten unter einer Arzt-Patienten-Nummer erfasst werden. Geben Sie bei mehreren Materialien von

einem Patienten die genaue Abnahmestelle und den Zeitpunkt der Entnahme an, um später eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.

Bei Postversand sind alle Probengefäße (Stuhlgefäße, Urinmonovetten etc.) zusätzlich mit einer auslaufsicheren

Umverpackung zu versehen.

Um eine schnelle Zuordnung im Labor zu erreichen, geben Sie bitte alle Aufträge zusammen mit dem

Untersuchungsmaterial für die **Mikrobiologie** und **Molekularbiologie** in die dafür vorgesehenen grünen Versandtüten.

Sollte der sofortige Transport nicht möglich sein, beachten Sie bitte bei Lagerung der Proben die in der Tabelle aufgeführten

Empfehlungen zur Temperierung. Im Allgemeinen sollten Proben möglichst nicht länger als 24 Std. gelagert werden.

Lagerung von Untersuchungsmaterial

Material	Raumtemperatur (max. 25°C)	Kühlschrank (2-8°C)
Abstriche (aller Art) im Transportmedium	X	X (bei Lagerung > 12h)
Stuhl		X
Urin		X (bei Lagerung > 24h Uriline verwenden)
Uriline – vor Bebrütung	X (max. 48 h bei 7-25°C)	
Uriline – nach Bebrütung		X
Sputum, Tracheal-/ Bronchialsekret		X
Punktat / Aspirat		X
Gewebe / Biopsiematerial		X
Blutkultur	X	
Liquor nativ (Bakteriologie):	X (Abkühlung vermeiden)	
Katheterspitze		X
Material für TBC		X

1.4 Abnahmesysteme

Die für die mikrobiologischen Untersuchungen benötigten Abnahmesysteme werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Den sachgerechten Transport der Proben übernimmt der Labor-Fahrdienst.

10 ml Schraubverschlussröhrchen (steril)	Liquor, Punktate, Eiter
50 ml Schraubverschlussröhrchen (steril)	TBC-Diagnostik z.B. Sputum, Bronchialsekret, Urin, für Magensaft mit 1 ml vorgelegtem Phosphatpuffer
10 ml Urinmonovette (steril)	Urin
100 ml Schraubverschlussbecher (steril)	Urin, Sputum
Urine	Urin bei längeren Lagerungs-/Transportzeiten
Stuhlröhrchen	Stuhl
Abstrichtupfer mit Transportmedium (in 2 Größen)	Wundabstriche, Genitalabstriche, MRSA-PCR
Abstrichtupfer mit Kohletransportmedium (schwarzes Gel)	Gonokokken-Kultur
cobas PCR media-Set	Influenza A/B-PCR, SARS-CoV-2 (Corona)-PCR
GynoPrep-Abnahmesystem	HPV-PCR
cobas PCR media-Set	Chlamydien-/Gonokokken-PCR
Spezial-Abstrichset (Nasopharyngeal)	B. pertussis/parapertussis-, M. pneumoniae-, Ch. pneumoniae-RSV-PCR
Blutkulturflaschen (aerob = grün, anaerob = orange)	Blut
QuantiFERON-TB Gold (Spezial-Entnahmeset)	Interferon-Gamma-Test (IGRA) für TBC-Diagnostik

Abnahmesysteme in Abhängigkeit vom Untersuchungsmaterial/Diagnose

Infektion	Material	Abnahmebesteck
Haut, Schleimhaut	Abstrich Punktat/Abszessinhalte	Tupfer in Transportmedium Sterile Spritze/Kürette - Überführung in steriles Schraubverschlussröhrchen
Dermatophyten	Nagel-/Hautgeschabsel, epilierte Haare	Transportgefäß ohne Transportmedium
Gewebe	Biopsie	Steriles Schraubverschlussröhrchen mit Zusatz von 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg. CAVE: Kein Formalin !
Katheter, Drainage	ca. 3 cm der vorderen Spitze	Steriles Transportgefäß ohne Transportmedium
Sepsis	Blut	Blutkulturflaschen aerob / anaerob
Meningitis	Liquor nativ	Steriles Schraubverschlussröhrchen (Abkühlung vermeiden)
Auge, Ohr	Abstrich	Tupfer in Transportmedium
Obere Atemwege	Nase-, Rachen-, Tonsillen-, Zungen-, Nebenhöhlenabstrich	Tupfer in Transportmedium
Tiefe Atemwege	Sputum, Tracheal-/ Bronchialsekret, BAL	100 ml Schraubverschlussbecher Tbc-Diagnostik: 50 ml Schraubverschlussröhrchen (Mindestmengen s. Kapitel 3.10)
Influenza/ SARS-CoV-2 (Corona)	Nasopharyngealabstrich (tief), Nasen-/Rachenabstrich Rachenspülwasser	Cobas PCR Media-Set Rachenspülwasser (PCR): Sputumbecher mit

		10 ml 0,9% NaCl-Lsg. oder frischem Mineraloder Trinkwasser
Pertussis/ Parapertussis	Nasopharyngealabstrich (tief)	Spezialabstrichbürste mit Flüssigtransportmedium (PCR)
Respiratory Syncytial-Virus (RSV)	Nasopharyngealabstrich (tief)	Cobas PCR Media-Set
Tuberkulose	Sputum, Bronchialsekret, BAL, Urin, Magensaft	50 ml Schraubverschlussröhrchen, Für Magensaft: Röhrchen mit 1 ml vorgelegtem Phosphatpuffer anfordern (Mindestmengen s. Kapitel 3.10)
	Blut für Interferon-Gamma-Test (IGRA)	QuantiFERON-TB Gold (Spezial-Entnahmeset)
Harnwege	Mittelstrahlurin, Blasenpunktionsurin	Steriler 100 ml Schraubverschlussbecher, Uriline, Urinmonovette
		Tbc-Diagnostik: 50 ml Schraubverschlussröhrchen (Mindestmengen s. Kapitel 3.10)
Urogenitaltrakt	Abstrich, Ejakulat	Tupfer in Transportmedium, steriles Gefäß
Chlamydien, Gonokokken	Zervix-/Vaginal-/ Urethralabstrich Erststrahlurin, Ejakulat	Cobas PCR Media-Set Uringefäß (PCR)
HPV	Zellreicher Abstrich	Abnahmeanleitung bitte im Labor anfordern. Männer: GynoPrep - Abnahmesystem Frauen: GynoPrep - Abnahmesystem
Herpesviren	Bläscheninhalt bzw. zellreicher Abstrich	Trockener Tupfer ohne Gel (PCR)
Helicobacter pylori	Magenbiopsie	

		„Portagerm Pylori“-Transportmedium
Darminfektion bakteriell / viral / parasitär	Stuhlprobe	Stuhlröhrchen
Wurm/ Wurmbestandteile	Wurm/Wurmbestandteile	Schraubverschlussröhrchen mit Zusatz von steriler 0,9%iger NaCl-Lsg.
Oxyuren (Madenwürmer)	Analabklatschpräparat	Durchsichtiger Tesafilm auf Objektträger

II. Untersuchungsauftrag

2.1 Pathogene Keime

Der Auftrag auf „pathogene Keime“ beinhaltet eine Untersuchung, die das materialabhängig am häufigsten pathogene Keimpektrum berücksichtigt. Entsprechend den Empfehlungen der Fachkreise (MIQ) wird der Untersuchungsumfang den üblicherweise zu erwartenden Keimen angepasst wie z.B. Anreicherungsmedien für Salmonellen bei der Stuhldiagnostik oder der Nachweis von anaeroben Keimen bei Wundabstrichen. Dennoch ist der Untersuchungsumfang nicht allumfassend, da viele Keime (z.B. Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen, Listerien, Legionellen) spezielle Anzuchtbedingungen benötigen und nur im Zuge von Zielaufträgen erfasst werden können. Bei pathogenen Keimen werden **routinemäßig** keimspezifische Antibiogramme erstellt. Werden ausdrücklich keine Antibiogramme gewünscht, so ist dies auf dem Auftrag zu vermerken.

2.2 Zielaufträge

Wird nur die gezielte Untersuchung auf bestimmte Keime oder Keimgruppen gewünscht, können die sog. Zielaufträge mit einem eingeschränkten Untersuchungsumfang (z.B. nur auf Salmonellen/Shigellen, MRSA, β -hämolisierende Streptokokken, TBC) angefordert werden.

2.3 Hefepilze, Schimmelpilze und Dermatophyten

Wird der Nachweis von Hefe-/Schimmelpilzen und/oder Dermatophyten gewünscht, ist dies auf dem Antrag zu vermerken.

Bei Nachweis von *Candida species* ab mäßiger Keimzahl wird routinemäßig ein Antimykogramm erstellt. Wird kein Antimykogramm gewünscht, ist dies auf dem Auftrag anzugeben.

Bei Haut, Haaren und Nägeln empfiehlt sich die Untersuchung auf Dermatophyten; näheres hierzu entnehmen Sie bitte Abschnitt 3.14.

2.4 Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

Im Rahmen der Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik werden der mikroskopische Nachweis von säurefesten Stäbchen, der kulturelle Nachweis von Mykobakterien sowie die Mycobacterium-tuberculosis-Komplex-PCR angeboten. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.10.

2.5 Würmer, Wurmeier und Parasiten

Wegen der oft intermittierenden Ausscheidung von Parasiten/Wurmeiern wird zur Erhöhung der diagnostischen Sensitivität die Einsendung von insgesamt 3 Stuhlproben empfohlen, wobei der Abstand zwischen den Probenentnahmen 1-3 Tage betragen sollte. Aufgrund der Ungleichverteilung der Parasiten, sollte die Entnahme an jeweils 3 verschiedenen Stellen des Stuhls erfolgen, bevorzugt weiche/flüssige Stuhlanteile bzw. blutig-schleimige Auflagerungen. Bei V.a. Bandwurmgliedern (Proglottiden) im Stuhl, sollten diese unter Beachtung der Infektionsgefahr (Tragen von Handschuhen) in 0,9% NaCl-Lsg. eingesandt werden. Bei V.a. Oxyuren bitte *keinen* Stuhl, sondern ein Analabklatschpräparat (durchsichtiger Tesafilm auf Objektträger) einsenden. Bei Anforderung einer Untersuchung auf Lamblien und/oder Amöben im Stuhl, wird vom Labor ein Antigennachweis mittels ELISA durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.4

2.6 Chlamydien und Gonokokken

Der Nachweis von Chlamydia trachomatis und/oder Neisseria gonorrhoeae erfordert einen gesonderten Zielauftrag. Die Untersuchung erfolgt als DNA-Nachweis mittels PCR. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.5.

Neisseria gonorrhoeae kann auch mikroskopisch und kulturell nachgewiesen werden. Hierfür sind Abstrichbestecke, die ein Transportmedium mit Kohlepartikeln (schwarzes Gel) enthalten, zu verwenden, die spätestens innerhalb von 24 Std. im Labor eingehen müssen. Wegen der höheren Sensitivität und der weniger zeitempfindlichen Transportdauer ist die

Gonokokken-PCR jedoch bei der Diagnostik zu bevorzugen. Weitere Informationen zur Gonokokken-Kultur unter Abschnitt 3.5.

2.7 Mykoplasmen / Ureaplasmen

Der Nachweis von Mykoplasmen und Ureaplasmen erfordert einen gesonderten Zielauftrag, da die Anzucht nur auf speziellen Nährmedien möglich ist. Weitere Informationen unter Abschnitt 3.5.

2.8 Bilharziose (Schistosomen)

Blasenbilharziose

Mikroskopischer Nachweis: 24-Stunden-Urin

Bei V.a. Blasenbilharziose ist das Labor vorab telefonisch zu verständigen, um eine optimale Diagnostik zu gewährleisten.

Es sollte 24-Stunden-Urin bzw. mind. 1 Liter Urin gesammelt werden (ideale Sammelperiode 10-14 Uhr und nach größerer

körperlicher Anstrengung, z.B. Treppen steigen lassen!). Der Patient sollte angehalten werden, auch den letzten Urintropfen

aufzufangen, da hiermit noch große Mengen an Eiern ausgeschieden werden. Die Urinprobe sollte im Dunkeln gelagert

werden (Vermeidung des Schlüpfens der Larven). Der Transport ins Labor hat noch am selben Tag zu erfolgen. Aufgrund

der intermittierenden Ausscheidung der Eier, sollten mind. 3 Proben von 3 verschiedenen Tagen (am besten im Abstand von jeweils 2 Tagen) eingesandt werden.

Bei wiederholt negativem Urinbefund und weiterbestehendem V.a. Infektion, kann der Nachweis aus einer Blasenschleimhautbiopsie

versucht werden. Bei negativem mikroskopischen Nachweis sollte unbedingt ein Antikörpernachweis > 3 Monate

nach Rückkehr durchgeführt werden.

Antikörpernachweis: 1 ml Serum

Bei Patienten, die nicht aus Endemiegebieten stammen, schließt ein negativer

Antikörpernachweis > 3 Monate nach

Rückkehr eine Schistosoma-Infektion mit großer Sicherheit aus.

Darmbilharziose

Mikroskopischer Nachweis: Stuhlprobe

Nachweis von Schistosoma-Eiern aus dem Stuhl. Bei der Probenentnahme sind blutige und schleimige Anteile zu

bevorzugen. Aufgrund der intermittierenden Ausscheidung der Eier, sollten mind. 3 Proben

von 3 verschiedenen Tagen (am besten im Abstand von jeweils 2 Tagen) eingesandt werden.
Bei wiederholt negativem Stuhlbefund und weiterbestehendem V.a. Infektion, kann der Nachweis aus einer Biopsie der hinteren Rektumschleimhaut versucht werden. Bei negativem mikroskopischen Nachweis sollte unbedingt ein Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr durchgeführt werden.

Antikörpernachweis: 1 ml Serum Bei Patienten, die nicht aus Endemiegebieten stammen, schließt ein negativer Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr eine Schistosoma-Infektion mit großer Sicherheit aus.

2.9 Hygieneuntersuchungen (Untersuchungen außerhalb der Akkreditierung)

Mikrobiologische Prüfung von Endoskopen (auf Anfrage)
Prüfung der Hygienequalität von Endoskopen gem. § 7 Qualitätssicherungsvereinbarung zur Vorlage bei der Kassenärztlichen Vereinigung mittels steriler Spüllösungen und Abstrichtupfern.

III. Untersuchungsmaterialien

3.1 Blutkulturen

Indikation V.a. Bakteriämie, Fungämie, Sepsis, SIRS, Meningitis, Pneumonie, Pyelonephritis, Osteomyelitis, Endokarditis, Katheterinfektion

Materialien Venöses Blut in Blutkulturflaschen (aerob und anaerob)

Allgemeine Hinweise

Lagerung der unbeimpften Flaschen bei Raumtemperatur und dunkel. Bitte das Verfallsdatum beachten.
Entnahmedatum und Uhrzeit auf dem Anforderungsschein vermerken. Jede Flasche deutlich lesbar mit Vor- und Nachnamen des Patienten sowie Geburtsdatum beschriften. Barcode auf der Blutkulturflasche und den Flaschenboden nicht überkleben.
Beimpfte Blutkulturflaschen bis zum Transport bei Raumtemperatur lagern.
Schnellstmöglicher Proben transport ins Labor.
Bei V. a. Kathetersepsis siehe 3.2.

Entnahmeort

Punktion einer peripheren Vene (z.B. der Ellenbeuge).

Punktion von Venen im Bereich entzündeter Hautareale wegen erhöhter Kontaminationsgefahr vermeiden. Entnahme von

arteriellem Blut bringt auch bei Endokarditis und Fungämie keine Vorteile.

Bei Abnahme von Blutkulturen über einen intravasalen Katheter muss mit einer erheblich höheren Kontaminationsrate gerechnet

werden, sodass ein intravaskulärer Katheter oder ein Portsystem als Entnahmeort nur ausnahmsweise in Frage

kommen, wenn eine periphere Venenpunktion nicht möglich ist oder wenn eine Blutkulturdiagnostik zum Nachweis einer

katheterassoziierten Infektion (parallele Entnahme mind. einer peripher über eine Vene und einer zentral über den Katheter

entnommenen Blutkultur) erfolgen soll.

Hautdesinfektion im Bereich der Punktionsstelle

Punktionsstelle zunächst mit einem alkoholischen Hautdesinfektionsmittel mechanisch reinigen, anschließend erfolgt die

eigentliche Desinfektion. Hautdesinfektionsmittel mit einem sterilen Tupfer oder als Spray auftragen; Einwirkzeit mind. 1 min

bis zur vollständigen Trocknung des Alkohols. Eine erneute Palpation der Punktionsstelle sowie das Abwischen von

Desinfektionsmittelresten vor der Blutentnahme sollten möglichst unterbleiben.

Blutentnahme – Blutvolumen

Nach hygienischer Händedesinfektion (30 sec) nicht steril verpackte Einmalhandschuhe anziehen. Hautdesinfektion wie oben beschrieben.

Nach Entfernung der Schutzkappe der Blutkulturflasche den darunter gelegenen Gummistopfen mit Alkohol desinfizieren

(Einwirkzeit beachten); es dürfen keine Desinfektionsmittelreste mehr auf dem Gummistopfen erkennbar sein, die bei der

Beimpfung in die Blutkulturflasche gesaugt werden könnten.

Nach einer Fehlpunktion Kanüle wechseln und erneute Hautdesinfektion.

Für ein Blutkulturpaar: 10-20 ml Blut aspirieren und jeweils 5-10 ml in die aerobe und anaerobe Blutkulturflasche verimpfen.

Ein Volumen von 5 ml je Flasche soll nicht unterschritten bzw. ein Volumen von 10 ml je Flasche nicht überschritten werden.

Flaschen *nicht* belüften. Zuerst die anaerobe Flasche beimpfen, um das Eindringen von Luft aus der Spritze in die anaerobe

Flasche zu verhindern.

Kinder >20 kg: 10 ml Blut entnehmen und jeweils 5 ml in eine aerobe und anaerobe Blutkulturflasche verimpfen.

Kinder <20 kg: 1-10 ml Blut (gewichtsabhängig) entnehmen, nur eine aerobe Blutkulturflasche beimpfen.

Beimpfte Blutkulturflaschen zur Durchmischung kurz schwenken.

Entnahmezeitpunkt

Unabhängig von einer bestimmten Fieberhöhe, unmittelbar bei Auftreten einer auf eine Sepsis hindeutenden klinischen

Symptomatik z.B. bei Fieberanstieg, bei Auftreten von Schüttelfrost. Blutentnahme möglichst vor Beginn einer antibiotischen Therapie.

Wegen der bei Endokarditis kontinuierlich auftretenden Bakteriämie braucht ein optimaler Zeitpunkt, z.B. eine Fieberspitze, zur Abnahme nicht abgewartet zu werden.

Bei laufender Antibiotikatherapie Therapiepause von 2-3 Tagen erwägen oder Blutentnahme unmittelbar vor Applikation der nächsten Dosis.

Anzahl der Blutkulturen

Es sollten 3 Blutkulturpaare (aerob + anaerob) durch separate Punktion entnommen werden, da dies zu einer signifikant

höheren Sensitivität des Erregernachweises führt und die Interpretation der Relevanz eines nachgewiesenen Erregers

erleichtert. Mit 1 BK werden nur 65%, mit 2 BK 80% und mit 3 BK 96% aller Bakteriämien erfasst.

Klinisch dringende Fälle (z.B. akute Sepsis, akute Endokarditis, Fieber unklarer Genese bei Neutropenie):

3 BK-Paare durch 3 separate Venenpunktionen innerhalb 30 Min. vor Therapiebeginn. Ein zeitlicher Mindestabstand zwischen den einzelnen Abnahmen ist nicht erforderlich.

Fieber unklarer Genese bei nicht-neutropenischen Patienten, subakute Endokarditis, hämatogene Osteomyelitis,

Spondylodiszitis:

3 BK-Paare durch 3 separate Venenpunktionen innerhalb von 24 Std. (möglichst vor Therapiebeginn). Ein zeitlicher Mindestabstand zwischen den einzelnen Abnahmen ist nicht erforderlich.

Befundinterpretation

Jeder Nachweis eines Keimes in der Blutkultur ist ernst zu nehmen und sollte auf seine klinische Relevanz hin überprüft

werden. Schwierig ist die Interpretation bei Keimen, die auch zur physiologischen Hautflora gehören z.B. Staph. epidermidis

u.a. koagulase-negative Staphylokokken, Micrococcus spp., Corynebacterium spp.,

Propionibacterium spp.. So kann der Nachweis von Staph. epidermidis auf einer Kontamination basieren, aber auch Ursache einer Katheterinfektion oder Kunstklappenendokarditis sein. Deshalb ist, um in diesen Fällen die Relevanz von Hautkeimen zu sichern, der wiederholte Nachweis eines Keimes in mehrfach abgenommenen Blutkulturen wichtig. Propionibakterien in Blutkulturen sind ebenfalls meist Folge einer Kontamination durch die Haut, in seltenen Fällen können sie aber auch Erreger einer Endokarditis sein. Auch in diesem Fall ist der wiederholte Nachweis dieser Bakterien in mehreren Blutkulturen zur Sicherstellung der klinischen Relevanz notwendig. Der Nachweis von Hefepilzen in Blutkulturen ist nahezu immer von klinischer Relevanz und erfordert in der Regel eine antifungale Therapie.

3.2 Katheterspitzen

Indikation Katheterinfektion/-sepsis

Material Katheterspitze in einem sterilen Röhrchen einsenden (nicht in ein Röhrchen mit Transportmedium einbringen)

Entnahme / Lagerung

Nach alkoholischer Desinfektion der Haut den Katheter aus der Eintrittsstelle ziehen, mit steriler Pinzette und Schere die vorderen ca. 3 cm der Spitze abschneiden und in ein steriles Transportgefäß ohne Transportmedium geben.

Für die Diagnose einer katheterassoziierten Infektion bei schon gezogenem Katheter müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

- 1) Klinische Infektionszeichen wie Fieber, Schüttelfrost und/oder Blutdruckabfall sowie
 - 2) Positive Blutkultur aus einer peripheren Vene abgenommen mit Nachweis des gleichen Erregers wie bei der Katheterspitze (Identität bzgl. Spezies und Antibiogramm)
- Lagerung der Probe bis zu 24 Std. bei 2-8°C.

3.3 Urin und Uriline

Indikation Harnwegsinfektionen (z.B. Zystitis, Pyelonephritis)

Entnahme / Lagerung

Probengewinnung möglichst vor Beginn einer antibakteriellen Therapie bzw. mind. 3 Tage

nach letzter Antibiose.

Lagerung von Urin bei 2-8°C bis max. 24 Std.. Bei längerer Lagerung sollte ein Eintauchobjektträger (Uriline) verwendet werden, um die Keimzahl zum Zeitpunkt der Uringewinnung zu fixieren, siehe Uriline.

Chlamydien-/Gonokokken-/Mykoplasmen-/Trichomonaden-Nachweis: siehe 3.5.1.

Urogenital-Tbc: siehe 3.10

Material

Mittelstrahlurin

Mittelstrahlurin gilt als Methode der Wahl zur Diagnostik einer Harnwegsinfektion. Zwischen Gewinnung der Urinprobe und der letzten Miktion sollten mind. 3 Std. liegen (am besten erster Morgenurin). Eine sachgerechte Entnahmetechnik ist erforderlich, um Verunreinigungen durch Bakterien aus Urethra/Präputium/Vagina/Vulva/Perineum sowie von den Händen zu vermeiden. Vor der Uringewinnung hat eine gründliche Reinigung der Urethralmündung/-umgebung zu erfolgen:

Männer: Hände und Vorhaut mit Seife waschen, Vorhaut zurückziehen, Glans mit Wasser reinigen und einem Tupfer abtrocknen.

Frauen: Äußeres Genitale gründlich mit Seife waschen, mit Wasser abspülen, Urethralmündung mit feuchten, sterilen Tupfern reinigen und abtrocknen.

Die ersten ml der Urinportion sind zu verwerfen und anschließend ca. 10 ml in einem sterilen Gefäß aufzufangen. Eine Verunreinigung durch Becherrand, Hand oder Kleidung ist zu vermeiden.

Uriline

Mittelstrahlurin gewinnen (siehe Mittelstrahlurin). Urin in sterilem Gefäß (z.B. Urinbecher) auffangen.

Nährbodenträger kurz in Urin eintauchen, sodass die Agarschichten vollständig mit Urin benetzt werden. Nach Herausziehen überschüssigen Urin abtropfen lassen, Nährbodenträger in Urilineröhrchen zurückschieben und Deckel fest zuschrauben.

Wird der Uriline-Träger nicht eingetaucht, sondern lediglich in den Urinstrahl gehalten, ergeben sich falsche Keimzahlen.

Es muss strikt darauf geachtet werden, dass kein Resturin im Transportbehältnis bleibt.

Dieser könnte die Agaroberfläche mehrfach benetzen und damit eine falsch hohe Keimzahl vortäuschen. Der Uriline kann bei 36°C vorbebrütet werden. Die Inkubationszeit sollte 24 Std. nicht überschreiten (ggf. danach bis zum Transport bei 2-8°C lagern).

Verwendung von Urilines nur bei Verzögerung bis zum Transport um mehr als 24 Std.

Nachteile Uriline:

- Keine keimspezifische Keimzahlbestimmung
- Zeitverlust in der Bearbeitung, da Subkulturen notwendig werden
- Keine Bestimmung der Leukozyturie möglich, wie nach aktuellen Leitlinien gefordert

Einmalkatheterurin

Sollte nur angewendet werden, wenn eine einwandfreie Gewinnung von Mittelstrahlurin nicht möglich ist, da jede Katheterisierung eine zusätzliche Infektionsgefahr birgt. Eine Blasenpunktion kann alternativ in Betracht gezogen werden, siehe Blasenpunktionsurin. Zwischen Gewinnung der Urinprobe und der letzten Miktion sollten mind. 3 Std. liegen (am besten erster Morgenurin). Wie bei Mittelstrahlurin gründliche Reinigung der Urethralmündung/-umgebung. Die ersten ml der Urinportion sind zu verwerfen und anschließend ca. 10 ml in einem sterilen Gefäß aufzufangen.

Dauerkatheterurin

Die Uringewinnung erfolgt nach sorgfältiger Desinfektion der bereits für die Punktion vorgesehenen Einstichstelle am Ableitungssystem. Die Urinprobe darf auf keinen Fall aus dem Urin-Sammelbehälter entnommen werden.

Blasenpunktionsurin

Voraussetzung ist eine gut gefüllte Harnblase (im Zweifelsfall sonographische Kontrolle). Nach sorgfältiger Hautdesinfektion wird die Harnblase 1-2 Querfinger oberhalb der Symphyse punktiert. Bei dieser Art der Uringewinnung ist jede Keimzahl diagnostisch signifikant, da eine Kontamination der Probe nahezu ausgeschlossen ist.

Interpretation des Urinbefundes

Die Bewertung des Urinbefundes erfolgt individuell in der Zusammenschau des Nachweises

ein Leukozyturie, der Anzucht typisch oder potentiell uropathogener Keime sowie der in der Probe vorhandenen Keimzahl.

Mittelstrahlurin

$> 10^5$ KBE/ml Harnwegsinfektion anzunehmen

10^4 - 10^5 KBE/ml Harnwegsinfektion möglich

Bei Kindern sind bereits Keimzahlen ab 10^4 Keime/ml verdächtig für eine Harnwegsinfektion

$\leq 10^3$ KBE/ml Harnwegsinfektion unwahrscheinlich
ggf. Kontrolle mit evtl. ergänzender Diagnostik auf
STD-Erreger (Chlamydien, Mykoplasmen, Trichomonaden)

Einmalkatheterurin

$\leq 10^5$ KBE/ml Harnwegsinfektion anzunehmen

10^4 KBE/ml Harnwegsinfektion möglich

$\leq 10^3$ KBE/ml Harnwegsinfektion unwahrscheinlich;
ggf. Kontrolle mit evtl. ergänzender Diagnostik auf
STD-Erreger (Chlamydien, Mykoplasmen, Trichomonaden)

Blasenpunktionsurin Jede Keimzahl gilt als signifikanter Hinweis auf eine Harnwegsinfektion.

Bewertung des Hemmstoff-Tests

Bei Urin wird zum Nachweis antibakterieller Substanzen ein Hemmstofftest durchgeführt. Ein positiver Testausfall bedeutet, dass antibakterielle Substanzen im Urin vorhanden sind. Hierdurch sind falschnegative kulturelle Befunde bzw. Befunde mit falsch niedriger Keimzahl möglich. Eine Kontrolleinsendung wird empfohlen.

Sterile Leukozyturie

Bei wiederholter Leukozyturie und negativer Urinkultur sollten auch folgende Erreger als Ursache ausgeschlossen werden:

Mykobakterien (Urogenital-TBC), Chlamydien, Mykoplasmen/Ureaplasmen, Gonokokken, sehr

selten Anaerobier

(Blasenpunktionsurin erforderlich) und nach Auslandsaufenthalt ggf. auch Schistosomen (Blasenbilharziose siehe 2.8).

Immunsupprimierte weisen selten auch Harnwegsinfektionen durch Viren auf, z.B. hämorrhagische Zystitis durch Adenoviren oder BK-Viren (Polyomaviren): PCR aus Urin oder Blasenwandbiopsie.

3.4 Materialien aus dem Gastrointestinaltrakt (Stuhl, Magenbiopsien)

Indikation Diarrhoe durch bakterielle Erreger: z.B. Salmonellen, Shigellen, Yersinien, Campylobacter, enteropathogene E. coli (EPEC), enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
Diarrhoe durch virale Erreger: Noro-, Adeno-, Rotaviren
Antibiotikaassoziierte Diarrhoe (AAD): Clostridium difficile
Personaluntersuchung auf Salmonellen/Shigellen
Parasiteninfektion: z.B. Amöben, Lamblien, Würmer/Wurmeier
Kokzidien/Mikrosporidien (HIV, Immunsuppression)
Pilze
Multiresistente Keime z.B. MRGN, VRE

Insbesondere bei folgenden Indikationen empfiehlt sich ein erweitertes Untersuchungsspektrum:

Weitere Hinweise siehe auch 3.4.1 - 3.4.3

Antibiotikaassoziierte Diarrhoe (AAD): Cl. difficile

Nach Auslandsaufenthalt: pathogene Keime, Würmer/Wurmeier/Parasiten, ggf. Aeromonas spp./Vibrio spp.

Blutige Diarrhoe: pathogene Keime, Cl. difficile, EHEC, Adeno-/Noro-/Rotaviren; nach Auslandsaufenthalt zusätzlich Würmer/Wurmeier/Parasiten, ggf. Aeromonas spp./Vibrio spp.

Immunsupprimierte Patienten: pathogene Keime, Cl. difficile, EPEC, EHEC, Aeromonas spp., fakultativ enteropathogene Bakterien (z.B. Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp., Enterobacteriaceae, Staph. aureus), Mykobakterien, Pilze,

Würmer/Wurmeier/Parasiten, Kokzidien (Isospora, Cryptosporidium, Cyclospora), Mikrosporidien, Rota-/Adeno-/Noroviren, CMV (PCR aus Colon-Biopsie oder Stuhl)

3.4.1 Bakteriologische Untersuchung

Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. 1/3 mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlaneile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen.

Untersuchung auf pathogene Keime

Pathogene Keime:	Salmonellen, Shigellen, Yersinien, Campylobacter
Dyspepsie coli (EPEC):	I.d.R. nur bis zu einem Alter von 3 Jahren sinnvoll; wird bei Kindern bis zu 3 Jahren bei Anforderung auf „pathogene Keime“ stets mit untersucht

Alle weiteren Untersuchungen bitte gesondert anfordern, da sie nicht in der Anforderung „pathogene Keime“ enthalten sind.

Cholera

Bei Choleraverdacht ist das Labor sofort telefonisch zu verständigen und die Stuhlprobe auf schnellstem Weg noch am selben Tag ins Labor zu bringen. Schon der Verdacht auf Cholera ist meldepflichtig!

Clostridium difficile

Indikation: Patienten mit blutiger/wässriger Diarrhoe bei Antibiotikaeinnahme in den letzten 60 Tagen oder Risikopatienten (> 65 Jahre, immunsupprimiert, schwere bzw. gastrointestinale Grunderkrankung); außerdem jede > 3 Tage andauernde Diarrhö mit/ohne vorherige Antibiose. Stuhl Diagnostik sollte innerhalb von 3 Tagen erfolgen. Probe bis zum Transport bei 2-8°C

lagern. Bei negativem Ergebnis und weiterbestehendem klinischen Verdacht sollten weitere Stuhlproben eingesandt werden.

Helicobacter pylori

Für eine zuverlässige H. pylori-Diagnostik mittels Antigennachweis oder Kultur sind folgende Mindestzeitintervalle einzuhalten: 2 Wochen nach Ende einer PPI- bzw. H2-Rezeptorblocker-Therapie und 4-6 Wochen nach vorausgegangener Eradikations- oder sonstiger Antibiotikatherapie.

Antigennachweis (ELISA) im Stuhl

Direktnachweis zur Diagnose und insbesondere zur Therapiekontrolle (4-6 Wochen nach Therapieende). Der Test stellt eine sehr zuverlässige Alternative zum 13 C-Atemtest bei vergleichbarer Sensitivität und Spezifität dar. Bei gastrointestinalen Blutungen kann der Test falsch negativ ausfallen.

Kultur und Resistenzbestimmung (Magenbiopsie)^o

Für die Resistenzbestimmung ist eine Kultur von H. pylori aus Magenbiopsien (Antrum + Corpus) erforderlich.

Bei der Gastroskopie dürfen keine Entschäumer eingesetzt werden (bakterizide Wirkung). Da die Verteilung von Helicobacter

pylori in der Magenschleimhaut inhomogen ist, sollte mind. je 1 Probe aus Antrum und Corpus gewonnen werden. Biopsien

für die Mikrobiologie sind vor den Proben für die Pathologie zu entnehmen, um eine Kontamination mit Formalin zu vermeiden.

Biopsien von Antrum und Corpus sind getrennt nach Entnahmeort unmittelbar nach Gewinnung in „Portagerm

Pylori“-Transportmedium zu überführen. Dieses Transportmedium hat nur eine kurze Haltbarkeitsdauer (s. Aufdruck auf dem

Gefäß), die keinesfalls überschritten werden darf. Die Biopsien müssen mind. 1 cm in das Medium eingedrückt werden, um

Kontakt mit Sauerstoff zu vermeiden. Wegen der Komplexität der Untersuchung und der Empfindlichkeit des Erregers sollten

keine Gastroskopien mit Probenentnahme am Freitag oder vor Feiertagen durchgeführt werden, da ansonsten evtl. mit falsch

negativen Ergebnissen zu rechnen ist. Das Untersuchungsmaterial muss noch am Abnahmetag ins Labor gebracht werden.

Der Transport des beimpften Mediums kann ungekühlt erfolgen.

Antikörpernachweis (ELISA) im Serum

Spezifische IgG-Antikörper sind bei Patienten mit H.pylori-Infektion praktisch immer vorhanden. Der IgG-Nachweis erreicht

Sensitivitäts- und Spezifitätswerte von über 90% (vergleichbar mit Histologie, Antigennachweis, Atemtest, Urease-Schnelltest). Nur ein Teil der Patienten bildet spez. IgA. In einzelnen Fällen (<10%) kommen isolierte IgA-Antikörper ohne IgG-Antwort vor.

Einschränkung: Bis zu 12-monatige Antikörperpersistenz nach Eradikationstherapie sowie unsichere Serokonversion bei Immunsuppression.

Indikation: Diese Untersuchung ist besonders sinnvoll, wenn ein 2-wöchiges Absetzen säurehemmender Medikamente medizinisch nicht möglich ist, bei glandulärer Magenschleimhautatrophie oder bei gastrointestinalen Blutungen (Stuhl-Antigennachweis, Atemtest bzw. Kultur evtl. falsch negativ).

Typhus

Bei Patienten mit V.a. Typhus sind Stuhlkulturen erst ab der 2. Woche sinnvoll. In der akuten Phase erfolgt bei Typhus die Diagnose über Blutkulturen (siehe 3.1)

3.4.2 Virologische Untersuchung

Angefordert werden können folgende viralen Erreger: Adeno-/Noro-/Rota-/Astro-/Sapoviren. Die Stuhl Diagnostik sollte innerhalb von 3 Tagen nach Probenentnahme erfolgen. Probe bis zum Transport im Kühlschrank lagern.

3.4.3 Parasitologische Untersuchung

Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Anteile entnehmen. Aufgrund der intermittierenden Ausscheidung ist die Entnahme von 3 Stuhlproben an drei verschiedenen Tagen erforderlich. Zusätzlich sollte wegen der Ungleichverteilung der Parasiten im Stuhl, die Entnahme jeweils von drei verschiedenen Stellen der Probe erfolgen. Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern.

Amöben

Mikroskopischer Nachweis

Amöbenzysten: Sind relativ stabil und im gekühlten Stuhl einige Tage haltbar.

Vegetative Formen: Bei V.a. akute Amöben-Colitis sollte der Stuhl innerhalb von 30 min ins Labor transportiert werden,

um ggf. den Nachweis vegetativer Formen (sog. „Magna-Formen“) führen zu können, die innerhalb von 30 min bis 1 Std. absterben.

Antigennachweis

Der Antigennachweis von *Entamoeba histolytica/dispar* im Stuhl ist auch nach längerer Lagerung möglich, selbst wenn mikroskopisch keine vegetativen Formen mehr nachweisbar sind (Antigen bis zu 3 Tagen bei 2-8°C stabil). Bei Anforderung einer Untersuchung auf Amöben bzw. Parasiten im Stuhl, wird vom Labor immer ein Antigennachweis mittels ELISA durchgeführt.

Lamblien

Material: Stuhl, Duodenalsaft

Mikroskopischer Nachweis

Lamblienzysten: Sind relativ stabil und im gekühlten Stuhl einige Tage haltbar.
Vegetative Formen: Zum Nachweis muss die Probe innerhalb 30 min nach Entnahme untersucht werden.

Antigennachweis

Der Nachweis von *Giardia lamblia*-Antigen ist auch nach längerer Lagerung möglich, selbst wenn mikroskopisch keine vegetativen Formen mehr nachweisbar sind (Antigen bis zu 3 Tagen bei 2-8°C stabil). Bei Anforderung einer Untersuchung auf Lamblien bzw. Parasiten im Stuhl wird vom Labor immer ein Antigennachweis mittels ELISA durchgeführt.

Oxyuren (*Enterobius vermicularis*)

Oxyureneier sind nur selten im Stuhl zu finden. Daher sollte kein Stuhl, sondern ein Analabklatschpräparat („durchsichtiger Tesafilm“ auf Objektträger) eingesandt werden.

Analabklatschpräparat

Es darf keine vorhergehende Reinigung der Perianalregion erfolgen. Morgens vor dem Stuhlgang ein ca. 10 x 2 cm großes Stück durchsichtige Klebefolie unter Spreizen der Gesäßbacken mehrmals mit der Klebeseite gegen die Analregion drücken.
Anschließend den Streifen luftblasenfrei mit der Klebeseite auf einen Objektträger aufkleben und beschriften.

3.5 Materialien aus dem Genitaltrakt

Indikation Urethritis, Balanitis
 Vaginitis, auch bakterielle Vaginose (*Gardnerella vaginalis*)
 Zervizitis, Adnexitis
 Prostatitis, Epididymitis
 Mutterschaftsvorsorge (z.B. Chlamydien, B-Streptokokken)

Hinweis

Bei V.a. Infektion mit Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen, Ureaplasmen, Trichomonaden, Pilzen und Aktinomyzeten müssen diese als Zielaufträge angefordert werden. Der Untersuchungsauftrag auf „pathogene Keime“ schließt diese Erreger nicht mit ein. Zudem bitte für die Untersuchung auf Chlamydien- und Gonokokken-PCR spezielle Abstrichset verwenden, siehe 3.5.1. Für den kulturellen Gonokokken-Nachweis sind ebenfalls spezielle Abstrichbestecke zu verwenden (Transportmedium mit Kohlepartikel, schwarzes Gel), siehe 3.5.1.

Material

Zervix- oder Vaginalabstrich

Unter Verwendung eines sterilen Vaginalspekulums Abstrich entnehmen und in Transportmedium überführen.

Urethralabstrich

Die letzte Miktion sollte 2-3 Std. zurückliegen. Harnröhrenöffnung reinigen. Vor der Abstrichentnahme beim Mann empfiehlt es sich, Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne zu befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer das Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen und ins Transportmedium überführen.

Ejakulat oder Prostataexprimat

Vor der Materialgewinnung den Bereich um die Harnröhrenöffnung reinigen. Probe nativ in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen einsenden.

3.5.1 STD (sexual transmitted disease) - Erreger

Chlamydien-PCR

Erststrahlurin

Morgendlicher Erststrahlurin oder erste Urinportion nach 4-stündiger Miktionskarenz.
Stabilität der Probe: Raumtemperatur (15-30°C) bis zu 24 Std.; Kühlschranktemperatur (2-8°C) bis zu 7 Tage

Urethralabstrich (Spezial-Abstrichset)

Urethalsekret wird von der Harnröhrenöffnung entnommen. Bei fehlendem Sekret sollte ein Urethralabstrich nach 4-stündiger Miktionskarenz entnommen werden. Vor der Abstrichentnahme beim Mann empfiehlt es sich, Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne zu befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen, in Spezial-Abstrichröhrchen überführen und Tupfer im Medium belassen.

Stabilität der Probe: Raumtemperatur bis zu 12 Monate

Bei Hemmung der PCR im Abstrichmaterial sollte die Untersuchung mit Erststrahlurin wiederholt werden.

Zervixabstrich (Spezial-Abstrichset)

Chlamydien sind obligat intrazelluläre Erreger, daher müssen zellreiche Abstriche gewonnen werden. Mit einem Tupfer

Schleim von der Portio entfernen und verwerfen. Den mitgelieferten Tupfer in den Zervikalkanal einführen, bis die

Tupferspitze nicht mehr sichtbar ist. Tupfer 3-5 sec drehen und herausziehen, ohne die Wände der Vagina zu berühren,

in Spezial-Abstrichröhrchen überführen und Tupfer im Medium belassen.

Stabilität der Probe: Raumtemperatur bis zu 12 Monate

Ejakulat / Douglaspunktat (Untersuchungen außerhalb der Akkreditierung)

Probe nativ in sterilem Schraubverschlussröhrchen.

Gonokkokken-PCR

Erststrahlurin

Bei Frauen ist die Sensitivität der Gonokokken-PCR aus Zervixabstrichen deutlich höher als aus Erststrahlurin. Bei

Männern hingegen ist die Sensitivität aus Erststrahlurin genauso hoch wie aus Urethralabstrichen.

Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR

Urethralabstrich (Spezial-Abstrichset)

Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR

Bei Hemmung der PCR im Abstrichmaterial sollte bei Männern die Untersuchung aus Erststrahlurin wiederholt werden.

Zervixabstrich (Spezial-Abstrichset)

Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR

Analabstrich (Spezial-Abstrichset)

Tupfer entlang der Darmwand mit leichtem Druck ca. 2-4 cm tief in den Analkanal einführen und unter Drehen entfernen. Stark mit Stuhl verunreinigte Proben sollten verworfen werden. Tupfer mit entnommenem Material in Röhrchen mit Spezialmedium überführen und darin belassen. Probenentnahme unter Sicht (Rektoskopie) aus entzündlichen Läsionen der Analschleimhaut erhöht die Ausbeute.
Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C)

Pharyngealabstrich (Spezial-Abstrichset)

Entnahme von der hinteren Rachenwand und den Tonsillen.
Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C)

Ejakulat / Douglaspunktat (Untersuchungen außerhalb der Akkreditierung)

Probe nativ in sterilem Schraubverschlussröhrchen.

Gonokokken-Kultur

Die Gonokokken-Kultur weist nicht die hohe Sensitivität der Gonokokken-PCR auf, da der Keim auf dem Transportweg sehr schnell abstirbt. Für die korrekte Probengewinnung sind Abstrichbestecke, die ein Transportmedium mit Kohlepartikel enthalten (schwarzes Gel), zu verwenden. Diese stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Da es sich hier um den Nachweis von empfindlichen Erregern handelt, sollte die Probe umgehend ins Labor gebracht werden.

Urethralabstrich

Eitriges Sekret wird beim Mann von der Harnröhrenöffnung entnommen. Bei fehlendem Sekret Urethralabstrich nach 4 stündiger Miktionskarenz gewinnen, ggf. Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen.
Urin und Vaginalabstrich sind für die Gonokokkenkultur nicht geeignet.

Zervixabstrich

Vor der Entnahme vorhandenen Zervikalschleim mit einem Tupfer entfernen. Anschließend einen 2. Abstrichtupfer in die Zervix einführen, mehrfach drehen und ohne die Vaginalwand zu berühren entnehmen.

Analabstrich

Bei V.a. gonorrhoeische Proktitis wird ein Tupfer entlang der Darmwand mit leichtem Druck ca. 2-4 cm tief in den

Analkanal eingeführt. Stark mit Stuhl verunreinigte Proben sind zu verwerfen. Die Entnahme von Proben unter

Sicht (Rektoskopie) aus entzündlichen Läsionen der Analschleimhaut erhöht die Sensitivität.

Pharyngealabstrich

Entnahme von der hinteren Rachenwand und den Tonsillen.

Humanes Papillomvirus-PCR (HPV-PCR)°

Voraussetzung für ein optimales Ergebnis ist ein zellreicher Abstrich (kräftig bzw. mehrfach abstreichen)!

Falls Läsionen vorhanden sind, bitte Biopsiematerial in 0,9%iger NaCl-Lsg. einsenden.

Untersuchungsmaterial Frau

Gyno Prep - Abnahmesystem

Kontraindikation: Abstrichbesteck nicht nach der 10. SSW anwenden !

Schleimbeimengung an der Zervix durch vorheriges Abtupfen entfernen. Mittlere Borsten in den Zervixkanal einführen.

Abstrichbürste unter sanftem Druck 5x im Uhrzeigersinn drehen.

Bürstenkopf in die große Öffnung des Einsendegefäßes einführen. Durch Drehen des Stiels um 90° den Bürstenkopf

vom Stiel abziehen und Gefäß verschließen.

Lagerung bis zum Transport: 2-8°C

Untersuchungsmaterial Mann KEINE GKV-Leistung!

Gyno Prep - Abnahmesystem

Sind keine sichtbaren Läsionen vorhanden, sollten folgende Regionen kräftig bzw. mehrfach mit dem Abstrichtupfer abgestrichen werden:

Glans, Corona, Sulcus coronarius, Präputium und Penischaft (nicht die Harnröhre)

Um genügend Zellmaterial zu gewinnen, Abstrichentnahme nicht zu "zaghaft" durchführen.

Eine Möglichkeit dem

vorzubeugen ist, die Abstrichentnahme durch den Patienten selbst durchführen zu lassen.

Lagerung bis zum Transport: 2-8°C

Mykoplasmen / Ureaplasmen

Da Mykoplasmen/Ureaplasmen eine deutliche Zytoadhärenz zeigen, sind zellreiche Abstriche wichtig. Es sind Abstrichtupfer

mit Amies-Transportmedium zu verwenden. Da es sich um den Nachweis empfindlicher

Erregern handelt, sollte die Probe spätestens innerhalb von 24 Std. ins Labor gebracht werden.

Untersuchungsmaterial Frau

Urethralabstrich bzw. morgendlicher Erststrahlurin (V.a. Urethritis), Mittelstrahlurin (V.a. Pyelonephritis),
Zervikalabstrich, Douglaspunktat, Fruchtwasser, Tuben- und Endometriumabstrich.
Vaginalabstriche sind ungeeignet.

Untersuchungsmaterial Mann

Urethralabstrich bzw. morgendlicher Erststrahlurin (V.a. Urethritis), Mittelstrahlurin (V.a. Pyelonephritis), Ejakulat,
Prostataexprimat.

Trichomonaden

Seit 01.07.2022 ist der molekularbiologische Nachweis von *T. vaginalis* GKV-Leistung (EBM 32852). Der bisher durchgeführte mikroskopische Nachweis mittels Giemsa-Färbung wurde mangels Sensitivität eingestellt.

Optimales Probenmaterial für *T. vaginalis*-Diagnostik:

- Morgendlicher erststrahlurin oder 1. Urinportion nach 4-stündiger Miktionskarenz
- Vaginal-/Zervikalabstrich (ohne Gel)
(Sekret aus dem hinteren Scheidengewölbe, der Vaginalwand und dem Zervikalkanal)
- Urethralabstrich (ohne Gel)
(zuvor angefeuchtet mit sterilem 0,9% NaCl/Aqua dest.)
- Ejakulat (nativ)

3.6 Materialien aus dem Zentralnervensystem (ZNS)

Indikation Meningitis, Enzephalitis, Meningoenzephalitis, Hirnabszess

Material Liquor, Abszessmaterial, Biopsate

Hinweis zur Entnahme

Zusätzlich zu einer Liquorpunktion sollten vor Beginn der Antibiotikatherapie Blutkulturen entnommen werden, siehe 3.1.

Die Liquorpunktion muss unter streng aseptischen Bedingungen erfolgen.

Anzahl der zur Diagnostik benötigten Liquorproben:

Probe (mind. 2 ml) - Bakteriologie

Probe (mind. 1-3 ml) - Bakterien-/Viren-PCR (Probenmenge je nach Anforderungsumfang)

Nativen Liquor für die bakteriologische Untersuchung bei Raumtemperatur und NICHT im Kühlschrank lagern.
Schnellstmöglicher Proben transport ins Labor.

Shuntliquor

Bei V.a. Shuntinfektion wird unter aseptischen Bedingungen Liquor aus ventrikuloperitonealem, ventrikuloatrialem Shunt bzw. aus externer Ableitung durch Shuntpunktion gewonnen.

Abszessmaterial

Abszessaspirat in einer luftfrei verschlossenen Spritze innerhalb kürzester Zeit einsenden, da in vielen Fällen Anaerobier eine ätiologische Rolle spielen. Abstriche sind für die Diagnostik von Hirnabszessen nur bedingt geeignet. Steht nur wenig Eitermaterial zur Verfügung und können deshalb nur Abstriche gewonnen werden, ist der Abstrichtupfer in einem Transportmedium einzusenden.

TBC-Diagnostik: siehe 3.10

3.7 Materialien aus dem Augenbereich

Indikation Konjunktivitis, Endophthalmitis

Material Konjunktivalabstrich (Abstrich in Transportmedium)
Kammerspülwasser, Glaskörperpunktat

Hinweis

Antimikrobielle Augentropfen/-salben 2-3 Tage vorher absetzen. Vor der Abstrichentnahme möglichst keine Lokalanästhetika verwenden, da diese antibakterielle Zusätze enthalten können.

Konjunktivalabstrich

Nach Abheben des Unterlides Konjunktiva mit Tupfer abstreichen, Berührung mit dem Lidrand vermeiden. Bei Ulcera Abstrich vom Geschwürrand entnehmen. Der Abstrichtupfer kann ggf. mit steriler 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet werden.

Punktate

Material in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen einsenden.

Chlamydien-/ Gonokokken-PCR (Untersuchung außerhalb der Akkreditierung)

Nach Wegziehen bzw. Umkappen von Unter-/Oberlid Konjunktiva mehrfach mit Tupfer abstreichen. Tupfer in Röhrchen mit

Spezialmedium überführen und darin belassen.

Lagerung/Transport: 12 Monate (2-30°C)

3.8 Materialien aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich

Indikation Angina, Diphtherie, Keuchhusten, Pharyngitis, Otitis externa/media, Rhinitis, Sinusitis, MRSA-Screening

Material Abstrich mittels Abstrichtupfer mit bzw. ohne Gel (Keuchhusten)

Hinweis

Diagnostik auf Influenza A/B-Viren, SARS-CoV-2 (Corona-Viren), Respiratory-Syncytial-Virus (RSV), Chlamydophila

pneumoniae/psittaci siehe 3.9.1

Nasenabstrich

Sterilen Tupfer ca. 2 cm in ein Nasenloch einführen, Nasenschleimhaut rotierend abstreichen.

Je nach Fragestellung mit

dem selben Tupfer (MRSA) oder neuem Tupfer auch Abstrich vom 2. Nasengang entnehmen.

Probenentnahme bei Sinusitis

siehe unten.

Rachen- /Tonsillenabstrich

Möglichst nicht direkt nach dem Essen. Nach Mundspülung mit desinfizierenden Substanzen mind. 6 Std. Zeitabstand

lassen. Mund mehrmals mit Leitungswasser ausspülen. Zunge mit Spatel herunterdrücken.

Tonsillen und/oder

Rachenhinterwand abstreichen ohne dabei Lippen, Mundschleimhaut oder Uvula zu berühren.

Angina Plaut-Vincent

Mit einem Tupfer Material auf einen Objektträger ausstreichen und luftgetrocknet einsenden. Diphtherie°

Bei Krankheitsverdacht muss für die gezielte Erregersuche das Labor unbedingt vorab telefonisch informiert werden.

Geeignet sind Nasopharyngeal- und Rachenabstriche, die unter laryngoskopischer Kontrolle unterhalb des

abgehobenen pseudomembranösen Belags entnommen oder mit einer Zange abgezupft werden (Vorsicht: Gefahr der

Verlegung der Atemwege). Bereits der V.a. Diphtherie ist meldepflichtig und stellt eine Indikation für die sofortige Antitoxingabe und Antibiotikatherapie dar.
(Bei V.a. eine kutane Infektion mit *C. diphtheriae* sind neben Haut- auch Nasopharyngeal- und Rachenabstriche zu gewinnen.)

Keuchhusten (B. pertussis/parapertussis)

PCR°: Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden)
Rachen- und Nasenabstriche sowie andere Proben aus den Atemwegen sind nicht bzw. nur sehr eingeschränkt geeignet.

Die sterile flexible Abstrichbürste darf vor der Abstrichentnahme nicht in das Transportröhrchen eingetaucht d.h. nicht befeuchtet werden. Abstrichbürste in beide Nasenlöcher tief einführen und unter Drehbewegungen entnehmen. Nach der Probengewinnung Tupfer in das flüssige Transportmedium (0,9%ige NaCl-Lsg.) überführen und den Tupferstiel an der dafür vorgesehenen Einkerbung durch Abbrechen über der Röhrchenkante kürzen, damit der Deckel dicht verschlossen werden kann.
Das Material sollte noch am selben Tag ins Labor transportiert werden, andernfalls ist die Probe bei 2-8°C zu lagern.

Die B. pertussis/parapertussis-PCR kann bis zu 2 Wochen nach Symptombeginn erfolgversprechend eingesetzt werden, bei Kleinkindern bis zu 3 Wochen.

Antikörpernachweis: 1 ml Serum für B. pertussis/parapertussis-Serologie
Nachweis eines signifikanten Antikörperanstiegs (Frühphase und ca. 3-4 Wochen später) bzw. Nachweis eines hohen Antikörpertiters im Serum.

Otitis externa

Ohrmuschel desinfizieren, ggf. Krusten entfernen. Mit einem Tupfer den Gehörgang rotierend abstreichen. Bei trockenen Läsionen kann der Abstrichtupfer mit steriler 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet werden.

Otitis media

Intaktes Trommelfell:	
-----------------------	--

	Die Entnahme eines Gehörgangabstriches bei V.a. Otitis media ist nicht sinnvoll.
Rupturiertes Trommelfell:	Spekulum in Gehörgang einführen, Abstrich entnehmen, Kontakt mit Gehörgangswand vermeiden.
Geschlossenes Trommelfell:	Gehörgang mit einem Tupfer, der mit 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet wurde, säubern. Punktion oder Inzision des Trommelfells mit Aspiration von Mittelohrflüssigkeit. Flüssigkeit in der luftfrei verschlossenen Spritze ins Labor transportieren. Die Tympanozentese nur für diagnostische Zwecke ist allerdings nicht indiziert, Ausnahmen müssen im Einzelfall entschieden werden.

Sinusitis

Nasenabstriche sind wegen der dortigen Standortflora nicht für die Diagnostik einer Sinusitis geeignet. Das Material der Wahl ist Nasennebenhöhlen-Punktat bzw. -Spülflüssigkeit; dieses in der luftfrei verschlossenen Entnahmespritze oder bei größerer Probenmenge in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen ins Labor transportieren.

3.9 Materialien aus dem unteren Respirationstrakt

Indikation Bronchitis, ambulant bzw. nosokomial erworbene Pneumonie, atypische Pneumonie, Influenza A/B, SARS-CoV-2 (Corona-Viren), Mykobakteriose/Tuberkulose

Material Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret, bronchoalveoläre Lavage (BAL), Pleurapunktat, Blutkulturen

Probenlagerung Bei 2-8°C lagern; Probe schnellstmöglich einsenden.

Hinweis

Die Anforderung auf „pathogene Keime“ beinhaltet keinen Nachweis von Legionellen, Mykoplasmen, Chlamydien, Mykobakterien, Pilze, Pneumocystis jirovecii, Bordetella pertussis oder Viren. Diese müssen gesondert angefordert werden.

Sputum

Am besten geeignet ist Morgensputum (vor dem Frühstück). Den Patienten auf eine korrekte

Probengewinnung

(Unterschied Sputum/Speichel) hinweisen. Nur aus der Tiefe abgehustetes Material ist Sputum. Möglichst eitriges

Sputum einsenden (Ausnahme: Immunsuppression, V.a. Legionellen, Pilz-Pneumonie bzw. Tuberkulose).

Bei V.a. Tuberkulose oder Pilz-Pneumonie sollte die Untersuchung an mehreren Tagen - vorzugsweise morgens

gewonnener - Sputumproben (mind. 3) durchgeführt werden.

Der Befund gibt neben den nachgewiesenen Bakterien/Pilzen auch die in der Probe enthaltenen Zellen an; dabei spricht

das Vorhandensein von reichlich Leukozyten bei Fehlen von Plattenepithelien für eine korrekte Sputumgewinnung.

Patientenanleitung zur Sputumgewinnung (Mykobakterien-/Tuberkulosedagnostik siehe auch 3.10)

Sputum ist das Sekret der Atemwege, das beim Husten in den Rachen gelangt und i.d.R. eitrig aussieht. Speichel aus

dem Mundbereich ist für diese Untersuchung ungeeignet. Vorzugsweise morgens gewonnenes Sputum einsenden.

- 1-2 Std. vor der Sputumgewinnung keine Nahrung aufnehmen.
- Wenn Sie morgens spontan husten müssen, versuchen Sie den dabei entstehenden Auswurf in dem Sputumbehälter aufzufangen. Bitte das Auffanggefäß nur von außen anfassen.
- Können Sie nicht spontan Auswurf abhusten, versuchen Sie tief ein- und auszuatmen. Nach jedem Einatmen den Atem für ca. 3-5 Sek. anhalten. Diesen Vorgang möglichst wiederholen. Durch die Atemarbeit wird die Lunge gut entfaltet und die Produktion von Sputum angeregt.
- Erneut tief Luft holen und versuchen, Sputum abzuhusten.
- Tuberkulosedagnostik: Das Abhusten 2- bis 3-mal wiederholen (möglichst große Probenmenge, 2-5 ml).
- Sputumbehälter sofort beim Personal abgeben, damit die Probe rasch ins Labor transportiert werden kann.
- Sollten Sie kein Sputum aus der Tiefe der Lunge abhusten können, informieren Sie den behandelnden Arzt.

Trachealsekret

Bei beatmeten Patienten mit sterilem Katheter das Sekret so weit wie möglich aus den tiefen Abschnitten des Bronchialbaums aspirieren und in ein steriles Schraubverschlussröhrchen geben (mind. 2 ml). Lagerung bei 2-8°C.

Bronchialsekret

Gewinnung über Bronchoskop, ggf. muss vor der Aspiration eine geringe Menge 0,9%iger NaCl-Lösung ohne antibakterielle Zusätze instilliert werden. Unter Sicht gewonnenes eitriges Material aus dem Infektionsherd besitzt eine hohe diagnostische Aussagekraft. Einsendung in sterilem Schraubverschlussröhrchen; Lagerung bei 2-8°C.

Bronchoalveoläre Lavage (BAL)

Die mikrobiologische Diagnostik aus der BAL weist im Vergleich zu der aus Trachealsekret eine höhere Sensitivität und

Spezifität auf und kann eher zwischen Kolonisation und Infektion unterscheiden.

Im Mund-Nasen-Rachenraum und der Trachea befindliche Sekretansammlungen vor Einführen des Bronchoskops

abgesaugen. Vor Gewinnung der Proben keinen Sog anwenden, da sonst die Kontaminationsgefahr erheblich zunimmt.

Anästhesisierende Gele können antimikrobiell wirken.

Zur bronchoalveolären Lavage die Spitze des Bronchoskops in das Bronchuslumen einführen und dieses mit der Spitze

abichten. Nach Instillation von bis zu 160 ml 0,9%iger NaCl-Lösung in das Lumen wird die Flüssigkeit portioniert,

soweit möglich wieder aspiriert, wobei mind. 50 ml Flüssigkeit wiedergewonnen werden sollten. Das 1. Aspirat wird verworfen

(Ausnahme: Suche nach obligat pathogenen Erregern bei abwehrgeschwächten Patienten), das 2. und ggf.

folgende Aspirate entstammen eher der Lungenperipherie.

In der Pädiatrie werden zur Gewinnung der BAL 3-4 x 1 ml/kg KG (bis max. 50 ml/Portion) vorgewärmte 0,9%ige NaCl-

Lösung verwendet. Die zurückgewonnene Flüssigkeit wird zusammengeführt. Davon werden Aliquots zur Erregerdiagnostik

und zur zytologischen Diagnostik verwendet.

Einsendung von 20-30 ml in sterilem Schraubverschlussröhrchen; Lagerung bei 2-8°C. Bitte dem Labor die bei der BAL

instillierten und zurückgewonnenen Flüssigkeitsmengen auf dem Anforderungsschein mitteilen.

Blutkulturen

Bei schweren Pneumonien Blutkulturen (s. 3.1) zusätzlich zu den Proben aus dem unteren Respirationstrakt einsenden.

Pleurapunktat: siehe Punktate 3.13

Allgemeiner Hinweis (unterer Respirationstrakt)

Materialien aus dem Respirationstrakt (Sputum, Trachealsekret) sind häufig mit Keimen der physiologischen Flora kontaminiert wie z.B. alpha-hämolysierende (vergrünende) Streptokokken, Neisserien und Korynebakterien. Von diesen Keimen wird daher i.d.R. keine Resistenztestung durchgeführt. Bei Nachweis von Enterokokken wird ein Antibiogramm erstellt (auch um vancomycinresistente Enterokokken zu identifizieren). Bei Nachweis potentiell pathogener Keime wie z.B. *Pseudomonas* spp., *Enterobacteriaceae* (z.B. *E. coli*, *Klebsiella*) und *Staphylococcus aureus* kann es sich um eine Kolonisation ohne vorliegende Infektion handeln. Bei Vorhandensein einer entsprechenden klinischen Symptomatik und Disposition sollen diese Keime jedoch in eine Antibiose mit eingeschlossen werden.

3.9.1 Hinweise zu einzelnen Erregern

Chlamydophila pneumoniae* bzw. *Chlamydophila psittaci (ehemals *Chlamydia pneumoniae* bzw. *Chlamydia psittaci*)

PCR°: 1. Wahl:	Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden), BAL
2. Wahl:	Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret Antikörpernachweis: 1 ml Serum für <i>Chlamydophila</i> -Serologie

Cytomegalievirus (CMV) - Indikation vorwiegend bei Immunsuppression

PCR°:	BAL
Antikörpernachweis:	1 ml Serum für CMV-Serologie

Influenza A-/B-Viren

RT-PCR:	
---------	--

	Abstrich (Nasopharyngeal, Nase/Rachen) Spezial-Abstrichset „Influenza/Corona“ (keine Gelabstriche!) Bitte keine getrennten Abstriche von Nase und Rachen einsenden! Lagerung bei 2-8°C.
Rachenspülwasser	Sputumbecher mit 10 ml 0,9% NaCl-Lsg. oder frischem Mineralwasser oder Trinkwasser befüllen; gesamte Flüssigkeit in den Rachenraum fließen lassen; mit überstrecktem Kopf ca. 5 Sek. Gurgeln (einfaches Mundspülen ist nicht ausreichend); gesamte Gurgelflüssigkeit im Probengefäß auffangen und Gefäß fest verschließen. Lagerung bei 2-8°C.
	BAL (4 ml), Tracheal-/Bronchialsekret (1-2 ml) Wurde bereits entsprechendes Material gewonnen, sollte dieses zur Diagnostik bevorzugt werden. Lagerung bei 2-8°C.
Antikörpernachweis:	1 ml Serum für Influenza-Serologie; Antikörper werden ab der 2. Krankheitswoche nachweisbar.

SARS-CoV-2-Viren (Corona-Viren)

RT-PCR:	Probenentnahme identisch wie Influenza A-/B-Diagnostik, siehe oben
Probenentnahme identisch wie Influenza A-/B-Diagnostik, siehe oben	1 ml Serum für SARS-CoV-2-Serologie Erste Probe: 1. oder 2. Woche nach Symptombeginn Zweite Probe: ab der 3. Woche nach Symptombeginn

Legionellen

Bei Krankenhauspatienten sollte sowohl der Antigennachweis als auch die Kultur durchgeführt werden.

Antigennachweis°:	5 ml Morgenurin; Der Test weist spezifisch Legionella-Antigen nach und erfasst mit relativ breiter Kreuzreaktivität alle L. pneumophila Serogruppen sowie weitere non-pneumophila-Spezies. Wegen der diskontinuierlichen Antigenausscheidung sollte zur Erhöhung der Nachweisrate Urin von 2-3 verschiedenen Tagen untersucht werden. Bei schweren nosokomialen Pneumonien, die lediglich zu 50% durch L. pneumophila Serogruppe 1 verursacht werden, empfiehlt sich ergänzend die PCR.
-------------------	---

PCR°:	Sputum, Trachealsekret, Bronchialsekret/-lavage
Antikörpernachweis:	1 ml Serum für Legionella-Serologie. Bei ca. 30% aller Patienten bleibt die Antikörperbildung völlig aus, somit können fehlende Antikörper eine Legionellose nicht ausschließen.

Mycoplasma pneumoniae

PCR°:	1. Wahl: Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden), BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
Antikörpernachweis:	1 ml Serum für Mycoplasmen-Serologie

Mykobakterien/Tuberkulose: siehe 3.10

Pneumocystis jirovecii° - Indikation vorwiegend bei Immunsuppression

PCR°:	1. Wahl: BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
-------	--

Respiratory-Syncytial Virus (RSV)

RT-PCR°:	1. Wahl: Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden), BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
----------	---

Die sterile flexible Abstrichbürste darf vor der Abstrichentnahme nicht in das Transportröhrchen eingetaucht d.h. nicht befeuchtet werden. Abstrichbürste in beide Nasenlöcher tief einführen und unter Drehbewegungen entnehmen. Nach der Probengewinnung Tupfer in das flüssige Transportmedium (0,9%-iger NaCl-Lsg.) überführen und den Tupferstiel an der dafür vorgesehenen Einkerbung durch Abbrechen über der Röhrchenkante kürzen, damit der Deckel dicht verschlossen werden

kann.

Das Material sollte noch am selben Tag ins Labor transportiert werden, andernfalls ist die Probe bei 2-8°C zu lagern.

Antikörpernachweis: 1 ml Serum für RSV-Serologie

Verfügt im Akutstadium über keine Aussagekraft. Dauer bis zur Antikörperbildung: 8-10 Tage

3.10 Mykobakterien / Tuberkulose°

Indikation Pulmonale/extrapulmonale Tuberkulose, Infektion durch Nicht-Tuberkulöse Mykobakterien (NTM)

Material Siehe Tabelle „Hinweise zur Entnahme / Lagerung“ auf der folgenden Seite
Können Proben nicht sofort weitergeleitet werden, sind sie bei 2-8°C aufzubewahren.

Probenanzahl *Diagnosestellung:* Je nach Material mind. 3 Proben von 3 verschiedenen Tagen (optimal: 3x Kultur + PCR von 1. Probe; falls PCR negativ → PCR auch von den anderen beiden Proben)

Therapiekontrolle: Kontrollen im Abstand von ca. 2-4 Wochen in Abhängigkeit Verlauf und der antituberkulösen Therapie.

Mikroskopie

Der mikroskopische Nachweis von säurefesten Stäbchen ist die schnellste Nachweismethode, wobei allerdings die Zuverlässigkeit der Mikroskopie von der Keimdichte im Material abhängig ist. Da der Nachweis von säurefesten Stäbchen nicht in jedem Fall mit dem Nachweis von Tuberkulosebakterien gleichgesetzt werden kann, lautet der Befund: „Säurefeste Stäbchen mikroskopisch nachgewiesen bzw. nicht nachgewiesen“.
Untersuchungsdauer: 1 Tag

Kultur

Der kulturelle Nachweis von Mykobakterien stellt nach wie vor den Goldstandard in der Tuberkulose-Diagnostik dar und sollte bei V.a. Tuberkulose stets durchgeführt werden.

Untersuchungsdauer: bis zu 8 Wochen

Die Abgrenzung von Tuberkulosebakterien gegenüber „Nicht-Tuberkulösen Mykobakterien (NTM)“ erfolgt mittels Mycobacterium-tuberculosis-Komplex-PCR.

Mycobacterium-tuberculosis-Komplex-PCR

Molekularbiologischer Direktnachweis aus diverser Untersuchungsmaterial sowie Bestätigungstest bei positiver Kultur.

Untersuchungsdauer: 3-5 Tage

Hinweise zur Entnahme / Lagerung (Kultur / PCR)

Untersuchungsmaterial	Menge	Probengewinnung / Transport
Sputum (steriles 50 ml-Röhrchen)	2-5 ml	Gewinnung: durch Abhusten aus den tiefen Atemwegen; Speichel und 24 Std.-Sammel Sputum sind ungeeignet. Es ist lediglich zulässig, Sputum aus mehreren Hustenstößen innerhalb 1 Std. in einem Gefäß aufzufangen. Gewinnung möglichst morgens nüchtern vor dem Zähneputzen oder Gurgeln, um Kontamination mit Nicht-Tuberkulösen Mykobakterien (NTM) aus dem Leitungswasser zu vermeiden. Alternativen, wenn kein Sputum abgehustet werden kann: 1. Erwachsene und Jugendliche: Bronchoskopie 2. Kleine Kinder: Gewinnung von Magennüchternsekret oder -spülwasser 3. Sputuminduktion durch Inhalation von 5-10%iger NaCl-Lsg.; Vorsicht: Infektionsgefahr des Personals durch Aerosolbildung Bei Erwachsenen ist die Bronchoskopie, bei Kindern Magennüchternsekret oder -spülwasser der Sputuminduktion vorzuziehen.
Bronchialsekret (steriles 50 ml-Röhrchen)	2-5 ml	Bronchoskopische Gewinnung; Trachealsekret von intubierten Patienten oder Patienten mit Trachealtubus ist weniger sinnvoll.
Bronchoalveoläre Lavage (BAL) (steriles 50 ml-Röhrchen)	20-30 ml	Gezielt in der Nähe verdächtiger Herde

Geschützte Bürste bzw. bronchoskopisch gewonnene Biopsien (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)		Wegen der Gefahr der Austrocknung ca. 1 ml sterile 0,9%ige NaCl-Lsg. zusetzen.
Pleurapunktat (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	Entnahme einer möglichst großen Probenmenge, da in diesen Proben Mykobakterien oft nur in sehr geringen Mengen vorkommen. Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulanzen erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulanzen richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
Magennüchternsekret Magenspülwasser (steriles 50 ml-Röhrchen mit vorgelegtem Phosphatpuffer zur Neutralisierung der Magensäure)	2-5 ml 20-30 ml	Bei kleinen Kindern Magennüchternsekret/-spülwasser entnehmen; bei Jugendlichen und Erwachsenen Sputum oder bronchoskopisch gewonnene Proben vorziehen; Transportröhrchen mit vorgelegtem Phosphatpuffer verwenden. Gewinnung: Morgens nüchtern vor dem Zähneputzen oder Gurgeln, um Kontamination mit Nicht-Tuberkulösen Mykobakterien (NTM) aus dem Leitungswasser zu vermeiden.
Urin (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	<i>Morgenurin</i> nach Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr am Vorabend; kein 24 Std.-Sammelurin, nicht aus Urinauffangbeuteln, bei Säuglingen können Einmalklebebeutel verwendet werden
	2 ml	

Menstrualblut (wenig sensitiv!) (steriles 50 ml-Röhrchen) Ausschabungsmaterial (viel ausagekräftiger!) (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)		Gynäkologisch gewonnenes Menstrualblut etwa zu gleichen Teilen mit sterilem Aqua dest. versetzen. So viel Untersuchungsgut wie möglich. Immer mikroskopisch, kulturell, molekularbiologisch sowie histologisch untersuchen!
Sperma, Prostatasekret (steriles 30 ml-Röhrchen)	2 ml	In sterilen Probengefäßen auffangen, ohne Zusatz versenden.
Liquor (steriles 30 ml-Röhrchen)	3-5 ml	Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
Sonstige Körperflüssigkeiten aus primär sterilen Kompartimenten Punktat / Aspirat / Exsudat (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	Entnahme einer möglichst großen Probenmenge, da in diesen Proben Mykobakterien oft nur in sehr geringen Mengen vorkommen. Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
Knochenmark Biopsat / Aspirat (steriles 50ml-Röhrchen)		Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen.

		Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
Gewebe, Biopsat (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)		So viel Untersuchungsgut wie möglich (möglichst mehrere steril entnommene Gewebeproben) gewinnen. Bei V.a. auf Mykobakteriose der Haut: Wund-/Ulkusbereich sowie angrenzende Hautareale gründlich desinfizieren. Vom Wundrand 1 cm lange Gewebespinde oder mind. 4 mm Stanzbiopsie, die jeweils bis in die Subkutis reichen, entnehmen. Zur Vermeidung einer Kontamination mit Hautflora ist der unmittelbare Übergang zu nicht betroffener Haut von der Probenentnahme auszuschließen. In einer adäquaten Menge steriler 0,9%iger NaCl-Lsg. transportieren. Nicht mit Formalin fixieren! Gewebe/Biopsate sollten immer mikroskopisch, kulturell, molekularbiologisch sowie histologisch untersucht werden.
Blut	5-10 ml	Nur sinnvoll bei Patienten mit schwerem zellulären Immundefekt z.B. Organ-/Knochenmarkstransplantierte, HIV-Patienten mit V.a. M. avium-Sepsis Abnahme in Citrat-Röhrchen; nicht in Blutkulturflasche einspritzen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin

		hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
Stuhl (Stuhlröhrchen)		Stuhlproben sind zum Nachweis von Mykobakterien (auch MOTT) nicht optimal geeignet. Alternative Probenentnahme: Darmbiopsie - Nur sinnvoll bei Patienten mit zellulärem Immundefekt z.B. HIVPatienten mit V.a. Nicht-Tuberkulöse Mykobakterien (NTM) - Bei V.a. Darmtuberkulose sind Biopsien möglichst aus Darmgeschwüren einschmelzender Peyer-Plaques zu entnehmen.
Abstrichtupfer		Abstrichtupfer sind zum Nachweis von Mykobakterien im Regelfall nicht geeignet. Alternative Probenentnahmen: Aspiration, Punktion, Biopsie, Geschabsel (so viel Untersuchungsgut wie möglich).

Interferon-gamma-release Assay (IGRA) - QuantiFERON-TB Gold

Der Test beruht auf der Freisetzung des Zytokins Interferon-gamma durch T-Lymphozyten, die Antigene von *M. tuberculosis* erkennen. Die verwendeten Antigene sind spezifisch für *M. tuberculosis* (Ausnahmen: *M. kansasii*, *M. szulgai*, *M. marinum*, *M. gastrii*, *M. flavescens*). Eine frühere BCG-Impfung sowie Exposition gegenüber den meisten Umweltmykobakterien werden vom IGRA-Test nicht erkannt, daraus resultiert eine deutlich höhere Spezifität im Vergleich zum Tuberkulin-Hauttest. Ein positives Ergebnis zeigt eine Infektion mit *M. tuberculosis* an, jedoch ohne Unterscheidung, ob es sich um eine aktive oder latente Tuberkulose handelt.

Indikation	• Ausschlussdiagnostik einer aktiven oder latenten TBC • Umgebungsuntersuchung von TB-Kontaktpersonen • Screening von Mitarbeitern im Gesundheitswesen auf eine frühere TB-Infektion • Geeignet für wiederholte Untersuchungen z.B. nach TB-Kontakt • Ausschluss einer latenten TB-Infektion (LTBI) vor einer immunsuppressiven Therapie • Screening von immundefizienten Patienten, z.B. Dialyse, HIV, hämatologische Patienten
-------------------	---

	Ersetzt / bestätigt Tuberkulin-Hauttest. GKV-Patienten: Kassenleistung nur bei bestimmten Indikationen s. EBM 32670
Hinweis	Quantiferon-TB Gold-Set: 4 Quantiferon-Spezialröhrchen (Lagerung 4-25°C)
Probengewinnung	Vor Blutentnahme Spezialröhrchen auf Raumtemperatur bringen. Korrekte Blutentnahme/Befüllung der Röhrchen nach Anleitung. Röhrchen in der Originalverpackung zusammen mit dem ausgefüllten Fragebogen + Anforderungsschein noch am selben Tag ins Labor.
Bearbeitungszeit:	1 Woche

3.11 Haut und subkutane Weichteile, Abszesse, Gewebeproben

Indikation	Weichteilinfektion, Abszess, Eiter, postoperative Wundinfektion, Bissverletzung
Hinweis	Proben möglichst vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie gewinnen.
Probenlagerung	Bei 2-8°C lagern.

Hinweise zur Entnahme / Lagerung

Untersuchungsmaterial	Probengewinnung / Transport
Eiter / Sekret aus Abszessen und anderen geschlossenen exsudatreichen Infektionsherden Empyem / Gangrän / Hautpustel	<i>Abszesse</i> Bei Abszessen, die zur Eröffnung anstehen, sollte vorher Material für die mikrobiologische Untersuchung durch perkutane Punktion unter aseptischen Bedingungen gewonnen werden. Keine Punktion über die Schleimhäute, wenn eine Punktion von der Haut aus möglich ist (dichtere bakterielle Besiedlung von Schleimhäuten). Gelingt dies nicht, ist bei der Inzision unter aseptischen Bedingungen Abszessinhalt in ausreichender Menge mit einem chirurgischen Löffel oder einer Spritze aufzunehmen. Da Eiter größtenteils abgestorbene Erreger enthält und mikrobizid wirkt, sollte zusätzlich ein Gewebestückchen aus dem Granulationsgewebe der Abszesswand (falls möglich bis zu 1 cm³) in einem sterilen

	Schraubverschlussröhrchen mit Zugabe von 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg. eingesandt werden. Alternativ kann der Rand und Grund der Läsion gründlich abgestrichen werden. <i>Transport</i> > 0,5 ml Sekret/Eiter: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) oder in sterilem Schraubverschlussröhrchen einsenden. < 0,5 ml Sekret/Eiter: Material mit Abstrichtupfer aufnehmen und im Transportmedium (Gel) versenden. Exsudatarne Prozesse (z.B. Hautpusteln/-bläschen) Nach Oberflächendesinfektion in eine kleine Spritze aufziehen (evtl. Instillation steriler 0,9%iger NaCl-Lsg., sofortige Aspiration mit derselben Spritze). <i>Transport</i> > 0,5 ml Probe: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) oder in sterilem Schraubverschlussröhrchen einsenden. < 0,5 ml Probe: Material mit Abstrichtupfer aufnehmen und im Transportmedium (Gel) versenden.
Exsudate aus offenen Wunden einschließlich Bisswunden, Haut-/ Schleimhautulzerationen	Oberflächliches Sekret mit sterilem Tupfer aufnehmen, oberflächlichen Schorf / fibrinöse bzw. nekrotische Beläge abheben, Wundränder desinfizieren, Wundgrund und Randbezirke der Läsion kürettieren. Exsudat mit steriler Spritze aspirieren oder mit sterilem Abstrichtupfer aufnehmen. <i>Transport</i> > 0,5 ml Probe: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) oder in sterilem Schraubverschlussröhrchen einsenden.

	< 0,5 ml Probe: Material mit Abstrichtupfer aufnehmen und im Transportmedium (Gel) versenden.
Trockene Wunden, trockene Haut-/ Schleimhautulzerationen	Exzisionsmaterial ist am besten geeignet (falls möglich bis zu 1 cm³). Wund-/Ulkusbereich sowie angrenzende Hautareale gründlich desinfizieren. Vom Wundrand 1 cm lange Gewebespinde oder mind. 4 mm Stanzbiopsie, die jeweils bis in die Subkutis reichen, entnehmen. Zur Vermeidung einer Kontamination mit Hautflora ist der unmittelbare Übergang zu nicht betroffener Haut von der Probenentnahme auszuschließen. <i>Transport</i> In sterilem Schraubverschlussröhrchen mit Zugabe von 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg.
Phlegmonöse Prozesse	Probeexzision aus Entzündungsrand (falls möglich bis zu 1 cm³) nach Desinfektion der Hautoberfläche. <i>Transport</i> In sterilem Schraubverschlussröhrchen mit Zugabe von 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg.
Fisteln	Fistelöffnung reinigen und desinfizieren. Dünnen, sterilen Katheter so weit wie möglich einführen und aus der Tiefe Exsudat ansaugen. Gelingt dies nicht, sollte Gewebe aus tiefergelegenen Anteilen der Wand des Fistelganges mit einer Kürette abgeschabt werden. In chronischen Entzündungsprozessen ist die Erregerkonzentration häufig geringer, sodass hier auf ein ausreichend großes Probenvolumen zu achten ist.

	<i>Transport</i> Flüssiges Sekret: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) einsenden. Kürettage: In sterilem Schraubverschlussröhrchen mit 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg.
Chronisch granulomatöse Prozesse z.B. Aktinomykose, Osteomyelitis, (nicht-tuberkulöse) Mykobakteriose	Biopsiematerial (falls möglich bis zu 1 cm³), ggf. Punktat (möglichst > 1ml) Biopsie: Betroffenen Bereich sowie angrenzende Hautareale gründlich desinfizieren. Vom Wundrand 1 cm lange Gewebespindel oder mind. 4 mm Stanzbiopsie, die jeweils bis in die Subkutis reichen, entnehmen. Zur Vermeidung einer Kontamination mit Hautflora ist der unmittelbare Übergang zu nicht betroffener Haut von der Probenentnahme auszuschließen. <i>Transport</i> <i>Biopsie:</i> In sterilem Schraubverschlussröhrchen mit 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl. <i>Punktat:</i> > 0,5 ml: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) oder in sterilem Schraubverschlussröhrchen einsenden. < 0,5 ml: Material mit Abstrichtupfer aufnehmen und im Transportmedium (Gel) versenden.

Wenn bei komplizierten Wunden Fieber auftritt, sollten zusätzlich Blutkulturen entnommen werden. Dies gilt ebenso für ältere oder immunsupprimierte Patienten, wenn andere Zeichen einer Bakteriämie oder Sepsis auftreten (z.B. Verschlechterung des Allgemeinzustands, plötzliche Teilnahmslosigkeit, Desorientiertheit, Sinken des Blutdrucks), da diese Patienten nicht immer Fieber oder eine Leukozytose entwickeln.

3.12 Knochen und Knorpel

Indikation Periprothetische Infektionen, Arthritis, Osteomyelitis

Hinweise zur Entnahme / Lagerung

Probenentnahme möglichst vor Beginn einer antibiotischen Therapie. Bei subakuten Infektionen, insbesondere bei prothetischem Gelenkersatz, ist eine 10- bis 14-tägige Therapiepause vor Probengewinnung sinnvoll. Materialentnahme unter aseptischen Bedingungen. Nach Möglichkeit 10-20 ml Flüssigkeit oder 1-2 cm³ Gewebe einsenden.

Die Untersuchung multipler Materialien aus unterschiedlichen Abschnitten des infizierten Bereichs ist unbedingt anzustreben (möglichst 3, idealerweise 5-6), da dies die Sensitivität erhöht und insbesondere bei Implantat-assoziierten Infektionen eine Unterscheidung zwischen pathogenen oder kontaminierenden Isolaten erlaubt. Die Abnahme eines nur einzelnen Abstrichtupfers zur mikrobiologischen Untersuchung verschlechtert die Keimnachweisrate deutlich.

Probe schnellstmöglich ins Labor transportieren. Bei einer Lagerungsdauer über 2 Std. z.B. nachts oder am Wochenende, Punktate in eine aerobe/anaerobe Blutkulturflasche (möglichst jeweils 5-10 ml) inokulieren. Für eine mikroskopische Beurteilung ist die zusätzliche Einsendung von ca. 0,5 ml nativem Punktat in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen erforderlich. Der Transport von Gewebeproben sollte in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen unter Zusatz von 0,5-1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lsg. erfolgen, um eine Austrocknung zu vermeiden.

Ungeeignetes Probenmaterial

Nach Möglichkeit keine Abstrichtupfer einsenden, da hiermit nur minimale Probenmengen gewonnen werden können und diese nicht von ausreichender diagnostischer Sensitivität sind. Der Stellenwert von oberflächlichem Gewebematerial, das bei der Revision von Grad III oder IV verschmutzten Wunden gewonnen wurde, ist meist gering, da die hierdurch erhaltenen Kulturergebnisse kein zuverlässiges Abbild bestehender Infektionen des tiefen Gewebes darstellen.

Geeignetes Probenmaterial

Intraoperativ entnommenes Gewebe: Hierbei sollte auch Gewebe aus dem Knochenzement-Bereich sowie evtl. nachweisbares Abszess- oder Sequestermaterial gewonnen werden. Da Knochen- und

Weichteilgewebestücke vor kultureller Anlage homogenisiert werden müssen, sind sie bereits bei Entnahme so zu dimensionieren, dass sie in den üblichen Transportgefäßen transportiert und anschließend homogenisiert werden können (ca. 1-2 cm³).

Periprothetische Infektionen

Gelenkpunktat entnehmen (siehe 3.13); bei operativer Revision sollte Implantatmaterial (Knochenzement, Implantat) untersucht werden. In jedem Fall sind bei Prothesenrevision oder -entfernung multiple Materialentnahmen von unterschiedlichen Bereichen der Implantatumgebung erforderlich.

Knochenbiopsie

Kulturergebnisse aus oberflächlichem Weichteilgewebe entsprechen nicht zuverlässig den Ergebnissen aus tiefen Knochenbiopsien. Eine Knochenbiopsie kann sowohl als chirurgische Biopsie als auch als transkutane Nadelbiopsie erfolgen. Bei letzterer ist zur Optimierung der Materialmenge die Verwendung einer dickeren Nadel einer Feingewebsnadel vorzuziehen. Bei dieser Entnahmetechnik kann es jedoch zu einer Kontamination durch Weichteilgewebe kommen, deshalb sollte als Zugang klinisch uninfiziertes Weichteilgewebe gewählt werden. Bei Weichteilinfektionen sollte zusätzlich zur Knochenbiopsie auch Weichteilgewebe (durch Biopsie und nicht durch oberflächlichen Abstrich) asserviert werden, um die Wahrscheinlichkeit der Isolierung aller potenziellen Pathogene zu erhöhen. Die Menge des gewonnenen Materials beeinflusst die diagnostische Sensitivität.

Fistelgangsekret oder andere primär nicht sterile Materialien

Diese können die Untersuchung von Biopsiematerial ergänzen, jedoch im Regelfall nicht ersetzen. Entnahme von Fistelgangsekret siehe 3.11.

V.a. bakterielle Arthritis

Blutkulturen siehe 3.1, Gelenkpunktat siehe 3.13, Synovialisbiopsie

V.a. hämatogene Osteomyelitis

Blutkulturen siehe 3.1

3.13 Punktate aus primär sterilen Bereichen (Gelenk-, Pleura-, Perikard-, Aszitespunktat)

Indikation Arthritis, Pleuritis, Perikarditis, Peritonitis

Material Gelenk-, Pleura-, Perikard-, Aszitespunktat

Hinweise zur Entnahme / Lagerung

Proben möglichst vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie gewinnen. Punktion unter aseptischen Bedingungen.

So viel Material wie möglich (10-20 ml) in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen schnellstmöglich einsenden. Die Einsendung eines mit Punktat benetzten Abstrichtupfers kann zu einer unnötig niedrigen Keimnachweisrate führen. Keine Flüssigkeiten in Abstrichröhrchen füllen, da diese nicht dicht schließen und somit die Gefahr einer Kontamination bzw. des Auslaufens besteht. Ist nur < 0,5ml Punktat vorhanden, soll das Material mit einem Abstrichtupfer aufgenommen und im Transportmedium eingesandt werden.

Probenlagerung Natives Punktat bei 2-8°C lagern.

3.14 Pilznachweis (Hefe-, Schimmelpilze, Dermatophyten)

Hefen und Schimmelpilze

Hinweise zur Entnahme: Bei Infektionen der Haut/Schleimhaut sterilen Abstrichtupfer mit steriler 0,9 %iger NaCl-Lsg. anfeuchten und ohne vorherige Desinfektion Material von entzündlichen Stellen (insbesondere von Randbezirken) entnehmen und in Transportmedium überführen. Materialien wie z.B. respiratorische Sekrete, Urin, Stuhl, Punktate eignen sich ebenfalls zur Diagnostik.

Dermatophyten

Indikation Infektionen von Haut, Haaren, Nägeln

Hinweise zur Entnahme: Bei Infektionen der Haut/Schleimhaut sterilen Abstrichtupfer mit steriler 0,9 %iger NaCl-Lsg. anfeuchten und ohne vorherige Desinfektion Material von entzündlichen Stellen

(insbesondere von Randbezirken)
entnehmen und in Transportmedium (Gel) überführen. Materialien wie z.B. Urin, Stuhl, Punktate, BAL, Bronchial-/Trachealsekret eignen sich ebenfalls zur Diagnostik.

Dermatophyten

Indikation Infektionen von Haut, Haaren, Nägeln

Hinweise zur Entnahme: Abstriche sind ungeeignet zum Nachweis von Dermatophyten. Es sollen sterile Instrumente verwendet werden, wie Skalpell, scharfer Löffel, Nagelfeile, Epilationspinzette. Entnahmestelle vor der Probengewinnung desinfizieren, um die kontaminierende Begleitflora zu reduzieren. Material in ein steriles Behältnis ohne Medium überführen.

Haut

Alle Auflagerungen, auch lose anhaftende Hautschuppen, entfernen. Anschließend mit sterilem Skalpell oder scharfem Löffel vom Rand des Herdes möglichst viele (30-40) Schüppchen abschaben.

Nägel

Zunächst alle leicht ablösbaren bröckeligen Teile entfernen (Pilzdichte gering). Mit sterilem Skalpell oder kleinem scharfen Löffel Material aus den befallenen Arealen der Nagelplatte unter Einbeziehung der tieferen Nagelpartien nahe dem Nagelbett und von den subungualen Hyperkeratosen ablösen (möglichst 30-40 Nägelspäne). Nicht geeignet ist ein mit der Schere abgeschnittenes Stück vom Nagelrand.

Haare

Evtl. vorhandene Krusten und grobe Schuppen entfernen. Einige Haarstümpfe mit Epilationspinzette entnehmen. Wichtig ist das Vorhandensein der Haarwurzel. Auffällige Haare für die Probengewinnung bevorzugen. Abgeschnittene Haarbüschel sind nicht geeignet.

Dermatophyten-Kulturen werden bis zu 4 Wochen bebrütet, zur Speziesdiagnose evtl. weitere 1-3 Wochen.
Werden Dermatophyten nachgewiesen, ist dies generell als pathologisch zu werten.

Allerdings können auch Nicht-Dermatophyten Hautmykosen verursachen, z.B. *Candida* spp. (Hefepilz) und *Scopulariopsis* spp. (Schimmelpilz).

IV. Multiresistente Keime

4.1 Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA)

MRSA ist die Abkürzung für „Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus*“. Methicillin entspricht dem in Deutschland verwendeten Oxacillin. Daher wird auch teilweise die Bezeichnung „ORSA“ (Oxacillin-resistenter *Staphylococcus aureus*) verwendet. Methicillinresistenz bei Staphylokokken beruht auf der Bildung des veränderten Penicillin-bindenden Proteins (PBP2a). Dies bedingt, dass alle β -Laktam-Antibiotika (Penicilline, Cephalosporine, Carbapeneme) sowie Kombinationen mit β -Laktamase-Inhibitoren (Sulbactam, Clavulansäure, Tazobactam) klinisch unwirksam sind. MRSA-Stämme spielen eine große Rolle als Verursacher nosokomialer Infektionen, wie z.B. Wundinfektionen, Pneumonien, Katheterinfektionen. MRSA-Stämme können jedoch auch als reine Besiedler (Kolonisation) auftreten.

Für die MRSA-Diagnostik stehen der kulturelle Nachweis sowie die MRSA-PCR zur Verfügung.

Wird die Untersuchung sowohl mittels PCR als auch kulturell gewünscht, ist die Entnahme von zwei separaten Abstrichen zur Erhöhung der Sensitivität sinnvoll. Dieses kombinierte Vorgehen empfiehlt sich beispielsweise bei Wundabstrichen, bei denen auch die Erstellung eines Antibiotogramms erforderlich ist und/oder bei denen auch auf das Vorhandensein anderer pathogener Keime untersucht werden soll.

MRSA-Kultur

Die Kultur ist sowohl als Screeningmethode, als auch zur Sanierungskontrolle geeignet. Als Materialien kommen alle möglichen menschlichen Untersuchungsproben infrage. Für Abstriche sind Abstrichtupfer mit Transportmedium (Gel) zu verwenden.

MRSA-PCR

Die PCR ist eine reine Screeningmethode. Sie ist nicht zur Sanierungskontrolle geeignet, da die DNA evtl. noch länger nachweisbar sein kann. Es können sowohl Abstrichtupfer mit Transportmedium (Gel) als auch trockene Abstrichtupfer

verwendet werden. Geeignet sind vor allem Abstriche von Nasevorhof bds., Rachen, Axilla bds., Leiste bds., Rektal sowie Hautläsion/Wunde.

MRSA-Screening

Das Screening kann sowohl kulturell als auch mittels PCR erfolgen. Es sollte mindestens die Nasenvorhöfe, den Rachen sowie ggf. Hautläsion/Wunde umfassen; jeder zusätzliche Abstrichort (Axilla bds., Leiste bds., Rektal) erhöht die MRSA

Sanierungskontrolle

Die Sanierungskontrolle sollte ausschließlich kulturell erfolgen. Die PCR ist hierfür nicht geeignet, da die Nukleinsäure (DNA) evtl. noch länger nachweisbar sein kann.

Stationäre Patienten:

Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit im Krankenhaus, kann die erste Abstrichserie schon am Folgetag nach Beendigung der Eradikationsmaßnahmen (z.B. Nasensalbe, antiseptische Waschungen) bzw. Einnahme MRSA-wirksamer Antibiotika erfolgen. Für die Entisolierung sind 3 negative Abstrichserien an aufeinanderfolgenden Tagen erforderlich (von allen zuvor MRSA-positiven Lokalisationen). Während des stationären Aufenthaltes sind danach noch tägliche Kontrollen sinnvoll. Weitere Kontrollen nach Entlassung sollten nach 3 und 12 Monaten erfolgen.

Ambulante Patienten:

Die erste Abstrichserie sollte frühestens am 3. Tag nach Abschluss der Eradikationsmaßnahmen (z.B. Nasensalbe, antiseptische Waschungen) bzw. am 3. Tag nach Beendigung der Einnahme MRSA-wirksamer Antibiotika erfolgen.

Zunächst nur eine Abstrichserie (von allen zuvor MRSA-positiven Lokalisationen). Ist kein MRSA nachweisbar, gilt der

Patient als vorläufig MRSA-negativ. Im ambulanten Bereich sind in dieser Phase keine besonderen hygienischen Maßnahmen erforderlich.

Weitere Kontrollen sollten zwischen dem 3.-6. Monat sowie nach 12 Monaten erfolgen.

Als **MRSA-frei** gilt eine Person, bei der nach 12 Monaten die Abstriche weiterhin MRSA-negativ bleiben. Der Patient hat jedoch eine positive MRSA-Anamnese, die auch bei Krankenhausaufnahme anzugeben ist. In diesem Fall sollte ein erneutes

MRSA-Screening erfolgen (1 Abstrichserie); bis zum MRSA-Ausschluss ist der Patient prophylaktisch zu isolieren.

Nach Sanierungsversagen sollte auf jeden Fall zusätzlich ein tiefer Rektalabstrich entnommen werden, da ca. 10% der MRSA-Träger in diesem Bereich besiedelt sind. Bei MRSA-kolonisierten Schwangeren sollte zusätzlich ein Vaginalabstrich auf MRSA untersucht werden

MRSA Hygienemaßnahmen

Maßnahmen, die beim Auftreten von MRSA in klinischen Einrichtungen getroffen werden müssen, sind im Einzelfall festzulegen, im Allgemeinen wird jedoch u.a. folgendes empfohlen (siehe www.rki.de):

- Ein MRSA-Screening sollte bei bestimmten Risikopatienten durchgeführt werden (z.B. Aufnahme aus Einrichtungen mit hoher MRSA-Rate, aus Brandverletzten-Zentren, Pflegeheimen, Dialyseeinrichtungen etc.).
- MRSA-Patienten sollten räumlich getrennt von anderen Patienten untergebracht werden.
- Eine gemeinsame Unterbringung von MRSA-Patienten ist möglich (Kohortenisolierung).
- Bei festgestellter MRSA-Kolonisierung sollte ein Sanierungsversuch unternommen werden (z.B. Nasensalbe, antiseptische Waschungen).
- Transporte von MRSA-Patienten sollten streng indiziert erfolgen.
- Eine Entlassung des Patienten kann trotz MRSA-Besiedlung erfolgen, der weiterbehandelnde Arzt bzw. die Pflegeeinrichtung muss jedoch informiert werden.
- MRSA-Träger unter dem Personal sollten nach Möglichkeit bis zur nachgewiesenen Sanierung keine Patienten behandeln und pflegen.

4.2 Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE)

Enterokokken (*E. faecalis*, *E. faecium*) spielen in den letzten Jahren zunehmend eine Rolle als Erreger nosokomialer Infektionen

(z.B. Bakteriämie, Katheterinfektionen). Es treten dabei immer häufiger Enterokokken mit einer Resistenz gegen

Glykopeptide (Vancomycin, Teicoplanin) auf, die auch als „Vancomycinresistente Enterokokken (VRE)“ bezeichnet werden.

Bei Patienten, die mit einem VRE-Stamm kolonisiert sind, sollten entsprechende Hygienemaßnahmen durchgeführt werden

(Einzelzimmer, Kittelpflege etc.). Das Tragen eines Mund/Nasenschutzes ist allerdings meist nicht erforderlich.

Zum VRE-Screening eignen sich tiefe Rektalabstriche.

Gewinnung Rektalabstrich: Vorsichtig, aber ausreichend tief im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen. Beim Auftreten multiresistenter Keime sollten die krankenhausinternen Hygienemaßnahmen beachtet werden (Details siehe auch www.rki.de).

4.3 Multiresistente gramnegative Erreger (MRGN)

Antibiotikagruppe	Leitsubstanz	Enterobacterales		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter baumannii</i>	
		3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²
Acylureidopenicilline	Piperacillin	R	R	Nur eine der 4 Antibiotikagruppen wirksam (S oder I)	R	R	R
3./4. Generations-Cephalosporine	Cefotaxim und/oder Ceftazidim	R	R		R	R	R
Carbapeneme	Imipenem und/oder Meropenem	S oder I	R		R	S oder I	R
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	R	R		R	R	R
			oder Nachweis einer Carbapenemase ³		oder Nachweis einer Carbapenemase ³		oder Nachweis einer Carbapenemase ³

Zum MRGN-Screening eignen sich tiefe Rektalabstriche.

Gewinnung Rektalabstrich: Vorsichtig, aber ausreichend tief im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen. Beim Auftreten multiresistenter Keime sollten die krankenhausinternen Hygienemaßnahmen beachtet werden (Details siehe auch www.rki.de).

V. Antibiogramme

Im folgenden ist eine Auswahl routinemäßig getesteter Antibiotika diverser Hersteller aufgelistet. Auf Wunsch können, wenn verfügbar, weitere antimikrobielle Chemotherapeutika ausgetestet werden. Bei Auftreten von Multiresistenzen wird das Spektrum der Antibiotika routinemäßig durch zusätzliche Austestung geeigneter Chemotherapeutika erweitert.

5.1 Antibiogramm bei grampositiven Keimen

Wirkstoff	Handelsname
Penicillin	Megacillin, Isocillin
Ampicillin	Binotal
Ampicillin/Sulbactam	Unacid
Oxacillin	Staphylex

Cefazolin	Cefazolin
Cefuroxim	Elobact, Zinnat
Imipenem	Zienam
Ciprofloxacin	Ciprobay
Levofloxacin	Tavanic
Moxifloxacin	Avalox
Doxycyclin	Vibramycin, Doxycyclin
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin
Erythromycin	Paediathrocin, Infectomycin
Clindamycin	Sobelin
Cotrimoxazol	Kepinol, Eusaprim
Vancomycin	Vancomycin

5.2 Zusätzliche Antibiotika bei MRSA- bzw. VRE-Nachweis

Wirkstoff	Handelsname
Teicoplanin	Targocid
Linezolid	Zyvoxid
Daptomycin	Cubicin
Quinopristin/Dalfopristin	Synercid
Fusidinsäure	Fucidine
Fosfomycin	Infectofos
Rifampicin	Rifa

Rifampicin und Fosfomycin sind mögliche Kombinationspartner von Vancomycin bzw. Teicoplanin.

Mit Linezolid ist eine Monotherapie von MRSA- bzw. VRE-Infektionen möglich.

5.3 Antibiogramm bei gramnegativen Keimen

Wirkstoff	Handelsname
Ampicillin	Binotal
Mezlocillin	Baypen
Ampicillin/Sulbactam	Unacid
Amoxicillin/Clavulansäure	Augmentan
Piperacillin/Tazobactam	Tazobac
Cefuroxim	Elobact, Zinnat

Cefpodoxim	Orelox, Podomexef
Ceftriaxon	Rocephin
Ceftazidim	Fortum
Imipenem	Zienam
Meropenem	Meronem
Ciprofloxacin	Ciprobay
Levofloxacin	Tavanic
Doxycyclin	Vibramycin, Doxycyclin
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin
Cotrimoxazol	Kepinol, Eusaprim

5.4 Antibiogramm bei *Pseudomonas species*

Wirkstoff	Handelsname
Ampicillin/Sulbactam	Unacid
Piperacillin	Pipril
Piperacillin/Tazobactam	Tazobac
Ceftazidim	Fortum
Cefepim	Maxipime
Imipenem	Zienam
Meropenem	Meronem
Ciprofloxacin	Ciprobay
Levofloxacin	Tavanic
Moxifloxacin	Avalox
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin
Tobramycin	Gernebcin, Tobramaxin
Amikacin	Biklin
Tigecyclin	Tygacil
Aztreonam	Azactam
Fosfomycin	Infectofos
Polymyxin B	Polymyxin B

Allgemeine Hinweise zur Antibiotikatherapie

Das Antibiogramm gibt darüber Auskunft, ob der isolierte Keim in vitro empfindlich (sensibel), intermediär oder resistent auf das getestete Antibiotikum reagiert. Das entsprechende Ergebnis muss nicht immer der

Situation in vivo entsprechen, d.h.

ein empfindlich getestetes Antibiotikum kann im Einzelfall in vivo versagen. Gründe hierfür sind:

- das Antibiotikum gelangt nicht oder nicht ausreichend an den Ort der Infektion (Wirkungsort)
- Induktion einer Resistenz in vivo, z.B. bei längerer Antibiotikatherapie
- das Antibiotikum wurde nicht entsprechend den Vorgaben dosiert
- der Patient verfügt über keine ausreichende Abwehr (z.B. Agranulozytose)

In bestimmten Fällen ist eine Kombinationstherapie angezeigt z.B.:

- kalkulierte Therapie bei Immunsuppression
- Vancomycin mit Rifampicin oder Fosfomycin bei einer MRSA-Infektion
- Ampicillin mit einem Aminoglykosid bei Enterokokken-Endokarditis
- Piperacillin, Ceftazidim oder Meropenem mit einem Aminoglykosid oder einem Gyrasehemmer (Ciprofloxacin oder Levofloxacin) bei schweren Pseudomonas Infektionen

Wenn klinisch indiziert und/oder auf Anfrage wird eine Resistenzbestimmung mittels MHK (Minimale Hemmkonzentration)

eines bestimmten Keimes gegen ein Antibiotikum durchgeführt. Die MHK-Bestimmung von Penicillin ist z.B. wichtig bei der

Therapie der Endokarditis durch vergrünende Streptokokken. Bei der Endokarditis durch Enterokokken ist die MHK gegenüber

Aminoglykosiden relevant, um zu erkennen, ob eine "Low-Level-" oder "High-Level-Resistenz" vorliegt. Nur bei der

"Low-Level-Resistenz" wirken Aminoglykoside synergistisch in Kombination mit Ampicillin, Mezlocillin oder Vancomycin.

VI. Antimykogramm

Fluconazol	Diflucan, Fungata
Itraconazol	Sempera, Siros
Clotrimazol	Canesten
Voriconazol	Vfend
Amphotericin B	Amphotericin B, Ambisome

Fluconazol / Itraconazol

Wirksam gegen Candida-Arten mit Ausnahme von Candida krusei. Gegen Candida glabrata besteht meist nur eine eingeschränkte

Wirksamkeit. Resistenzentwicklung insbesondere nach längerer Anwendung möglich.

Fluconazol ist im Gegensatz zu Itraconazol nicht zur Therapie einer Aspergillose geeignet.

Clotrimazol

Lokales Antimykotikum bei Hautmykosen durch Hefe- und Schimmelpilze sowie Vaginalmykosen.

Voriconazol

Mittel der Wahl bei Aspergillose. Weist ein umfassendes Spektrum gegenüber Hefe- und Schimmelpilzen einschließlich *Candida krusei* und *Candida glabrata* auf, nicht jedoch gegenüber *Mucor* spp.

Amphotericin B

Wirksam gegen die meisten Hefe- und Schimmelpilze einschließlich *Mucor* spp. (Ausnahmen: *Aspergillus terreus*, *Fusarium* spp., *Cladosporium* spp., *Fonsecaea* spp., ggf. *Candida lusitanae*).

VII. Meldepflicht nach Infektionsschutzgesetz

Siehe hierzu die jeweils aktuelle Version unter www.rki.de

Analysenverzeichnis

10-OH-Cabazepin	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Abnahme kurz vor nächster Gabe
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Oxcarbazepin und 10-OH-Carbamazepin: therapeutischer Bereich: 10-35 µg/ml toxischer Bereich: ab 40 µg/ml
Indikationen	Antiepileptika, Metabolit HWZ 7.5-11.1 h
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OHCARB Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 10 - 20 Std. Der Metabolit 10-OH-Carbamazepin ist die aktive Verbindung in vivo.
11-Desoxycortisol°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	0,43 - 7,56 µg/l nach Metopiron-Stimulation: > 69,3 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
1.25-dihydroxyvitamin D	
Probenmaterial	2 ml Serum mit Lichtschutz Abnahme morgens, nüchtern Stabilität 2-8 °C: 7 Tage
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	19,9 – 79,3 pg/ml Methodenwechsel – bitte geänderte Referenzbereiche beachten.
Indikationen	Dihydroxy-Vitamin D prim. Hyperparathyreoidismus, chron. Niereninsuffizienz, Osteoporose (Menopause), Therapiekontrolle
Anmerkungen	Analyt Kürzel: 125D Ansatztage: Mo. bis Do. Stabilität 2-8 °C: 7 Tage

14-3-3-Protein°

Probenmaterial	1 ml Liquor bitte Stabilität beachten
Methode	EIA (Enzymimmunoassays)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Alzheimer-Demenz, Creutzfeld-Jakob-Erkrankung, Prionenerkrankung kombinierte Bestimmung mit Tau-Protein
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: P143 Ansatztage: alle 14 Tage Stabilität: 1 Tag bei Raumtemperatur, 14 Tage bei - 20 °C

17-Hydroxyprogesteron°

Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	Perinatalphase 200 – 1000 ng/dl weiblich: Bis 6 Monate: 25 - 248 ng/dl 6 Monate bis 6 Jahre: 3 - 107 ng/dl 10 bis 18 Jahre: 15 - 137 ng/dl Follikelphase: 11 - 108 ng/dl Lutealphase: 95 - 500 ng/dl Schwangerschaft: 1. Trimester: 250 - 978 ng/dl 2. Trimester: 340 - 850 ng/dl 3. Trimester: 453 - 1886 ng/dl männlich: Bis 6 Monate: 25 - 248 ng/dl 6 Monate bis 18 Jahre: 7 - 100 ng/dl Ab 18 Jahre: 59 - 344 ng/dl
Indikationen	Diagnose eines 21-Hydroxylasemangels V.a. Kongenitales adrenogenitales Syndrom (AGS)
Anmerkungen	° Fremdleistung

17-Ketosteroide°		
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin über 10 ml Eisessig Tagesmenge angeben	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Frauen 6 – 15 mg/d Männer 8 – 22 mg/d Kinder altersabhängig	
Indikationen	alternativ: Testosteron, DHEAS, Cortisol im Serum, freies Cortisol im Urin	
Anmerkungen	° Fremdleistung	
17-OH-Pregnenolon°		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)	
Normalwerte	Referenzbereich/ Entscheidungsgrenze	Wert
	Erwachsene > 35 Jahre:	< 8,4 nmol/L
	Kinder/Erwachsene 8 - 35 Jahr:	< 10,9 nmol/L
	Kinder 1 - 7 Jahre	< 6,2 nmol/L
	Kinder < 1 Jahr	< 19,5 nmol/L (Frühgeborene bis zu 4-fach höher)
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: PREGNE Ansatz tage: 1 - 2 x je Woche Testdauer: 24 Std.	
	Stabilität: 7 Tage bei 2 - 8 °C, 30 Tage bei - 20 °C	
	Nach ACTH-Stimulation jeweils bis ca. 4-fach höhere Werte.	
18-Hydroxy-Corticosteroide°		
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin Angabe der Tagesmenge	
Methode	Photometrie	
Normalwerte	1.5 – 6.5 µg/24h	
Indikationen	erhöht: M. Cushing, Stress, Schwangerschaft erniedrigt: M. Addison, Adrenogenitales Syndrom	
Anmerkungen	sensitiver und spezifischer ist die Bestimmung des freien Cortisol im Urin	
	° Fremdleistung	

1-Butanol im Blut°

Probenmaterial	Vollblut
Normalwerte	< 0.5 mg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

1-Methylhistidin°

Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 5 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

3-Methoxytyramin

Probenmaterial	EDTA-Plasma GEFROREN!																																
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)																																
Normalwerte	Für Kinder bis 4 Jahren liegen uns keine validierten Cut-Offs vor. Orientierend kann die Entscheidungsgrenze für Kinder und Jugendliche von <0,333 nmol/l herangezogen werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Referenzbereich (nmol/l)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwachsene ab 19 Jahre</td><td><0,093 (99.5 Perzentile)</td></tr> <tr> <td>Mädchen</td><td></td></tr> <tr> <td>Bis 0 - 1 Monat</td><td><0,789 (Median 0,215)</td></tr> <tr> <td>1 bis 12 Monate</td><td><0,150 (Median 0,096)</td></tr> <tr> <td>1 bis 3 Jahre</td><td><0,132 (Median 0,060)</td></tr> <tr> <td>4 bis 6 Jahre</td><td><0,078 (Median 0,042)</td></tr> <tr> <td>7 bis 18 Jahre</td><td><0,084 (Median 0,036)</td></tr> <tr> <td>Jungen</td><td></td></tr> <tr> <td>Bis 0 - 1 Monat</td><td><0,413 (Median 0,167)</td></tr> <tr> <td>1 bis 6 Monate</td><td><0,233 (Median 0,096)</td></tr> <tr> <td>7 bis 12 Monate</td><td><0,162 (Median 0,084)</td></tr> <tr> <td>1 bis 3 Jahre</td><td><0,150 (Median 0,060)</td></tr> <tr> <td>4 bis 6 Jahre</td><td><0,144 (Median 0,036)</td></tr> <tr> <td>7 bis 13 Jahre</td><td><0,132 (Median 0,036)</td></tr> <tr> <td>14 bis 18 Jahre</td><td><0,156 (Median 0,030)</td></tr> </tbody> </table> Nach Peitsch et al. (2019) finden sich bei Kindern bis 15 Jahre mit Neuroblastom im Median etwa 20-fach höhere Werte im Vergleich zum gesunden Referenzkollektiv.		Referenzbereich (nmol/l)	Erwachsene ab 19 Jahre	<0,093 (99.5 Perzentile)	Mädchen		Bis 0 - 1 Monat	<0,789 (Median 0,215)	1 bis 12 Monate	<0,150 (Median 0,096)	1 bis 3 Jahre	<0,132 (Median 0,060)	4 bis 6 Jahre	<0,078 (Median 0,042)	7 bis 18 Jahre	<0,084 (Median 0,036)	Jungen		Bis 0 - 1 Monat	<0,413 (Median 0,167)	1 bis 6 Monate	<0,233 (Median 0,096)	7 bis 12 Monate	<0,162 (Median 0,084)	1 bis 3 Jahre	<0,150 (Median 0,060)	4 bis 6 Jahre	<0,144 (Median 0,036)	7 bis 13 Jahre	<0,132 (Median 0,036)	14 bis 18 Jahre	<0,156 (Median 0,030)
	Referenzbereich (nmol/l)																																
Erwachsene ab 19 Jahre	<0,093 (99.5 Perzentile)																																
Mädchen																																	
Bis 0 - 1 Monat	<0,789 (Median 0,215)																																
1 bis 12 Monate	<0,150 (Median 0,096)																																
1 bis 3 Jahre	<0,132 (Median 0,060)																																
4 bis 6 Jahre	<0,078 (Median 0,042)																																
7 bis 18 Jahre	<0,084 (Median 0,036)																																
Jungen																																	
Bis 0 - 1 Monat	<0,413 (Median 0,167)																																
1 bis 6 Monate	<0,233 (Median 0,096)																																
7 bis 12 Monate	<0,162 (Median 0,084)																																
1 bis 3 Jahre	<0,150 (Median 0,060)																																
4 bis 6 Jahre	<0,144 (Median 0,036)																																
7 bis 13 Jahre	<0,132 (Median 0,036)																																
14 bis 18 Jahre	<0,156 (Median 0,030)																																
Indikationen	Phäochromozytom- und Neuroblastom-Diagnostik																																
Anmerkungen	Analyt Kürzel: 3OMETY Ansatztage: Mo. Am Tag vor Blutentnahme bitte auf Alkohol, Kaffee und Nikotin sowie Verzehr von Käse, Früchten und Nüssen verzichten. <i>Hinweis:</i> Der Abbau der Katecholamine in die entsprechenden Metanephrene erfolgt in moderatem Umfang auch in der entnommenen Probe, sodass in Plasma, welches bei Raumtemperatur bzw. gekühlt eingesandt wird, gehäuft grenzwertig erhöhte Metanephrene gemessen werden. Nach der Blutentnahme sollte die Probe umgehend zentrifugiert und das Plasma separiert und tiefgefroren werden.																																

3-Methoxytyramin

Viele Arzneistoffe beeinflussen die Ausschüttung von Katecholaminen und damit ihrer Metaboliten, den Metanephrinen. Hierzu zählen vor allem Psychopharmaka und Antihypertensiva wie trizyklische Antidepressiva, MAO-Inhibitoren, DOPA-Derivate, α -Blocker, β -Blocker, Diuretika (hochdosiert), ACE-Hemmer und Clonidin sowie abschwellende Nasentropfen und Theophyllin. Sofern klinisch vertretbar ist eine mindestens 14-tägige Medikamentenpause vor der Blutentnahme zu empfehlen.

3-Methoxytyramin im Urin°

Probenmaterial	Urin
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 250 µg/die
Anmerkungen	° Fremdleistung

3-Methoxytyramin im Urin°

Probenmaterial	24-h-Sammelurin, gesammelt über 5-10ml Eisessig	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Erwachsene	< 480 µg/d
	Kinder:	
	0 - 12 Monate	< 2067 µg/g Krea.
	1 - 5 Jahre	< 1303 µg/g Krea.
	5 - 18 Jahre	< 657 µg/g Krea.
Indikationen	Drogenscreening	
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: 3OMETYU Ansatztage: 1 - 2 x je Woche Testdauer: 24 Std. 24-h-Sammelurin, gesammelt über 5-10ml Eisessig; Kinder bis 18 Jahre: Spontanurin ohne Zusätze (frisch oder gekühlt) Mit Borsäure stabilisierter Urin ist für diese Analyse nicht geeignet.	

3-Methylhistidin°

Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 42 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

5-Aminosalicylsäure°	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0,10 - 1,00 mg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIES) im Urin pro Tag°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin über 10 ml konz. HCl Angabe der Tagesmenge
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	< 40 µmol/d
Indikationen	V.a. Karzinoid (Tumore des APUD-Systems)
Anmerkungen	Serotoninmetabolit ° Fremdleistung, Analyt Kürzel: SRTM
5-Hydroxy-Tryptophan im Urin°	
Probenmaterial	Urin
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	< 1 mg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
5-S-Cysteinyl dopa i. Plasma°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	< 10 nmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
6-Acetylmorphin°	
Probenmaterial	5 ml Urin
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Anmerkungen	° Fremdleistung
6-Monoacetylmorphin°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang) ° Fremdleistung

9-OH-Risperidon	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	20 – 60 ng/l
Indikationen	aktiver Metabolit 9-OH-Risperidon entspricht Paliperidon
Anmerkungen	Analyt Kürzel: Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei Gabe von Risperidon wird als therapeutischer Bereich 20-60 ng/ml für die Summe der Serum-spiegel von Risperidon und 9-OH-Risperidon im steady-state empfohlen. Beim Depot-Präparat (Risperdal Consta, Gabe 25 oder 50 mg Risperidon i.m. 14-tägig) werden Spiegel von 10-45 ng/ml der Summe aus Risperidon und 9-OH-Risperidon gemessen. keine Gel-Röhrchen verwenden!
9-Tetrahydrocannabinol°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang) ° Fremdleistung
a-Aminoadipinsäure°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Anmerkungen	bei Kindern und Jugendlichen nicht nachweisbar. ° Fremdleistung
a-Aminobuttersäure°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 7 - 32 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

ABO-System, Rhesus-Faktor	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut, keine Gel-Röhrchen verwenden! Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss das Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein. Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Indikationen	OP-Vorbereitung, Schwangerschaftsvorsorge, Transfusionsmedizin
Anmerkungen	Zu jeder Blutgruppenbestimmung sollte der Antikörpersuchtest (indirekter Coombs-Test) bestimmt werden siehe auch: Blutgruppenbestimmung Coombs-Test indirekt (Antikörpersuchtest) Coombs-Test direkt Kreuzprobe (Verträglichkeitsprobe) Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Acetaminophen°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 2,5 - 25 µg/ml toxischer Bereich > 150 µg/ml
Anmerkungen	Analgetika, Antipyretika, Antirheumatika z.B. Anaflon®, Benuron®, Enelfa® ° Fremdleistung
Aceton im Blut°	
Probenmaterial	2 ml Blut
Methode	Rollrandröhrchen
Normalwerte	< 10 mg/l
Anmerkungen	Bitte Rollrandröhrchen anfordern ° Fremdleistung

Aceton im Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	GC/MS
Normalwerte	< 3 mg/l
Anmerkungen	Arbeitsmedizin: BAT-Wert 80 mg/l ° Fremdleistung
Acetylcholin-Rezeptor-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 0.2 nmol/l
Indikationen	Myasthenia gravis Lambert-Eaton Myasthenie Syndrom LEMS (Ca-Kanal-Autoantikörper)
Anmerkungen	° Fremdleistung
ACTH Adrenocorticotropes Hormon	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! sofort abtrennen Blutentnahme morgens (zirkadiane Rhythmik)
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	< 46 pg/ml
Indikationen	Hypophysen-Nebennieren-Achse DD Hypercortisolismus: ACTH erhöht: ACTH abhängige Form, hypophysäre oder ektope ACTH-Synthese ACTH erniedrigt: ACTH unabhängige Form, NNR-Adenom, NNR-Ca, NNR-Hyperplasie primäre NNR-Insuffizienz (M. Addison) V.a. ektope ACTH-Sekretion z.B. Bronchial Ca
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ACT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. ACTH-Stimulationstest s. Cortisol-Synacthentest
Adalimumab°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA
Normalwerte	Siehe Befund, Dimension µg/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ADAL Ansatztage: Di.

Adalimumab Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA
Normalwerte	< 6,0 RU/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ADALA Ansatztage: Di. Bei Patienten, die > 5 mg/Tag Biotin einnehmen, sollte die Probeentnahme frühestens 24 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. Die Wirksamkeit der Adalimumab-Therapie ist u. A. von der Entwicklung Anti-Drug-Antikörpern (ADA) abhängig. Bei ausbleibendem oder unzureichendem Therapieansprechen sollte der Nachweis bzw. die Konzentrationen von ADA, im Zusammenhang mit den entsprechenden Adalimumab-Talspiegeln interpretiert und folgendermaßen für die therapeutischen Entscheidungen in Betracht gezogen werden: Adalimumab-Talspiegel im therapeutischen Bereich ohne Nachweis von ADA: Dosisintensivierung auf individualisierter Basis oder Therapiewechsel zu einer anderen Medikamentengruppe. Adalimumab-Talspiegel unterhalb des therapeutischen Bereiches mit Nachweis von ADA: Dosisintensivierung/ Anpassung des Therapieintervalls und Einführung eines Immunmodulators (bei ADA < 6 RU/ml) oder Therapiewechsel in der gleichen bzw. zu einer anderen Medikamentengruppe (bei ADA ≥ 6 RU/ml). Ref.: Papamichael K & Chieftetz AS. Curr Opin Gastroenterol. 2019;35:302., Nice R et al. Aliment Pharmacol Ther. 2021;53:128. Unsere ADA-Methode erfasst sowohl freie als auch Medikament-gebundene ADAs. Bei Patienten, die > 5 mg/Tag Biotin einnehmen, sollte die Probeentnahme frühestens 24 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. Infliximab Konzentrationen ≥ 10 µg/ml können zu falsch niedrigen Ergebnissen führen.

Adenoviren (Meldepflicht IfSG)°													
Probenmaterial	2 g Stuhl Konjunktival-Abstrich												
Methode	PCR												
Normalwerte	negativ												
Anmerkungen	Direktnachweis ° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage												
Adenovirus-IgA-Ak°													
Probenmaterial	1 ml Serum												
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)												
Normalwerte	siehe Befund												
Indikationen	Infektionen des Respirationstraktes, Konjunktivitis, Gastroenteritis bei Kindern												
Anmerkungen	° Fremdleistung												
Adenovirus-IgG-Ak°													
Probenmaterial	1 ml Serum												
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)												
Normalwerte	siehe Befund												
Indikationen	Infektionen des Respirationstraktes, Konjunktivitis, Gastroenteritis bei Kindern												
Anmerkungen	° Fremdleistung												
ADH													
Anmerkungen	wird ersetzt durch die Bestimmung von Copeptin siehe Copeptin												
Adiponektin°													
Probenmaterial	Serum												
Normalwerte	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Frauen</th></tr> <tr> <td>0 - 20 Jahre</td><td>3,1 - 15,6 µg/ml</td></tr> <tr> <td>ab 21 Jahren</td><td>4,0 - 19,4 µg/ml</td></tr> <tr> <th colspan="2">Männer</th></tr> <tr> <td>0 - 20 Jahre</td><td>3,4 - 18,6 µg/ml</td></tr> <tr> <td>ab 21 Jahren</td><td>2,0 - 13,9 µg/ml</td></tr> </table>	Frauen		0 - 20 Jahre	3,1 - 15,6 µg/ml	ab 21 Jahren	4,0 - 19,4 µg/ml	Männer		0 - 20 Jahre	3,4 - 18,6 µg/ml	ab 21 Jahren	2,0 - 13,9 µg/ml
Frauen													
0 - 20 Jahre	3,1 - 15,6 µg/ml												
ab 21 Jahren	4,0 - 19,4 µg/ml												
Männer													
0 - 20 Jahre	3,4 - 18,6 µg/ml												
ab 21 Jahren	2,0 - 13,9 µg/ml												
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: ADIPO Werte unter 4 µg/ml sind mit einem erheblich erhöhten Risiko für Arteriosklerose assoziiert.												

Adrenalin im Urin°	
Probenmaterial	3 ml Urin oder 3 ml 24-h-Sammelurin 24-h-Sammelurin, gesammelt über 5-10 ml Eisessig; Kinder bis 18 Jahre: Spontanurin ohne Zusätze (frisch oder gekühlt). Mit Borsäure stabilisierter Urin ist für diese Analyse nicht geeignet. Stabilität: 14 Tage bei -20 °C
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Indikationen	Therap. Drug Monitoring + Stoffwechsel
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: ADR_UL Ansatztage: 1x pro Woche Eine Beeinflussung der Katecholamine Adrenalin, Noradrenalin sowie deren Vorläufer Dopamin durch koffeinhaltige Nahrungs- oder Genussmittel, Tee, Alkohol, Nikotin und starke körperliche Betätigung ist möglich.
Adrenalin/Noradrenalin im Plasma°	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! Abnahme: peripher, nach 20 Min. liegend Bitte immer eine gefrorene EDTA Plasma Probe separat einsenden
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	80 - 500 pg/ml
Indikationen	Hypertonie, V.a. Phäochromozytom, Neuroblastom oder Ganglioneurom
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ADRNOREP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Aeromonas spp.	
Probenmaterial	Stuhl
Methode	Kultur
Normalwerte	negativ
Indikationen	Nach Auslandsaufenthalt, Blutige Diarrhoe, Immunsupprimierte Patienten
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage

Ajmalin°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0.2 – 1.0 mg/ml
Anmerkungen	Antiarrhythmikum: z.B. Gilurytmal® ° Fremdleistung
Aktinomykose	
Probenmaterial	Für die Diagnose einer Aktinomykose hat die histologische Untersuchung eines Abradats einen höheren Stellenwert als die mikrobiologische Diagnostik. Bei V.a. Beckenaktinomykose ist nur laparoskopisch entnommenes (Abszess-) Material für eine kulturelle Diagnostik geeignet. Die von einem Vaginalabstrich isolierten Aktinomyzeten haben eine geringe Aussagekraft, da sie wie alle anderen obligaten/fakultativen Anaerobier als normale Standortflora im Zervikalkanal vorkommen können. Für die kulturelle Diagnostik einer IUP-assoziierten Infektion empfiehlt sich die Einsendung des kompletten IUPs. ein Abstrich des IUPs hat eine geringere Aussagekraft.
Methode	Kultur
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	Biopsie: Betroffenen Bereich sowie angrenzende Hautareale gründlich desinfizieren. Vom Wundrand 1 cm lange Gewebespinde oder mind. 4 mm Stanzbiopsie, die jeweils bis in die Subkutis reichen, entnehmen. Zur Vermeidung einer Kontamination mit Hautflora ist der unmittelbare Übergang zu nicht betroffener Haut von der Probenentnahme auszuschließen. Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 14 Tagen

Aktinomyzeten	
Probenmaterial	Zervix- oder Vaginalabstrich (Unter Verwendung eines sterilen Vaginalspekulums Abstrich entnehmen und in Transportmedium überführen) Urethralabstrich (Die letzte Miktion sollte 2 - 3 Std. zurückliegen. Harnröhrenöffnung reinigen. Vor der Abstrichentnahme beim Mann empfiehlt es sich, Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne zu befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer das Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen und ins Transportmedium überführen) Ejakulat oder Prostataexprimat (Vor der Materialgewinnung den Bereich um die Harnröhrenöffnung reinigen. Probe nativ in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen einsenden)
Methode	kultureller Nachweis
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	bei V.a. Aktinomyzeten müssen diese als Zielaufträge angefordert werden. Der Untersuchungsauftrag auf "pathogene Keime" schließt diese Erreger nicht mit ein. Mikrobiologie Ansatz tage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 14 Tagen
aktivierte Protein C-Resistenz (APCR)	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Koagulometrie
Normalwerte	2,61 - 3,32 Graubereich: 2,0 - 2,60
Indikationen	Lupusantikoagulans, Resistenz gegen aktiviertes Protein C, V.a. "Faktor V Leiden"-Mutation, rezidivierende Thromboembolien unklarer Ätiologie (insbesondere bei Patienten < 45 J. und bei positiver Familienanamnese)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: APC Ansatz tage: 1 x Woche Mi. oder Do.
Alanin°	
Probenmaterial	EDTA-Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 183 - 552 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

ALAT, ALT, Alaninaminotransferase	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Anmerkungen	siehe GPT
Albumin-IgG-Quotient	
Probenmaterial	5 ml Liquor und 2 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	ohne Serum ist keine Auswertung bezüglich intrathekalen Synthese oder Schrankenstörung möglich.
Albumin im Liquor	
Probenmaterial	1 ml Lumballiquor
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 35 mg/dl
Indikationen	Überprüfung der Blut-Liquor-Schranke, Verdacht auf entzündliche Erkrankungen des ZNS.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALB_L Ansatzzeit: täglich Mo. - Fr.
Albumin im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	3500 - 5500 mg/dl
Indikationen	Synthesestörung der Leber Blut/Hirnschrankenfunktion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALBS Ansatzzeit: täglich Mo. - Fr. Gesamtprotein des Liquors als Schrankenparameter Permeabilitätsstörungen durch: akute Meningitis/Enzephalitis chron. entzündl. Prozesse, entzündl. Polymeningitiden Meningeal Blastomatosen atroph. degen. Prozesse
Albumin im Stuhl°	
Probenmaterial	Stuhl
Normalwerte	< 9,2 µg/g
Anmerkungen	° Fremdleistung

Albumin im Urin die	
Probenmaterial	24 h - Sammelurin
Methode	Turbidimetrie, Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	<30 mg/d
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALBD Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
Albumin im Urin pro Liter	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Sammelurin oder 2. Morgenurin
Methode	Turbidimetrie Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	< 20 mg/l
Indikationen	vorwiegend zu Differentialdiagnostik von Proteinurien (zugehörig zu: renalen Prot. glomerulär, tubulär, gemischt), Nierenerkrankungen, Neoplasien, Leberzirrhose, ausgedehnter Gewebsuntergang (Verbrennungen).
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALBU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage Markerprotein der diabetischen Nephropathie Cave: mit Streifentests ist eine Mikro-Albuminurie nicht feststellbar! Mikroalbuminurie: Werte von 30-300 mg/d im Abstand von 6 Monaten; sicherstes Zeichen einer gestörten glomerulären Filtration, z.B. bei beginnender Nephropathie. Leitprotein: Albumin im Urin; selektiv glomeruläre Proteinurie: vermehrte Harnausscheidung mittelgroßer Proteine (50 000-80 000 Dalton) kennzeichnet den evtl. reversiblen glomerulären Frñhschaden mit Verlust der Anionenfilterfunktion.
Albumin Kreatinin Quotient im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Turbidimetrie Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	Erwachsene < 20 mg/g Kinder (3 - 5 Jahre) < 30 mg/g
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALBKREQ Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage

Albumin-Quotient	
Probenmaterial	je 1 ml Serum und Liquor vom selben Tag
Normalwerte	< 7
Anmerkungen	Gesamtprotein des Liquors als Schrankenparameter: Permeabilitätsstörungen durch akute Meningitis/Enzephalitis, chron. entzündl. Prozesse, entzündl. Polymeningitiden, Meningeal Blastomatosen, atroph. degen. Prozesse.
Aldolase°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 7.6 U/l
Indikationen	Myopathien Lebererkrankungen
Anmerkungen	° Fremdleistung

Aldosteron im Plasma

Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! Bei gleichzeitiger Anforderung von Metanephrinen im Plasma bitte ein separates Röhrchen einsenden. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Einsendung von Katecholaminen im Plasma																																		
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)																																		
Normalwerte	Normwerte, bei Abnahme: 22,1-353 ng/l (Aufrecht) 11,7-236 ng/l (Rückenlage) Methodenwechsel – bitte geänderte Referenzbereiche beachten.																																		
Indikationen	Renin-Angiotensin-Aldosteron-System; DD arterieller/ renovaskulärer Hypertonus Hyper- bzw. Hypoaldosteronismus Bartter Syndrom																																		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AON Ansatztage: 1 x / Woche Tagesrhythmik beachten. Antihypertensiva möglichst zuvor absetzen. Erhöhung des ARQ (falsch positive Ergebnisse) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medikamentengruppe</th><th>Effekt auf Aldosteron</th><th>Effekt auf Renin</th><th>Empfohlene Pause</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>β-Blocker</td><td>-</td><td>--</td><td>1 Woche</td></tr> <tr> <td>Imidazolinrezeptor-Agonisten (z.B. Clonidin)</td><td>-</td><td>--</td><td>1 Woche</td></tr> </tbody> </table> Erniedrigung des ARQ (falsch negative Ergebnisse) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medikamentengruppe</th><th>Effekt auf Aldosteron</th><th>Effekt auf Renin</th><th>Empfohlene Pause</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thiazid-Diuretika</td><td>+</td><td>++</td><td>1 Woche</td></tr> <tr> <td>Schleifen-Diuretika</td><td>=+</td><td>++</td><td>1 Woche</td></tr> <tr> <td>ACE-Hemmer</td><td>-</td><td>++</td><td>1 Woche</td></tr> <tr> <td>Angiotensin-Antagonisten</td><td>-</td><td>++</td><td>1 Woche</td></tr> </tbody> </table>			Medikamentengruppe	Effekt auf Aldosteron	Effekt auf Renin	Empfohlene Pause	β-Blocker	-	--	1 Woche	Imidazolinrezeptor-Agonisten (z.B. Clonidin)	-	--	1 Woche	Medikamentengruppe	Effekt auf Aldosteron	Effekt auf Renin	Empfohlene Pause	Thiazid-Diuretika	+	++	1 Woche	Schleifen-Diuretika	=+	++	1 Woche	ACE-Hemmer	-	++	1 Woche	Angiotensin-Antagonisten	-	++	1 Woche
Medikamentengruppe	Effekt auf Aldosteron	Effekt auf Renin	Empfohlene Pause																																
β-Blocker	-	--	1 Woche																																
Imidazolinrezeptor-Agonisten (z.B. Clonidin)	-	--	1 Woche																																
Medikamentengruppe	Effekt auf Aldosteron	Effekt auf Renin	Empfohlene Pause																																
Thiazid-Diuretika	+	++	1 Woche																																
Schleifen-Diuretika	=+	++	1 Woche																																
ACE-Hemmer	-	++	1 Woche																																
Angiotensin-Antagonisten	-	++	1 Woche																																

Aldosteron im Plasma

(Sartane)			
Renin-Inhibitor (Aliskiren)	-	++	1 Woche
Mineralocorticoid- Antagonisten (Spironolacton, Eplerenon, Amilorid, etc.)	+	++	4 Woche
Calcium-Antagonisten (Dihydropiridine)	=	+	1 Woche
Verapamil	=	=	x
α -Antagonisten (z.B. Doxazosin)	=	=	x
Dihydralazin	=	=	x

Präanalytik (Patienten-/Probenvorbereitung)

Patientenvorbereitung:

Referenzwerte variieren, wenn die Blutentnahme liegend oder aufrecht erfolgt. Die Proben werden zwischen 7 und 10 Uhr morgens nüchtern in aufrechter Position (30 Minuten Stehen und Gehen) oder in Rückenlage (mindestens 30 Minuten Liegen) genommen. Bei Patienten, die eine Therapie mit einer hohen Biotindosis(> 5 mg/Tag) erhalten, sollte keine Probe innerhalb von 8 Stunden nach der letzten Biotin-Verabreichung genommen werden.

Probenvorbereitung:

Die Proben sollten nach der Probenentnahme so schnell wie möglich zentrifugiert und getrennt werden. Proben anschließend bei -20°C bis -25°C komplett einfrieren. Versand in der Kühlbox gefroren.

Praxen die keine Zentrifuge und/oder kein Gefrierschrank zur Verfügung haben, können Patienten entweder zur Blutabnahme direkt ins Labor schicken oder das abgenommene EDTA-Blut innerhalb von 30 Minuten abholen lassen.

Aldosteron im Plasma	
	Die Abholung erfolgt im nahegelegenen Umkreis per Kurierfahrer. Proben unmittelbar vor der Messung auftauen und anschließend mschen. Beurteilung der Proben nach den Kriterien ikterisch, hämolytisch, lipämisch mit anschließender Dokumentatio in der Labor-EDV. Proben, die Präzipitate enthalten, müssen vor dem Test zentrifugiert werden.
Aldosteron i. Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin über 1 ml Eisessig
Normalwerte	1.2 – 28.1 µg/d
Anmerkungen	Tagesmenge angeben! ° Fremdleistung
Aldosteron-Renin-Quotient (ARQ)	
Probenmaterial	2 Röhrchen mit je 2 ml EDTA-Plasma GEFROREN!
Normalwerte	< 20
Anmerkungen	Ein Wert > 20 spricht für primären Hyperaldosteronismus. Bestätigung durch Kochsalzbelastungstest empfohlen siehe auch: Erhöhung des ARQ (falsch positive Ergebnisse) Erniedrigung des ARQ (falsch negative Ergebnisse)

Alkalische Leukozytenphosphatase°	
Probenmaterial	Heparinblut oder 4-6 luftgetrocknete Blutaussstriche nach Heilmeyer
Normalwerte	Index 10 – 100
Indikationen	Hämatologische Erkrankungen DD CML und myeloische Reaktionen bzw. Osteomyelofibrose, DD Polyzythämia vera und Polyglobulie, DD Zytopenien des peripheren Blutes (aplastische Anämien, Agranulozytose, Leukämie, aleukämische Formen) erhöht: Osteomyelofibrose, Polyzythämia vera, myeloische Reaktionen bei entzündlichen Erkrankungen, Agranulozytose, aplastische Anämie, essentielle Thrombozythämie erniedrigt: CML, paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH), unreifzellige myeloische Leukämie, sideroachrestische Anämie
Anmerkungen	kein EDTA- oder Citratblut verwenden ° Fremdleistung
alkalische Phosphatase	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen 35 – 117 U/l Männer 40 – 142 U/l Kinder wachstumsabhängig
Indikationen	Leber- und Knochenkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Alkalische Placenta Phosphatase°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 100 mU/l
Indikationen	Tumormarker bei Hodentumor, Seminom
Anmerkungen	° Fremdleistung

Alkohol (Ethanol)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	enzymatisch
Normalwerte	< 0.12 g/L Kritischer Wert: >3 g/L
Indikationen	Alkoholabusus, Alkoholintoxikation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ETH_S Ansatztage: nach Bedarf siehe CDT (Carbohydrat-Deficient-Transferrin)
Allo-Isoleucin	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 2 µmol/l
Aluminium°	
Probenmaterial	2 ml Serum nüchtern Neutralröhrchen 10 ml Urin Probengewinnung nach Expositionsende
Methode	AAS/Graphitrohr
Normalwerte	Serum < 20 µg/l Dialysepatienten: < 60 µg/l akzeptabel < 100 µg/l bedenklich > 200 µg/l Intoxikation Urin < 20 µg/l
Anmerkungen	zur Blutabnahme keine Serummonovetten mit Kügelchen (Kaolin!) verwenden ° Fremdleistung
Alveolen-Basalmembran-AK°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Goodpasture-Syndrom
Anmerkungen	° Fremdleistung

AMA Antimitochondriale-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	negativ < 1:100
Indikationen	Autoimmunhepatitis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
AMA-M2	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Lineblot
Normalwerte	negativ
Indikationen	Primär-biliäre Zirrhose (PBC)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMAM2 Ansatztage: 2 x / Woche
Ameisensäure°	
Probenmaterial	10 ml Urin, stabilisiert mit 50 µl Eisessig
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 30 mg/g Kreatinin
Indikationen	Arbeitsmedizin: Formaldehyd-Abbauprodukt; Methanol-, Aceton-Exposition
Anmerkungen	° Fremdleistung
Amikacin im Serum°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	Therap. Bereich: min: 5 - 10 µg/ml (toxisch ab > 10 µg/ml) max: 20 - 25 µg/ml (toxisch ab > 35 µg/ml)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Aminosäuren im Plasma°	
Probenmaterial	5 ml EDTA-Plasma GEFROREN! sofort abtrennen
Methode	LC-MS (Liquid-Chromotography-Massenspektrometrie)
Normalwerte	Normwerte s. Befund
Indikationen	Aminosäurestoffwechselstörung
Anmerkungen	Bitte unbedingt Plasma einsenden ° Fremdleistung

Aminosäuren im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin gesammelt über 5-10 ml Eisessig
Normalwerte	Normwerte s. Befund
Anmerkungen	Tagesmenge angeben ° Fremdleistung
Amiodaron	
Probenmaterial	2 ml Serum BE kurz vor nächster Gabe keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	1,0 – 2.5 µg/ml Toxischer Bereich > 2,5 µg/ml
Indikationen	Antiarrhythmikum Cordarex®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMIO Ansatzage: 1 - 2 x/Woche Halbwertszeit 14 – 30 d
Amisulprid	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	100 – 320 µg/l
Indikationen	Neuroleptikum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMID Ansatzage: täglich Mo. - Fr. maximale Konzentration etwa 3 Std. nach Gabe von 25 bis 200 mg Amisulprid keine Gel-Röhrchen verwenden!

Amitriptylin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich 80 - 200 ng/ml kritischer Bereich > 300 ng/ml
Indikationen	Trizyklische Antidepressivum: Laroxyl®, Saroten®, Tryptizol®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMIT Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 10 - 28 Std.
Ammoniak	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! sofort abtrennen
Methode	Photometrie
Normalwerte	Kinder (Reifegeborene) < 1 Monat: 45 - 109 µg/dl Kinder 1 Monat - 14 Jahre: 26 - 119 µg/dl Frauen: 19 - 87 µg/dl Männer: 27 - 102 µg/dl
Indikationen	Hepatische Enzephalopathie Hepatopathie dekompensierte Leberzirrhose aggressive Chemotherapie Valproinsäuretherapie Vergiftungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NH4 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Amöben IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:40 Titer-E
Anmerkungen	Entamoeba histolytica, invasive Amöbiasis: Antikörpernachweis in 35 - 60 % der Fälle ° Fremdleistung

Amöben IgM-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:20 Titer-E
Anmerkungen	extraintestinale Amöbiasis (Leberamöbiasis 95 - 100 % serologisch positiv) ° Fremdleistung
Amöben Mikrobiologie	
Probenmaterial	Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Parasiteninfektionen nach Auslandsaufenthalt Blutige Diarrhoe Immunsupprimierte Patienten
Anmerkungen	Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. $\frac{1}{3}$ mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlanteile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt. Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2 - 8 °C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen. Mikrobiologie Ansatzstage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.

Amphetamine°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Indikationen	Amphetamin, Metamphetamin
Anmerkungen	° Fremdleistung ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang)
Amphetamine, Amphetamin, Methamphetamin, MDA, MDMA, MDE	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/ GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Amphetamine im Serum CEDIA°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Cutoff: 10 ng/ml, Kalibratorsubstanz: D-Amphetamin Erfasst wird: Amphetamin
Anmerkungen	° Fremdleistung
Amphetamine im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	KIMS
Normalwerte	Schwellenwert < 1000 ng/ml
Indikationen	Verdacht auf Drogenmissbrauch, Drogensuchtest
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMPH Ansatztage: Mi. + Fr. bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern
Amylase-Isoenzyme Pankreas-Amylase°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	13 - 54 U/l
Indikationen	DD Pankreatitis/Parotitis: Pankreas-Amylase, Lipase
Anmerkungen	° Fremdleistung

Amylase-Isoenzyme Speichel-Amylase°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 46 U/l
Indikationen	Speicheldrüsenerkrankungen: Parotitis, Mumps
Anmerkungen	° Fremdleistung
Amyloid A° (SAA)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	< 0,64 mg/dl
Indikationen	Früherkennung von Nieren-Transplantat Abstoßungen Akute Phase Protein(familiäres Mittelmeerfieber) Abklärung einer Amyloidose
Anmerkungen	° Fremdleistung
ANCA	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Anti-Neutrophile-zytoplasmatische Antikörper
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ANCA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. siehe auch MPO und PR3-ANCA Vaskulitis
Androgene im Urin, Androsteron, Ätiocholanon, Pregnantriol, DHEAS, Testosteron	
Probenmaterial	20 ml vom 24-Std.-Urin über 1 ml Eisessig, Tagesmenge angeben
Indikationen	Virilisierung Androgenisierung Hirsutismus Amenorrhoe Dexametason Langzeit Suppressionstest DHEAS- und Testosteron-Bestimmung

Androgen-Index

Methode	FAI
Normalwerte	Kinder: alters abhängig Frauen: Prämenopause: 0.3 - 9.8 Postmenopause: 0.2 - 5.9 Männer: 16 - 21 Jahre: 10,3 - 146,4 22 - 49 Jahre: 14,5 - 80,3 ab 50 Jahren: 9,4 - 52,5

Androstendion											
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	weiblich: bis 37 Jahre 0,49 - 1,31 ng/ml von 38 Jahre - 54 Jahre Aktuell liegen uns für diese Altersgruppe keine Referenzbereiche des Testherstellers vor. Orientierend können der Referenzbereich für Frauen mit intaktem Menstruationszyklus im Alter von 18-37 Jahren (0,49-1,31 ng/ml bzw. 1,71-4,58 nmol/l) und der Referenzbereich für postmenopausale Frauen im Alter von 55-70 Jahren (< 1,07 ng/ml bzw. < 3,74 nmol/l) herangezogen werden. von 55 Jahre - 70 Jahre* < 1,07 ng/ml männlich: < 1,52 ng/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	erhöht: Hirsutismus, polyzystische Ovarien erniedrigt: NNR-Insuffizienz, Ovarialinsuffizienz										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ANDR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Testosteronvorstufe von Ovar und Nebennierenrinde (wie DHEAS) Bitte nach Zentrifugation Serum separieren (Keine Röhrchen mit Trenngel verwenden) <table><tr><th colspan="2">Lagerung:</th></tr><tr><th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr><tr><td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr><tr><td>2-8 °C</td><td>14 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>5 Tage</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8 °C	14 Tage	Raum Temperatur	5 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8 °C	14 Tage										
Raum Temperatur	5 Tage										

Androsteron°		
Probenmaterial	20 ml vom 24-Std.-Urin über 1 ml Eisessig Tagesmenge angeben	
Methode	GC	
Normalwerte	Männer < 6.2 mg/d Frauen < 4.1 mg/d	
Indikationen	Testosteronmetabolit, 17-Ketosteroid	
Anmerkungen	° Fremdleistung	
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)°		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Methode	photometrisch (kinetisch)	
Normalwerte	von 0 - 17 Jahre	33 - 112 U/l
	von 18 Jahre - 120 Jahre*	20 – 70 U/l
Indikationen	V.a. Sarkoidose (Husten, Atmenot, meist mediastinal geschwollene Lymphknoten. Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Fieber, Erythema nodosum, Hepato-, Splenomegalie, Herzrhythmusstörungen)	
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ACE Ansatztage: täglich, Mo. - Fr.	
	Darstellung der Altersangaben: "von" bezieht sich auf das (den) begonnene(n) Lebensjahr(monat); "bis" auf das (den) abgeschlossene(n) Lebensjahr(monat).	
	* Der Referenzbereich für Erwachsene wird für ältere Personen fortgeschrieben, wenn nicht in verschiedene Altersgruppen differenziert wird. Es liegt bisher keine Untersuchung dazu vor.	
	Interpretation: Erhöhte Serum-ACE-Aktivitäten findet man häufig bei der Sarkoidose (M. Boeck), aber auch bei einigen anderen Erkrankungen (z. B. M. Gaucher, Diabetes mellitus, verschiedenen pulmonalen Erkrankungen). Weiterhin sollte beachtet werden, dass unter Therapie mit einem ACE-Hemmer die Serum-ACE-Aktivität vermindert sein kann. Eine Therapie mit ACE-Hemmern sollte wenn möglich ca. 4 Wochen vor der Analyse abgesetzt werden.	
Antiarrhythmika		
Probenmaterial	2 ml Serum	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Indikationen	z.B.: Ajmalin Amiodaron Aprindin Chinidin Disopyramid Flecainid Lorcaïnïd Mexiletin Procainamid Propafenon Propanolol Tocainid Verapamil	
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden!	

Antibiogramm																																																			
Methode	Agardiffusion/Kinetische MHK																																																		
Anmerkungen	Im folgenden ist eine Auswahl routinemäßig getesteter Antibiotika diverser Hersteller aufgelistet. Auf Wunsch können, wenn verfügbar, weitere antimikrobielle Chemotherapeutika ausgetestet werden. Bei Auftreten von Multiresistenzen wird das Spektrum der Antibiotika routinemäßig durch zusätzliche Austestung geeigneter Chemotherapeutika erweitert. 1. Antibiogramm bei grampositiven Keimen <table> <tr> <th>Wirkstoff</th><th>Handelsname</th></tr> <tr><td>Penicillin</td><td>Megacillin, Isocillin</td></tr> <tr><td>Ampicillin</td><td>biontal</td></tr> <tr><td>Ampicillin/Sublactam</td><td>Unacid</td></tr> <tr><td>Oxacillin</td><td>Staphylex</td></tr> <tr><td>Cefazolin</td><td>Cefazolin</td></tr> <tr><td>Cefuroxim</td><td>Elobact, Zinnat</td></tr> <tr><td>Imipenem</td><td>Zienam</td></tr> <tr><td>Ciprofloxacin</td><td>Ciprobay</td></tr> <tr><td>Levofloxacin</td><td>Tavanic</td></tr> <tr><td>Moxifloxacin</td><td>Avalox</td></tr> <tr><td>Doxycyclin</td><td>Vibramycin, Doxycyclin</td></tr> <tr><td>Gentamicin</td><td>Refobacin, Gentamicin</td></tr> <tr><td>Erythromycin</td><td>Paediatrocin, Infectomycin</td></tr> <tr><td>Clindamycin</td><td>Sobelin</td></tr> <tr><td>Cotrimoxazol</td><td>Kepinol, Eusaprim</td></tr> <tr><td>Vancomycin</td><td>Vancomycin</td></tr> </table> 2. Zusätzliche Antibiotika bei MRSA- bzw. VRE-Nachweis <table> <tr> <th>Wirkstoff</th><th>Handelsname</th></tr> <tr><td>Teicoplanin</td><td>Targocid</td></tr> <tr><td>Linezolid</td><td>Zyvoxid</td></tr> <tr><td>Daptomycin</td><td>Cubicin</td></tr> <tr><td>Quinopristin/Dalfopristin</td><td>Synercid</td></tr> <tr><td>Fusidinsäure</td><td>Fucidine</td></tr> <tr><td>Fosfomycin</td><td>Infectofos</td></tr> <tr><td>Rifampicin</td><td>Rifa</td></tr> </table>	Wirkstoff	Handelsname	Penicillin	Megacillin, Isocillin	Ampicillin	biontal	Ampicillin/Sublactam	Unacid	Oxacillin	Staphylex	Cefazolin	Cefazolin	Cefuroxim	Elobact, Zinnat	Imipenem	Zienam	Ciprofloxacin	Ciprobay	Levofloxacin	Tavanic	Moxifloxacin	Avalox	Doxycyclin	Vibramycin, Doxycyclin	Gentamicin	Refobacin, Gentamicin	Erythromycin	Paediatrocin, Infectomycin	Clindamycin	Sobelin	Cotrimoxazol	Kepinol, Eusaprim	Vancomycin	Vancomycin	Wirkstoff	Handelsname	Teicoplanin	Targocid	Linezolid	Zyvoxid	Daptomycin	Cubicin	Quinopristin/Dalfopristin	Synercid	Fusidinsäure	Fucidine	Fosfomycin	Infectofos	Rifampicin	Rifa
Wirkstoff	Handelsname																																																		
Penicillin	Megacillin, Isocillin																																																		
Ampicillin	biontal																																																		
Ampicillin/Sublactam	Unacid																																																		
Oxacillin	Staphylex																																																		
Cefazolin	Cefazolin																																																		
Cefuroxim	Elobact, Zinnat																																																		
Imipenem	Zienam																																																		
Ciprofloxacin	Ciprobay																																																		
Levofloxacin	Tavanic																																																		
Moxifloxacin	Avalox																																																		
Doxycyclin	Vibramycin, Doxycyclin																																																		
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin																																																		
Erythromycin	Paediatrocin, Infectomycin																																																		
Clindamycin	Sobelin																																																		
Cotrimoxazol	Kepinol, Eusaprim																																																		
Vancomycin	Vancomycin																																																		
Wirkstoff	Handelsname																																																		
Teicoplanin	Targocid																																																		
Linezolid	Zyvoxid																																																		
Daptomycin	Cubicin																																																		
Quinopristin/Dalfopristin	Synercid																																																		
Fusidinsäure	Fucidine																																																		
Fosfomycin	Infectofos																																																		
Rifampicin	Rifa																																																		

Rifampicin und Fosfomycin sind mögliche Kombinationspartner von Vancomycin bzw. Teicoplanin.

Mit Linezolid ist eine Monotherapie von MRSA- bzw. VRE-Infektionen möglich.

3. Antibiogramm bei gramnegativen Keimen

Wirkstoff	Handelsname
Ampicillin	biontal
Mezlocillin	Baypen
Ampicillin/Sublactam	Unacid
Amoxicillin/Clavulansäure	Augmentan
Piperacillin/Tazobactam	Tazobac
Cefuroxim	Elobact, Zinnat
Cefpodoxim	Orelox, Podomexef
Ceftriaxon	Rocephin
Ceftazidim	Fortum
Imipenem	Zienam
Meropenem	Meronem
Ciprofloxacin	Ciprobay
Levofloxacin	Tavanic
Doxycyclin	Vibramycin, Doxycyclin
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin
Cotrimoxazol	Kepinol, Eusaprim

4. Antibiogramm bei Pseudomonas species

Wirkstoff	Handelsname
Ampicillin/Sublactam	Unacid
Piperacillin	Pipril
Piperacillin/Tazobactam	Tazobac
Ceftazidim	Fortum
Cefepim	Maxipime
Imipenem	Zienam
Meropenem	Meronem

Ciprofloxacin	Ciprobay
Levofloxacin	Tavanic
Moxifloxacin	Avalox
Gentamicin	Refobacin, Gentamicin
Tobramycin	Gernebcin, Tobramaxin
Amikacin	Biklin
Tigecyclin	Tygacil
Aztreonam	Azactam
Fosfomycin	Infectofos
Polymyxin B	Polymyxin B

5. Antibiogramm bei Anaerobiern

Wirkstoff	Handelsname
Penicillin	Megacillin, Isocillin
Ampicillin/Sulbactam	Unacid
Moxifloxacin	Avalox
Erythromycin	Paediathrocin, Infectomycin
Clindamycin	Sobelin
Metronidazol	Clont, Flagyl

Da es sich bei Anaerobierinfektionen häufig um Mischinfektionen handelt (z.B. Peritonitis nach Perforation, Aspirationspneumonie), ist es sinnvoll für die kalkulierte Therapie ein anaerobierwirksames Antibiotikum zu wählen.

Typische anaerobiereirksame Antibiotika sind Metronidazol und Clindamycin. Über eine hohe Aktivität gegen Anaerobier verfügen auch Kombinationen mit β -Laktamase-Hemmern (z.B. Amoxycillin/Clavalsäure, Ampicillin//Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam) und Carbapeneme (imipenem, Meropenem, Ertapenem). Moxifloxacin weist nicht selten eine Resistenz auf. Beim Einsatz dieser Antibiotika kann daher (von Ausnahmen abgesehen) auf eine Kombination mit z.B. Metronidazol verzichtet werden. Im gegensatz dazu besitzen Ciprofloxacin oder viele Cephalosporine keine weitreichende Anaerobierwirksamkeit und sollten daher bei Anaerobierbeteiligung mit Metronidazol oder Clindamycin kombiniert werden.

Allgemeine Hinweise zur Antibiotikatherapie

Antibiogramm

Das Antibiogramm gibt darüber Auskunft, ob der isolierte Keim in vitro empfindlich (sensibel), intermediär oder resistent auf das getestete Antibiotikum reagiert. Das entsprechende Ergebnis muss nicht immer der Situation in vivo entsprechen, d.h. ein empfindlich getestetes Antibiotikum kann im Einzelfall in vivo versagen. Gründe hierfür sind:

- das Antibiotikum gelangt nicht oder nicht ausreichend an den Ort der Infektion (Wirkungsort)
- Induktion einer Resistenz in vivo, z.B. bei längerer Antibiotikatherapie
- das Antibiotikum wurde nicht entsprechend den Vorgaben dosiert
- der Patient verfügt über keine ausreichende Abwehr (z.B. Agranulozytose)

In bestimmten Fällen ist eine Kombinationstherapie angezeigt z.B.:

- kalkulierte Therapie bei Immunsuppression
- Vancomycin mit Rifampicin oder Fosfomycin bei einer MRSA-Infektion
- Ampicillin mit einem Aminoglykosid bei Enterokokken-Endokarditis
- Piperacillin, Ceftazidim oder Meropenem mit einem Aminoglykosid oder einem Gyrasehemmer (Ciprofloxacin oder Levofloxacin) bei schweren Pseudomonas Infektionen

Wenn klinisch indiziert und/oder auf Anfrage wird eine Resistenzbestimmung mittels MHK (Minimale Hemmkonzentration) eines bestimmten Keimes gegen ein Antibiotikum durchgeführt. Die MHK-Bestimmung von Penicillin ist z.B. wichtig bei der Therapie der Endokarditis durch vergrünende Streptokokken. Bei der Endokarditis durch Enterokokken ist die MHK gegenüber Aminoglykosiden relevant, um zu erkennen, ob eine "Low-Level-" oder "High-Level-Resistenz" vorliegt. Nur bei der "Low-Level-Resistenz" wirken Aminoglykoside synergistisch in Kombination mit Ampicillin, Mezlocillin oder Vancomycin.

Mikrobiologie | Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. | Bearbeitungsdauer: 24 Std. nach Einsatz von Kulturmaterial

Antibiotikaassoziierte Diarrhoe (AAD)	
Probenmaterial	Stuhl
Indikationen	Clostridium difficile, Indikation: Patienten mit blutiger/wässriger Diarrhoe bei Antibiotikaeinnahme in den letzten 60 Tagen oder Risikopatienten (> 65 Jahre, immunsupprimiert, schwere bzw. gastrointestinale Grunderkrankung); außerdem jede > 3 Tage andauernde Diarrhö mit/ohne vorherige Antibiose.
Anmerkungen	Stuhl Diagnostik sollte innerhalb von 3 Tagen erfolgen. Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Bei negativem Ergebnis und weiterbestehendem klinischen Verdacht sollten weitere Stuhlproben eingesandt werden.
Anti CENP Antikörper (Centromer Protein B)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 7 U/ml grenzwertig 7 - 10 U/ml positiv > 10 U/ml
Indikationen	ELiA CENP stellt eine Hilfe bei der klinischen Diagnose der systemischen Sklerose (CREST-Syndrom) dar.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CENPB Ansatz Tage: täglich Mo. - Fr.

Antidepressiva

Probenmaterial

Serum, **keine Gel-Röhrchen verwenden!**

Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.

Methode

LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)

Anmerkungen

Hämolytische, ikterische und lipämische Proben sollten wegen Störfaktoren nicht verwendet werden, die Befundung erfolgt daher unter Vorbehalt.

Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.

keine Gel-Röhrchen verwenden!

Analyt	Biologische Halbwertszeit (HWZ)t/2	Kommentar
Bupropion (BUPRO)	1 - 15 Std.	Hydroxybupropion ist der Hauptmetabolit von Bupropion, besitzt bis zu 50% dessen biologischer Aktivität
Hydroxybupropion (HYBUPR)	17 - 47 Std.	Hydroxybupropion ist der Hauptmetabolit von Bupropion, besitzt bis zu 50% dessen biologischer Aktivität
Citalopram (CITA)	38 - 48 Std.	Der N-demethylierte Metabolit könnte einen schwachen Beitrag zu den pharmakologischen Wirkungen leisten
Escitalopram (ESCI)	27 - 32 Std.	Der N-demethylierte Metabolit könnte einen schwachen Beitrag zu den pharmakologischen Wirkungen leisten
Duloxetine (DULO)	9 - 19 Std.	
Fluoxetine (FLUO)	4 - 6 Tage	
Desmethylfluoxetine (NFLUO)	4 - 15 Tage	
Milnacipran (MILN)	5 - 8 Std.	

Antidepressiva

	Mirtazapin (MIRT)	20 - 40 Std.	Der Metabolit Nor-Mirtazapin ist pharmakologisch nicht aktiv
	Venlafaxin (VENS)	4 - 14 Std.	O-Desthylvenlafaxin ist der aktive Metabolit von Venlafaxin
	O-Desmethylvenlafaxin (DEVE)	10 - 20 Std.	O-Desthylvenlafaxin ist der aktive Metabolit von Venlafaxin
	Sertralin (SERT)	22 - 36 Std.	

Antiepileptika

Probenmaterial

Serum, **keine Gel-Röhrchen verwenden!**

Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.

Methode

LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)

Anmerkungen

Hämolytische, ikterische und lipämische Proben sollten wegen Störfaktoren nicht verwendet werden, die Befundung erfolgt daher unter Vorbehalt.

Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.

keine Gel-Röhrchen verwenden!

Analyt	Biologische Halbwertszeit (HWZ) t _{1/2}	Kommentar
Ethosuximid (ETO)	33 - 55 Std.	
Lacosamid (LACO)	10 - 15 Std.	
Lamotrigin (LAMO)	14 - 104 Std.	Valproinsäure erhöht die Eliminationshalbwertszeit auf 45 - 75 Std., Carbamazepin, Phenytoin oder Phenobarbital verringern sie auf 9 - 14 Std.
Levetiracetam (LEVE)	6 - 8 Std.	Die Clearance mimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab, so dass eine um 30 bis 50 % geringere Dosis erforderlich ist, altersabhängiger Anstieg der HWZ
Oxcarbazepin (OXCA)	5 Std.	Der Metabolit 10-OH-Carbazepin ist die aktive Verbindung in vivo
10-OH-Carbazepin (OHCARB)	10 - 20 Std.	Der Metabolit 10-OH-Carbazepin ist die aktive Verbindung in vivo
Pregabalin (PREGA)	6 Std.	
Sultiam (SULT)	3 - 30 Std.	
	19 - 23 Std.	

Antiepileptika			
	Topiramat (TOPI)		
	Zonisamid (ZONI)	49 - 77 Std.	
Anti-FXa-Aktivität°			
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!		
Methode	Photometrie/Turbidimetrie		
Normalwerte	s. Befund		
Anmerkungen	Versand gefroren Blut sofort zentrifugieren, Überstand-Plasma abtrennen (neutrales Röhrchen) und einfrieren Angabe der Abnahmezeit erforderlich Angabe des verwendeten Heparins erforderlich ° Fremdleistung		
Anti HBc			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)		
Normalwerte	negativ		
Indikationen	akute, chronische oder ausgeheilte HBV-Infektion		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBC Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Zum Ausschluss einer frischen HBV-Infektion: Anti-HBc-IgM-Ak und HBsAg bestimmen		
Anti HBc-IgM			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)		
Normalwerte	negativ		
Indikationen	Diagnose der akuten Hepatitis B-Infektion		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBCM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.		

Anti HBs	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Bei ausgeheilter HBV-Infektion: positiver Nachweis von Anti HBs- und Anti-HBc-Ak.
Anmerkungen	Nach Impfung: Anti HBs-Impftiter-Bestimmung
Anti HBs quant.	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	Titer
Indikationen	Titerkontrolle 4 Wochen nach 3./4. Impfung;
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBST Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Immunität siehe aktuelle STIKO-Empfehlung nach Grundimmunisierung sollte ein Wert von > 100 IU/ml erreicht sein
Anti HCV	
Probenmaterial	Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HCV Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei akuter HCV-Infektion: HCV-Ak, ev. noch negativ, zum Virusnachweis HCV-PCR (EDTA-Blut) anfordern. Bei chron. Hepatitis C und Interferontherapie wird HCV-RNA quantitativ (EDTA-Blut) empfohlen.
Antikonvulsiva	
Probenmaterial	je 2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography) / GC (Gaschromatographie) / Photometrie
Indikationen	z.B.: Bromid Carbamazepin Clonazepam Diazepam (als Desmethyldiazepam) Diphenylhydantoin (DPH, Phenytoin) Dipropylacetat (DPA, Valproinsäure) Levetiracetam Ethosuximid Methsuximid (N-Desmethylnethsuximid) Nitrazepam Phenobarbital Primidon (als Phenobarbital) Sultiam Trimethadion Valproinsäure

Antikörper-Suchtest MuVo	
Probenmaterial	10 ml Vollblut Sicherung der Identität! Probenbeschriftung mit Vorname, Name und Geburtsdatum
Methode	Agglutinationsteste (Transfusionsmedizin)
Indikationen	Differenzierung irregulärer Antikörper, bzw. indirekter Coombstest zum Nachweis freier Antikörper im Patientenserum gegen Testerythrozyten. Blutgruppenbestimmung, Transfusion, Mutterschaftsvorsorge (Bestimmung in der 4.- 8. SSW und in der 24.- 29. SSW).
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AKSM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Anti-Mi 2-AK°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Polymyositis Dermatomyositis
Anmerkungen	Zusatztest bei pos. ANA (granuläres Muster) ° Fremdleistung
Antimon im Serum°	
Probenmaterial	5 ml Serum
Methode	AAS
Normalwerte	< 0,2 µg/l
Indikationen	V.a. Intoxikation, Therapiekontrolle
Anmerkungen	° Fremdleistung
Antimon im Urin°	
Probenmaterial	5 ml Urin
Methode	AAS
Normalwerte	< 0,2 µg/l
Indikationen	V.a. Intoxikation, Therapiekontrolle
Anmerkungen	° Fremdleistung

Anti-Müller-Hormon°

Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)		
Normalwerte	Personenkreis	Alter	Referenzbereich in ng/ml (2.5-97.5 Perzentile)
	Männer		0,77-14,5 (Median 4,79)
	Frauen	19-24 Jahre	1,22-11,7 (Median 4,0)
		25-29 Jahre	0,89-9,85 (Median 3,31)
		30-34 Jahre	0,58-8,13 (Median 2,81)
		35-39 Jahre	0,15-7,49 (Median 2,0)
		40-44 Jahre	0,03-5,47 (Median 0,88)
		45-50 Jahre	0,01-2,71 (Median 0,19)
		Menopause	< 0,1
		PCO-Syndrom ^{1,2}	2,41-17,10 (Median 6,81)
	Kinder und Jugendliche: Referenzbereiche nach Yates et al. 2019		
	Jungen	0-2 Tage	10,94-84,95 (Median 36,25)
		3-7 Tage	22,36-166,15 (Median 77,64)
		8-10 Tage	31,59-194,94 (Median 98,47)
		11-20 Tage	22,65-183,56 (Median 75,22)
		21-28 Tage	34,32-154,41 (Median 79,42)
		29-364 Tage	32,99-157,7 (Median 77,21)
		1-4 Jahre	43,52-199,64 (Median 97,03)
		5-7 Jahre	33,38-155,25 (Median 71,65)
		8-11 Jahre	

Anti-Müller-Hormon°

	Personenkreis	Alter	Referenzbereich in ng/ml (2.5-97.5 Perzentile)
			13,53-158,48 (Median 59,71)
		12-14 Jahre	1,32-46,48 (Median 10,04)
		15-18 Jahre	2,35-18,22 (Median 8,15)
	Mädchen	0-28 Tage	< 0,94 Median 0,06)
		29-364 Tage	< 4,37 Median 0,19)
		1-4 Jahre	0,18-6,12 (Median 1,62)
		5-7 Jahre	0,19-5,53 (Median 1,51)
		8-11 Jahre	0,41-7,4 (Median 2,38)
		12-14 Jahre	0,42-6,52 (Median 2,21)
		15-18 Jahre	0,29-11,78 (Median 2,77)
		PCO-Syndrom ¹	2,41-17,10 (Median 6,81)
	¹ Gemäß den überarbeiteten Diagnosekriterien der PCOS-Konsens-Arbeitsgruppe Rotterdam (<i>European Society of Human Reproduction and Embryology/American Society of Reproductive Medicine</i>). ² 5.-95. Perzentile Für Frauen über 50 Jahre gibt der Testhersteller keinen validen Referenzbereich an. Postmenopausal <0.1 ng/ml, erfahrungsgemäß finden sich bei Frauen über 50 Jahre nur sehr selten Werte über 0.1 ng/ml.		
Indikationen	Marker der ovariellen Funktionsreserve (unabhängig vom Zyklustag); Vorbereitung auf In-Vitro-Fertilisation, Sterilitätsdiagnostik, azyklische Östrogenbildung in der Perimenopause; PCO-Syndrom; Granulosazell-Tumoren: Verlaufskontrolle; pädiatrische Indikationen: Anorchie, Pubertas praecox vera		
Anmerkungen	Stabilität: 3 Tage bei 20-25°C, 5 Tage bei 2-8°C, 6 Monate bei -20°C ° Fremdleistung		

Antimykogramm

Anmerkungen

Wirkstoff	Handelsname
Fluconazol	Diflucan, Fungata
Itraconazol	Sempera, Siros
Clotrimazol	Canesten
Voriconazol	Vfend
Amphotericin B	Amphotericin B, Ambisome

Fluconazol / Itraconazol

Wirksam gegen Candida-Arten mit Ausnahme von Candida krusei. Gegen Candida glabrata besteht meist nur eine eingeschränkte Wirksamkeit. Resistenzentwicklung insbesondere nach längerer Anwendung möglich. Fluconazol ist im Gegensatz zu Itraconazol nicht zur Therapie einer Aspergillose geeignet.

Clotrimazol

Lokales Antimykotikum bei Hautmykosen durch Hefe- und Schimmelpilze sowie Vaginalmykosen.

Voriconazol

Mittel der Wahl bei Aspergillose. Weist ein umfassendes Spektrum gegenüber Hefe- und Schimmelpilzen einschließlich Candida krusei und Candida glabrata auf, nicht jedoch gegenüber Mucor spp.

Amphotericin B

Wirksam gegen die meisten Hefe- und Schimmelpilze einschließlich Mucor spp. (Ausnahmen: Aspergillus terreus, Fusarium spp., Cladosporium spp., Fonsecaea spp., ggf. Candida lusitanae).

Mikrobiologie | Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. | Bearbeitungsdauer: 24 Std. nach Einsatz von Kulturmaterial

Antimykotika

Normalwerte siehe Befund

Anmerkungen siehe Mikrobiologie

Anti-PM1 AK

Probenmaterial 1 ml Serum

Normalwerte siehe Befund

Indikationen Polymyositis

Anti RNP70 Antikörper (70 kDa)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 7 U/ml
Indikationen	Mischkollagenose (MCTD), systemischer Lupus erythematosus (SLE)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RNPW Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Anti Sm Antikörper (SmD3-Peptid)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 7 U/ml
Indikationen	SLE
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SMD_AK Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Antistaphylolysin (qualitativ/quantitativ) ASA ASAQ°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Partikelagglutination
Normalwerte	< 0,2 IU/ml
Indikationen	Staph. aureus-Infektionen, bei denen der direkte Erregernachweis schwierig ist (z.B. Osteomyelitis)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Antistreptodornase B°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Agglutinationstest
Normalwerte	< 200 U/ml
Indikationen	Verdacht auf rheumatisches Fieber Nachweis einer Streptokokken-Folgeerkrankung (z.B. Glomerulonephritis, akute Endokarditis, RF, Chorea minor Sydenham, Scharlach)
Anmerkungen	° Fremdleistung

Antistreptolysin O ASL quantitativ	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	Erwachsene < 200 IU/ml Kinder altersabhängig
Indikationen	Streptococcus pyogenes-Infektionen (GAS Gruppe A Streptokokken)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ASL, ASLLG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. weitere Antikörper auch bei normalem ASL: Antistreptodornase B, Hyaluronidase-Ak
Antithrombin III Aktivität	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma, GEFROREN! Angabe der Abnahmezeit erforderlich
Methode	chromogene Messung
Normalwerte	83 - 128 %
Indikationen	rezidivierende Thrombosen disseminierte intravasale Gerinnung (DIC) V.a. AT-Mangel Thrombophiliescreening chromogen Verbrauchskoagulopathie Nephrotisches Syndrom Sepsis Heparintherapie (V.a. Heparinresistenz) Frühgeburten Chron. Leberschaden
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ATAK Ansatztage: 1 x Woche Mi. oder Do.
Anti U1RNP Antikörper (RNP70, A, C)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 5 U/ml
Indikationen	Mischkollagenose (MCTD), systemischer Lupus erythematosus (SLE)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: U1RNPS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
AP-Isoenzyme°	
Probenmaterial	1 ml Serum nach 12-stündiger Nahrungskarenz
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	Leber Frauen < 45 U/l Leber Männer < 64 U/l Leber Kinder < 51 U/l Galle < 8 U/l Knochen Frauen < 44 U/l Knochen Männer < 73 U/l Knochen Kinder < 370 U/l je nach Wachstumsaktivität Darm < 10 U/l
Indikationen	Differentialdiagnose Leber/Knochenaffektion bei Tumoren Dünndarm-AP-Erhöhung bei Leberzirrhose, intrahepatischer Cholestase, entzündlicher Darmerkrankung, chron. Hämodialyse
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: APGA, APLE, APDA, APKN Ansatztage: nach Bedarf

AP, knochenspezifisch Ostase°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	Frauen prämenopausal 4.9 – 26.6 U/l Frauen postmenopausal 5.2 – 24.4 U/l Männer ab 18 J. 5.5 – 22.9 U/l Kinder wachstumsabhängig
Indikationen	direkter immunologischer Nachweis erhöht: Knochenmetastasen, metabolische Knochenerkrankungen (M. Paget), Osteoporose bei postmenopausalen Frauen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Apolipoprotein A1°	
Probenmaterial	1 ml Serum, Nahrungskarenz 10 – 14 h
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	Frauen 108 - 185 mg/dl Männer 90 - 170 mg/dl
Indikationen	Familiäre Hyperlipoproteinämie Früherfassung des Arteriosklerose-Risikos Apo A1 ist der Hauptproteinbestandteil von HDL bei KHK-Patienten: erniedrigte Apolipoprotein und erhöhte Apolipoprotein-B-Serumspiegel
Anmerkungen	° Fremdleistung
Apolipoprotein A2°	
Probenmaterial	1 ml Serum, Nahrungskarenz 10 – 14 h
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	26 – 51 mg/dl
Indikationen	Familiäre Hyperlipoproteinämie Früherfassung des Arteriosklerose-Risikos Apo A2 ist Bestandteil von HDL
Anmerkungen	° Fremdleistung

Apolipoprotein B°	
Probenmaterial	1 ml Serum, Nahrungskarenz 10 – 14 h
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	weiblich: 0,51 - 1,28 g/l männlich: 0,45 - 1,39 g/l
Indikationen	Differenzial-Diagnostik von Hyper- und Dyslipoproteinämien, Risikoabschätzung und Früherkennung des atherogenen Risikos sowie Verlaufskontrolle unter lipidsenkender Therapie
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: APOB Ansatztage: Di, Do Allgemeiner Hinweis: Östrogene, mäßiger Alkoholgenuss, Phenobarbital, Phenytoin, Prednisolon, Schwangerschaft, Gewichtsverlust bei übergewichtigen Personen und körperliche Arbeit können zur Erhöhung von APO B führen. erhöht bei • Hyperlipoproteinämien Typ II A, II B, IV und V, • Diabetes mellitus • Hypothyreose • nephrotisches Syndrom • Leberschaden • M. Cushing • Gravidität • Anorexie erniedrigt bei: • Alpha-Lipoproteinmangel (Tangier-Erkrankung), • Hypo-Beta-Lipoproteinämie und Typ 1 Hyperlipoproteinämie. Hohe Spiegel des Apolipoprotein B bedeuten ein deutlich erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Empfohlene Apo B-Zielwerte, wenn der LDL-Zielwert erreicht ist (ESC/EAS 2019):

Apolipoprotein B°	
	Bei sehr hohem kardiovaskuläres Risiko: < 0,65 g/l Bei hohem kardiovaskulären Risiko: < 0,8 g/l Bei mittlerem kardiovaskulären Risiko: < 1,0 g/l Abrechnungsziffer (EBM) 32452 Abrechnung GOÄ 3725
Apolipoprotein E-Genmutation°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	1. ApoE-Genotypbestimmung vor Beginn der Alzheimer-Therapie mit Lecanemab. 2. Abklärung einer genetischen Disposition zur familiären Dysbetalipoproteinämie (Typ III-Hyperlipoproteinämie). Ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht bei Homozygotie der ApoE2 Variante.
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: APEG Ansatztage: bei Bedarf Laut Gendiagnostik-Gesetz ist eine Einwilligungserklärung des Patienten zu genetischen Untersuchungen erforderlich. Wir dürfen diese Untersuchung nur durchführen, wenn Sie uns den Nachweis der Einwilligung des Patienten vorlegen oder zusichern, dass Ihnen die Einwilligung vorliegt. Entsprechende Formulare können Sie bei uns anfordern oder von der Homepage herunterladen. Die Untersuchung stellt keine Kassenleistung dar. Sie wird als Selbstzahlerleistung erbracht.

aPTT (aktivierte Partielle Thromboplastinzeit)	
Probenmaterial	4 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Koagulometrisch
Normalwerte	25,1 - 36,5 sec
Anmerkungen	Versand gefroren Angabe der Abnahmezeit erforderlich Gerinnungsuntersuchungen Die Referenzbereiche gelten für Erwachsene. Die Referenzbereiche für Kinder können altersabhängig abweichen. Befundkonstellationen, mögliche Ursachen und weiteres Vorgehen: aPTT verlängert, Quick, Thrombinzeit und Thrombozytenzahl normal, keine Gabe von Heparin: Mögliche Ursachen: Verminderung einer der Faktoren VIII, IX, XI, XII Inhibitoren gegen Gerinnungsfaktoren von Willebrand-Syndrom (vWS) Lupusantikoagulanzen (anamnestisch Thrombosen, Aborte) Weitere Diagnostik: Bestimmung der Einzelfaktoren: F VIII (Hämophilie A) und Faktor IX (Hämophilie B) ggf. Faktor XI und XII Diagnostik des von-Willebrand-Syndroms (u.a. von-Willebrand-Aktivität/Ristocetin-Cofaktor) Antiphospholipid-Ak, Lupus-Antikoagulans Inhibitor-Nachweis

Aquaporin 4 AK im Serum°	
Probenmaterial	Serum Bevorzugtes Probenmaterial: Liquor cerebrospinalis
Methode	IFT (Indirekte Immunfluoreszenz-Mikroskopie)
Normalwerte	< 1:10,00 Titer
Indikationen	Verdacht auf Neuromyelitis optica (NMO, Devic Syndrom)
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: AQU4 Ansatztage: Mi., Fr. Ein positiver IFT sollte durch eine zweite Testmethode (ELISA, Immunoblot) bestätigt werden.
Aquaporin 4 im Liquor AK °	
Probenmaterial	Liquor
Methode	IFT (Indirekte Immunfluoreszenz-Mikroskopie)
Normalwerte	< 1:1 Titer
Indikationen	Verdacht auf Neuromyelitis optica (NMO, Devic Syndrom)
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: AQU4L Ansatztage: Mi., Fr. Allgemeine Hinweise zur Gewinnung und Versand von Liquorproben: • Polypropylen-Röhrchen (PP) verwenden. Kein Glas- oder Polystyrol-Röhrchen (PS). Probendeckel fest verschließen und mit Parafilm abdichten. • Bei multiplen Untersuchungen aus Liquor, ausreichend Liquor als mehrere Einzelproben (mind. 3 x á 3ml) einsenden, da Messungen u.a. in weiteren Fremdlaboren erfolgen. • Um wiederholtes Auftauen zu vermeiden, kann aus gefrorenen Liquor nur ein Analyt bestimmt werden. Daher für mehrere Untersuchungen aus gefrorenen Liquor, zusätzliche gefrorene Einzelproben einsenden. • Für Reiber-Diagramme Serum und Liquor gleichzeitig (<1h Abstand) abnehmen und taggleich einsenden. • Falls dringliche Analyte priorisiert werden sollen, bitte diese auf Anforderung vermerken.
Arginin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 46 - 128 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Aripiprazol im Serum	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Normalwerte	Summe aus Aripiprazol und Dehydroaripiprazol: therapeutischer Bereich: 100-350 ng/ml toxischer Bereich: ab 1000 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ARIP Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden!
Arsen im Serum°	
Probenmaterial	5 ml Serum
Methode	AAS
Normalwerte	< 2.1 µg/l
Indikationen	V.a. akute oder chronische Intoxikation Krebs erzeugender Arbeitsstoff
Anmerkungen	° Fremdleistung
Arsen im Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	AAS
Normalwerte	< 25 µg/l
Indikationen	V.a. akute oder chronische Intoxikation Krebs erzeugender Arbeitsstoff
Anmerkungen	° Fremdleistung
Articain°	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 40 pg/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung
Ascaris lumbricoides-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 1:10 Titer-E grenzwertig 1:10 Titer-E positiv > 1:10 Titer-E
Anmerkungen	° Fremdleistung

Ascaris lumbricoides im Stuhl	
Probenmaterial	1g Stuhl
Methode	Mikroskopie
Normalwerte	negativ
Indikationen	Spulwurminfektion: Nachweis von Wurmbestandteilen oder Wurmeiern im Stuhl
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage
Asparagin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 35 - 63 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Asparaginsäure°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 1 - 9 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Aspergillus-IgE-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. exogen-allergische Alveolitis
Aspergillus-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. Aspergillom invasive Aspergillose
Anmerkungen	° Fremdleistung
Aspergillus spp.	
Methode	Kultureller Nachweis
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 14 Tagen

Asthma/Rhinitis SAISONAL	
Probenmaterial	1 bis 5 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	saisonale Beschwerden
Asymmetrisches Dimethylarginin°	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	50 - 110 µg/L
Indikationen	Zusätzlich kann angegeben werden: symmetrisches Dimethylarginin (SDMA). Erhöhte ADMA-Konzentrationen legen aufgrund der inhibitorischen Wirkung an der NOS ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse bzw. für plazentare Minderperfusion nahe.
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: ADMA Ansatztage: 1 x je Woche Tiefgefroren. Serum möglichst rasch (innerhalb von 1 Stunde) nach Blutentnahme von anderen Blutbestandteilen abtrennen und tiefgefrieren. Stabilität bei -20°C 14 Tage
Atomoxetin°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therapeutisch: 200-1000 ng/ml Kritisch ab 2000 ng/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ATOM Ansatztage: nach Bedarf Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Spitzenspiegel 60 bis 90 min nach Einnahme von 1,2 mg/kg täglich. <i>Quelle: Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology (AGNP) 2017</i> <i>Gemäß AGNP wird das TDM von Atomoxetin als nützlich für spezielle Indikationen oder bei spezifischen Problemen eingeschätzt, z.B. bei der Fragestellung, ob Plasmakonzentrationen für eine bestimmte Dosis plausibel sind oder ob bei Nonrespondern, die zu niedrige Plasmakonzentrationen aufweisen, durch Dosissteigerung eine klinische Besserung erwartet werden kann. (Empfehlung AGNP Stufe 3: TDM nützlich)</i>

Autoimmundiagnostik		
Probenmaterial	je 1 ml Serum	
Normalwerte	siehe Arztbericht	
Indikationen	Autoantikörper	Krankheitsassoziation
	Acetylcholin-rezeptoren	Myasthenia gravis
	ANCA	Anti-Neutrophile-zytoplasmatische Antikörper
	c-ANCA	Wegenersche Granulomatose zytoplasmatisches Muster; Zielantigen: Proteinase 3
	p-ANCA	Vaskulitis, mikroskopische Polyangitis, Churg-Strauss-Syndrom Goodpasture-Syndrom perinukleäres Muster; Zielantigen: Myeloperoxidase
	Antimitochondriale-Ak (AMA)	primäre biliäre Zirrhose (PBC)
	Antinukleäre-Ak (ANA)	SLE, medikamenteninduzierter LE Autoimmunhepatitis, SHARP-Syndrom Sklerodermie, CREST-Syndrom, Sjögren-Syndrom Felty-Syndrom, Polymyositis
	Doppelstrang-DNS	Verdacht auf SLE bei negativem ANA
	Einzelstrang-DNS°	medikamenteninduzierter LE, SLE
	Basalmembran	
	Alveolen-Basalmembran	Goodpasture-Syndrom
	Epidermale Basalmembran	Bullöse Dermatosen
	Glomerulus-Basalmembran	Goodpasture Syndrom, Autoimmunglomerulonephritis
	Tubulus-Basalmembran	Interstitielle Nephritis, Glomerulonephritis
	beta-2-Glykoprotein	Antiphospholipidsyndrom, habituelle Aborte, Thromboseneigung
	C3-Nephritis-Faktor	Membrano-proliferative Glomerulonephritis
	Cardiolipin IgG/IgA/IgM	

Autoimmundiagnostik

		Antiphospholipidsyndrom, habituelle Aborte, Thromboseneigung
	CCP (Cycl. Citrullinierte-Peptid-Ak)	Rheumatoide Arthritis
	tTG-Endomysium-IgA	Zöliakie-Diagnostik-Suchtest, Kinder ab 10 Jahre, jährliches Screening bei Hochrisikopatienten, Abfall bei Diät (nach ca. 3. Monaten)
	GAD-Ak (Glutamat-Decarboxylase-Ak)	Typ I-Diabetes autoimmuner Diabetes
	Glatte Muskulatur	Autoimmunhepatitis Bei positivem Nachweis empfiehlt sich die Untersuchung auf anti-Actin-Spezifität. Chronisch aggressive Hepatitis, primäre biliäre Zirrhose
	Gliadin	Minderwuchs, Sprue, asymptomatische glutensensitive Enteropathie, Dermatitis herpetiformis
	Herzmuskulatur	Kardiomyopathien, Myokarditis, Postmyokardinfarktsyndrom
	Histone	SLE, Medikamenten-induzierter LE, Rheumatoide Arthritis
	Inselzellen (Pankreas)	Insulinpflichtiger Diabetes mellitus, juveniler Diabetes, Typ I-Diabetes
	Inselzellantigen 2 IA2	Diabetes mellitus Typ I
	Insulin	Insulintherapie (Insulinresistenz)
	Intrinsic-Faktor	perniziöse Anämie, atrophische Gastritis
	ENA-Ak (extrahierbare nukleäre Antigene)	Sharp-Syndrom, SLE, Misch-Kollagenosen, Rheumatische Arthritis
	Ro/SSA	Sjögren-Syndrom, (SLE)
	La/SSB	Sjögren-Syndrom, (SLE), neonataler LE kongenitaler Herzblock, subakuter kutaner LE
	Sm	SLE

Autoimmundiagnostik

	RNP/Sm	MCTD, (SLE)
	Scl-70	Sklerodermie
	Jo-1 (Histidyl-tRNA-Synthetase)	Dermato-/Polymyositis
	Histone	medikamenteninduzierter LE, SLE
	Anti-Mi 2	Polymyositis, Dermatomyositis, Zusatztest bei pos. ANA (granuläres Muster)
	Anti-PM1	Polymyositis
	Anti-RANA (P62)	Rheumatoide Arthritis
	Anti-U1-n-RNP	Mischkollagenose, systemischer LE, Medikamenten-induzierter LE, Sklerodermie, rheumatoide Arthritis
	Anti-Zentromeren	CREST-Syndrom
	Kollagen II	rheumatische Erkrankungen
	Lebermembran-Antigen (LMA)	autoimmune, chronisch aggressive Hepatitis
	LK Liver-Kidney-Mikrosomen (LKM)	Autoimmunhepatitis, medikamenteninduzierte Hepatiden
	LSP Leber-spezifisches-Protein	chronische und chronisch aggressive Hepatiden (autoimmune und viral induzierte), akute Hepatiden (möglicher Indikator für Therapieerfolg und Krankheitsaktivität)
	Lupus-Antikoagulans	LE und Koagulopathien, aPTT-Verlängerung bei Autoimmunerkrankungen, Antiphospholipidsyndrom (APS)
	Myelin	idiopathische Polyneuritis (Guillain-Barré)
	Pankreas (Acinuszellen)	akute Pankreatitis
	Parietalzellen (Magen)	atrophische Gastritis, perniziöse Anämie, Vitiligo, Autoimmunthyreoiditis, niedrige

Autoimmundiagnostik

		Titer auch bei älteren, gesunden Menschen
	Ribonukleinsäure (RNA)	SLE, Kollagenosen
	SLA Leber-Pankreas Ag	Autoimmunhepatitis
	TAK Thyreoglobulin-Ak	Hashimoto-Thyreoiditis, Myxödem, Hyperthyreose Therapie- und Verlaufskontrolle
	TPO-Ak (Anti-Thyreoidale Peroxidase)	TPO ersetzt die MAK-Bestimmung (neuer spez. Test auf mikrosomale Ak) Hashimoto-Thyreoiditis, Myxödem, Hyperthyreose, Therapie und Verlaufskontrolle
	T3-Ak, T4-Ak	unklare Schilddrüsenhormonkonstellation Diskrepanzen zwischen Klinik und Schilddrüsenwerten
	TRAK TSH-Rezeptoren-Ak	Hyperthyreose, Marker für Morbus Basedow, ein Bestehenbleiben bei Therapie deutet auf Relaps. Bei HLA-DR-positiven Patienten Hinweis auf geringe Ansprechbarkeit antithyreoidaler Therapie, Indikation zur ¹³¹ Jod-Therapie oder Operation
	Skelettmuskel-Ak	Myastenia gravis, Thymom
	Speicheldrüsengangepithel	Sjögren-Syndrom
	Spermatozoen-Ak	Vasektomierte Männer, ungeklärte Infertilität
	Stachelzell-desmosomen	Pemphigus
	Thrombozyten-Ak	Immunthrombozytopenien
	Tränendrüsengangepithel	Sjögren-Syndrom
	Zellkern-Ak/ANF/ANA	SLE, Kollagenosen, Autoimmunhepatitis
	Zentromere	CREST-Syndrom

Autoimmun/system-Erkrankungen

Indikationen

Autoimmun/System-Erkrankungen	klinisch relevante Antikörper-Spezifität
Systemischer Lupus erythematodes (SLE)	Zellkerne (ANA), Doppelstrang-DNS, Sm, SSA-58 kD (Ro), SSA-52 kD (Ro), SSB (La), RNP, Cardiolipin (Phospholipid), Ku, ribosomales P0, PCNA
Medikamenten-induzierter systemischer LE	Zellkerne (ANA), Histone, Einzelstrang-DNS°
Mischkollagenose (MCTD),	
Sharp-Syndrom, Overlap-Syndrom	Zellkerne (ANA), RNP
Sjögren-Syndrom	Zellkerne (ANA), SSA-58 kD, SSA-52 kD, SSB
Polymyositis/Dermatomyositis	Zellkerne (ANA), Nukleoli, PM-Scl, Mi-2, Jo-1
Sklerodermie, progressive Systemsklerose (PSS)	Zellkerne (ANA), Nukleoli, Scl-70 Zentromere (CENP-B), Scl-34 (Fibrillarin)
„CREST“-Syndrom Wegenersche Granulomatose	Zellkerne (ANA), Zentromere, Scl-70 c-ANCA, Proteinase 3, p-ANCA, Myeloperoxydase (Granulozyten-Zytoplasma)
Rheumatoide Arthritis	IgM-, IgG-Rheumafaktoren, anti CCP
Vaskulitis	
Panarteriitis nodosa	c-ANCA, Proteinase 3
mikroskopische Polyarteriitis	p-ANCA, Myeloperoxydase
Immunkomplex-Vaskulitis	zirkulierende Immunkomplexe
Kawasaki-Syndrom	c-ANCA
Raynaud-Syndrom	Kryoglobuline, Kälteagglutinine,

Autoimmun/system-Erkrankungen

		Zellkerne, Doppelstrang-DNS, RNP
	Niere	
	Anti-Basalmembran-Glomerulonephritis (Goodpasture-Syndrom)	glomeruläre Basalmembran (GBM)
	rapid-progressive Glomerulonephritis	p-ANCA, Myeloperoxidase, c-ANCA, Proteinase 3
	Wegenersche Granulomatose	c-ANCA, Proteinase 3
	membranoproliferative Glomerulonephritis Typ II	C3-Nephritis-Faktor (anti-C3-Konvertase)
	systemischer LE (Lupusnephritis)	Zellkerne, Doppelstrang-DNS
	Immunkomplex-Glomerulonephritis	zirkulierende Immunkomplexe
	Leber	
	primär biliäre Zirrhose (PBC)	Mitochondrien (AMA), AMA-M2 (pathognomisch)
	autoimmune chronisch aktive Hepatitis (CAH)	Leber-Nieren-Mikrosomen: LKM-1 (Cytochrom P450 2D6), glatte Muskulatur, Aktin, lösliches Leberantigen (SLA)
	CAH/PBC-Overlap-Syndrom	Mitochondrien (AMA)
	Endokrines System	
	M. Addison	Nebennierenrinde, 21-Hydroxylase
	primärer Hypoparathyreoidismus	Nebenschilddrüse
	Typ I Diabetes	Glutamat-Decarboxylase (GAD), Inselzellantigen (IA2), Insulin
	Gastrointestinaltrakt	
	chron. atrophische Gastritis Typ A	Magenparietalzellen, Intrinsic-Faktor
	Typ I Diabetes	Glutamat-Decarboxylase (GAD), Inselzellantigen (IA2), Insulin

Autoimmun/system-Erkrankungen

	Colitis ulcerosa	DNA-AK
	Morbus Crohn	ASCA
	Zöliakie, Gluten-sensitive Enteropathie	Gliadin, Endomysium, gewebspezif. Transglutaminase (TTG)
	Gerinnungssystem	
	Immunthrombozytopenie (M. Werlhof)	Thrombozyten-Ak
	Anti-Phospholipid-Syndrom	Cardiolipin, β 2-Glycoprotein 1
	Hämatologie	
	perniziöse Anämie	Magenparietalzellen, Intrinsic-Faktor
	Autoimmungranulozytopenie	Granulozyten
	Autoimmunhämolytische Anämie	Erythrozyten Typ: Kälteagglutinine (Spezifität meist Anti-I, selten Anti-i) Wärmeautoantikörper (Spezifität meist Anti-e) Donath-Landsteiner-Antikörper = biphasische Kältehämolysine (Spezifität meist Anti-P)
	Autoimmunthrombozytopenie	Thrombozyten
	Haut	
	Pemphigus vulgaris	Stachelzell-desmosomen (Interzellulärsubstanz), Desmoglein 3 und 1
	bullöses Pemphigoid	epidermale Basalmembran (Hemidesmosomen),
	Dermatitis herpetiformis Duhring	Endomysium, Gliadin (Gluten), gewebsspez. Transglutaminase
	Herz	
	idiopathische Kardiomyopathie	Herzmuskel (myofibrillärer Typ)
	Lunge	
		alveoläre Basalmembran, glomeruläre Basalmembran

Autoimmun/system-Erkrankungen

	Pulmonale Hämorrhagie (Goodpasture-Syndrom)	
	Wegenersche Granulomatose	c-ANCA, Proteinase 3
	Nervensystem	
	Myasthenia gravis	Acetylcholinrezeptor, Titin
	Lambert-Eaton myasthenes Syndrom (LEMS)	Calcium-Kanäle
	Paraneoplastisches neurologisches Syndrom	HuD, Ri, Yo
	Polyneuropathie	Ganglioside, Myelin-assoziiertes Glykoprotein
	Reproduktion	
	Fertilitätsstörungen	Spermatozoen
	Schilddrüse	
	chron. autoimmune Thyreoiditis (Hashimoto)	Thyreoperoxidase (TPO, mikrosomale Schilddrüsenantigene), Thyreoglobulin (TG)
	primäre Hypothyreose (Myxödem)	Thyreoperoxidase (TPO), Thyreoglobulin (TG)
	M. Basedow	TSH-Rezeptor (TRAK), Thyreoperoxidase (TPO) Thyreoglobulin (TG)

Autoimmunthrombozytopenie°

Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung

Azathioprin als 6-Mercaptopurin°		
Probenmaterial	Serum GEFROREN!	
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)	
Normalwerte	Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert
	Therap. Ber. max.	40 - 300 µg/L
	Tox. Ber.	> 1000 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: AZAT Ansatzstage: Mi., Fr. HWZ ca. 1,5 Std. Serum: Auch als inaktiver Metabolit von Azathioprin. Besser geeignet zur Therapieüberwachung ist die Bestimmung der Thioguanin-Nucleotide im Heparin- oder EDTA-Blut.	
Baclofen°		
Probenmaterial	Serum	
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)	
Normalwerte	Therapeutischer Bereich	80 - 400 µg/L
	Toxischer Bereich	ab 1000 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: BACL Ansatzstage: täglich Mo., Mi., Fr.	

Bakteriologische Untersuchung	
Methode	Verschiedene Methoden (siehe jeweilige Analyte)
Indikationen	Pathogene Keime: Salmonellen, Shigellen, Yersinien, Campylobacter Dyspepsie coli (EPEC): I.d.R. nur bis zu einem Alter von 3 Jahren sinnvoll; wird bei Kindern bis zu 3 Jahren bei Anforderung auf „pathogene Keime“ stets mit untersucht Alle weiteren Untersuchungen bitte gesondert anfordern, da sie <i>nicht</i> in der Anforderung „pathogene Keime“ enthalten sind.
Anmerkungen	Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. 1/3 mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlanteile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen. Mikrobiologie Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: siehe jeweilige Analyte
Barbiturate (Einzelnachweis)	
Probenmaterial	5 ml Serum, 10 ml Urin
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therapeutische Bereiche der Nachweisgrenze s. Bericht
Indikationen	z.B. Barbital, Butalbital, Cyclobarbitol, Hexobarbital, Pentobarbital, Secobarbital

Bartonella quintana-Ak IgG und IgM°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	IgG-Titer $\geq 1:256$ können auch auf eine kürzliche Infektion hinweisen. IgG-Titer normal $< 1:320$ Titer IgM $< 1:100$ Titer
Indikationen	generalisierte Erkrankung mit hohem Fieber
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: IgG: BAQG IgM: BAQM Ansatztage: Mo., Mi.
Basophile	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: $< 1,75 \%$
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BASO Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Basophile absolut	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: $0 - 0,20 \times 1000/\mu\text{l}$
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BASOA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Bence-Jones-Proteine	
Probenmaterial	2 ml Serum, 10 ml Urin (2. Morgenurin)
Methode	Immunfixationselektrophorese
Normalwerte	siehe Befund
Benzodiazepine im Serum°	
Probenmaterial	5 ml Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therapeutische Bereiche der Serumwerte siehe Befund
Indikationen	z.B. Bromazepam, Flurazepam, Lorazepam, Oxazepam
Anmerkungen	°Fremdleistung Analyt Kürzel: BENS Ansatztage: täglich, Mo. - Fr.

Benzodiazepine im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	KIMS
Normalwerte	Schwellenwert 100 ng/ml
Indikationen	V.a. Medikamentenmissbrauch V.a. akute Intoxikation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BENZ Ansatztage: täglich Mi.+ Fr. bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern
Benzol°	
Probenmaterial	2 ml Blut*
Methode	GC/MS
Normalwerte	< 0.5 µg/l
Anmerkungen	* Spezial-Röhrchen anfordern: „Lösungsmittel im Blut“ Krebserzeugender Arbeitsstoff ° Fremdleistung
Benzoyllecgonin im Haar (GCMS)°	
Probenmaterial	Haare
Methode	GCMS
Normalwerte	< 0,02 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung
Bicarbonat	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Normalwerte	22 - 29 mmol/l
Indikationen	Beurteilung des Säure-Basen-Haushalts, Diagnose von Stoffwechselerkrankungen, Überprüfung der Nierenfunktion, Indikator für Atemwegserkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BICA Ansatztage: nach Bedarf Niedrige Bicarbonat-Werte: Können auf eine metabolische Azidose hindeuten, eine Überprüfung der Nieren- und Lungenfunktion ist erforderlich. Hohe Bicarbonat-Werte: Können auf eine metabolische Alkalose hinweisen.

Bilirubin – direkt	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	< 0.25 mg/dl
Indikationen	erhöht: Einschränkung der biliären Sekretion Obstruktion der extrahepatischen Gallenwege (Konkrement, Tumor) akute Virushepatitis Leberzirrhose Fettleber
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BILI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Bilirubin gesamt	
Probenmaterial	1 ml Serum hämolysefrei
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 1 mg/dl Neugeborenenwerte < 6 mg/dl bis 24 Std. < 7 mg/dl 24-72 Std. < 12 mg/dl bis 1 Jahr
Indikationen	Diagnostik und Verlaufskontrolle des Ikterus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BIDI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Bilirubin im Fruchtwasser	
Probenmaterial	2 ml Fruchtwasser frisch sofort zentrifugieren!
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. intrauterine Hämolyse durch diaplazentar übergetretene antierythrozytäre Antikörper der Mutter z.B. Anti-D, Anti-c, Anti-e, Anti-Kell
Bilirubin im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Combur-Test
Indikationen	Bilirubin entsteht in der Leber, in der Milz und im Knochenmark beim Abbau des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Seine Ausscheidung erfolgt im Normalfall über die Gallenwege in den Darm. Sind die Gallenwege z.B. durch einen Gallenstein oder Tumor verlegt, sammelt sich das Bilirubin im Blut an und wird schließlich mit dem Urin über die Nieren ausgeschieden. Die Anwesenheit des rot-orange-farbigem Bilirubins und seiner Abbauprodukten führt zu einer auffälligen Dunkelfärbung des Urins.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BIU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Bilirubin - indirekt	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	< 0.75 mg/dl
Indikationen	erhöht: hämolytische Anämie M. Hämoliticus neonatorum

Biotin Vitamin H°	
Probenmaterial	1 ml Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 4 Wochen
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	> 200 pg/ml
Indikationen	Werte unter 100 pg/ml deuten auf Biotinmangel
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: BIOT Stabilität 2-8 °C: 4 Wochen
Biperiden°	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	1,0 - 6,5 µg/L toxisch > 13 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: BIPE Ansatztage: Mo., Mi., Fr. Pakinsonmittel Die biologische Halbwertszeit von Biperiden beträgt 18 bis 24 Std. Präanalytik: Der angegebene Referenzbereich bezieht sich auf einen Spitzenspiegel entnommen 30 Min. bis 2 Std. nach einer Gabe von 4 mg Biperiden.

Blasenbilharziose / Bilharziose (Schistosomen)°	
Probenmaterial	24-Stunden-Urin Antikörpernachweis: 1 ml Serum
Methode	Mikroskopischer Nachweis
Indikationen	V.a. Blasenbilharziose
Anmerkungen	° Fremdleistung, Material wird direkt vom Einsender an Partnerlabor verschickt Die optimale Diagnostik beinhaltet den Schistosomen-Antikörpernachweis und ggf. die Einsendung von 24 h-Urin (mind. 1 L). Zur Diagnostik einer Blasenbilharziose setzen Sie sich bitte mit folgender Einrichtung in Verbindung: Tropenmedizin der Missionsärztlichen Klinik Salvatorstr. 7 97067 Würzburg Tel. 0931-791-0 Mikroskopischer Nachweis: Bei V.a. Blasenbilharziose ist das Labor (Tropenmedizin der Missionsärztlichen Klinik, <i>siehe oben</i>) <i>vorab telefonisch zu verständigen</i>, um eine optimale Diagnostik zu gewährleisten. Es sollte 24-Stunden-Urin bzw. mind. 1 Liter Urin gesammelt werden (ideale Sammelperiode 10-14 Uhr und nach größerer körperlicher Anstrengung, z.B. Treppen steigen lassen!). Der Patient sollte angehalten werden, auch den letzten Urintropfen aufzufangen, da hiermit noch große Mengen an Eiern ausgeschieden werden. Die Urinprobe sollte im Dunkeln gelagert werden (Vermeidung des Schlüpfens der Larven). Der Transport ins Labor hat noch am selben Tag zu erfolgen. Aufgrund der intermittierenden Ausscheidung der Eier, sollten mind. 3 Proben von 3 verschiedenen Tagen (am besten im Abstand von jeweils 2 Tagen) eingesandt werden. Bei wiederholt negativem Urinbefund und weiterbestehendem V.a. Infektion, kann der Nachweis aus einer Blasenschleim-hautbiopsie versucht werden. Bei negativem mikroskopischen Nachweis sollte unbedingt ein Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr durchgeführt werden. Antikörpernachweis: Bei Patienten, die nicht aus Endemiegebieten stammen, schließt ein negativer Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr eine Schistosoma-Infektion mit großer Sicherheit aus.

Blei	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	AAS
Normalwerte	Kinder: < 3,5 µg/dl Frauen: <3,0 µg/dl Männer: <4,0 µg/dl
Indikationen	Beurteilung der Bleibelastung Exposition V.a. Blei-Intoxikation: Blutbild δ -Aminolävulinsäure im Harn Porphyrine im Harn und in den Erythrozyten Koproporphyrin III im Harn Erythrozyten-Protoporphyrin
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PBB Ansatztage: Fr.
Blutgruppenbestimmung	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut (Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!) Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss da Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein. Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Bluprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Indikationen	OP-Vorbereitung, Schwangerschaftsvorsorge, Transfusionsmedizin
Anmerkungen	Zu jeder Blutgruppenbestimmung sollte der Antikörpersuchtest (indirekter Coombs-Test) bestimmt werden. siehe auch: AB0-System, Rhesus-Faktor Coombs-Test indirekt (Antikörpersuchtest), Coombs-Test direkt, Kreuzprobe (Verträglichkeitsprobe)
Blut im Stuhl, IFOBT, immunologischer Stuhltest	
Probenmaterial	Spezialröhrchen für Stuhl
Methode	Immunturbidimetrie
Normalwerte	okkultes Blut < 12,3 µg/g
Indikationen	Suchtest auf kolorektale Karzinome
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HAST Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Alternative Bestimmungen: Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex M2-Pyruvatkinase i. Stuhl

Blut im Urin

Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Combur-Test
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BLU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Blutkulturen	
Probenmaterial	Venöses Blut in Blutkulturflaschen (aerob und anaerob)
Methode	Kultur
Indikationen	V.a. Bakteriämie, Fungämie, Sepsis, SIRS, Meningitis, Pneumonie, Pyelonephritis, Osteomyelitis, Endokarditis, Katheterinfektion
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std., Endergebnis nach 6 Tagen Allgemeine Hinweise Lagerung der unbeimpften Flaschen bei Raumtemperatur und dunkel. Bitte das Verfallsdatum beachten. Entnahmedatum und Uhrzeit auf dem Anforderungsschein vermerken. Jede Flasche deutlich lesbar mit Vor- und Nach-namen des Patienten sowie Geburtsdatum beschriften. Barcode auf der Blutkulturflasche und den Flaschenboden nicht überkleben. Beimpfte Blutkulturflaschen bis zum Transport bei Raumtemperatur lagern. Schnellstmöglicher Probentransport ins Labor. Bei V. a. Kathetersepsis siehe Katheterspitzen Entnahmeort Punktion einer peripheren Vene (z.B. der Ellenbeuge). Punktion von Venen im Bereich entzündeter Hautareale wegen erhöhter Kontaminationsgefahr vermeiden. Entnahme von arteriellem Blut bringt auch bei Endokarditis und Fungämie keine Vorteile. Bei Abnahme von Blutkulturen über einen intravasalen Katheter muss mit einer erheblich höheren Kontaminationsrate gerechnet werden, sodass ein intravaskulärer Katheter oder ein Portsystem als Entnahmeort nur ausnahmsweise in Frage kommen, wenn eine periphere Venenpunktion nicht möglich ist oder wenn eine Blutkulturdiagnostik zum Nachweis einer katheterassoziierten Infektion (parallele Entnahme mind. einer peripher über eine Vene und einer zentral über den Katheter entnommenen Blutkultur) erfolgen soll. Hautdesinfektion im Bereich der Punktionsstelle Punktionsstelle zunächst mit einem alkoholischen Hautdesinfektionsmittel mechanisch reinigen, anschließend erfolgt die eigentliche Desinfektion. Hautdesinfektionsmittel mit einem sterilen Tupfer oder als Spray

auftragen; Einwirkzeit mind. 1 min bis zur vollständigen Trocknung des Alkohols. Eine erneute Palpation der Punktionsstelle sowie das Abwischen von Desinfektionsmittelresten vor der Blutentnahme sollten möglichst unterbleiben.

Blutentnahme – Blutvolumen

Nach hygienischer Händedesinfektion (30 sec) nicht steril verpackte Einmalhandschuhe anziehen. Hautdesinfektion wie oben beschrieben.

Nach Entfernung der Schutzkappe der Blutkulturflasche den darunter gelegenen Gummistopfen mit Alkohol desinfizieren (Einwirkzeit beachten); es dürfen keine Desinfektionsmittelreste mehr auf dem Gummistopfen erkennbar sein, die bei der Beimpfung in die Blutkulturflasche gesaugt werden könnten.

Nach einer Fehlpunktion Kanüle wechseln und erneute Hautdesinfektion.

Für ein Blutkulturpaar: 10-20 ml Blut aspirieren und jeweils 5-10 ml in die aerobe und anaerobe Blutkulturflasche verimpfen.

Ein Volumen von 5 ml je Flasche soll nicht unterschritten bzw. ein Volumen von 10 ml je Flasche nicht überschritten werden. Flaschen nicht belüften. Zuerst die anaerobe Flasche beimpfen, um das Eindringen von Luft aus der Spritze in die anaerobe Flasche zu verhindern.

Kinder >20 kg: 10 ml Blut entnehmen und jeweils 5 ml in eine aerobe und anaerobe Blutkulturflasche verimpfen.

Kinder <20 kg: 1-10 ml Blut (gewichtsabhängig) entnehmen, nur eine aerobe Blutkulturflasche beimpfen.

Beimpfte Blutkulturflaschen zur Durchmischung kurz schwenken.

Entnahmezeitpunkt

Unabhängig von einer bestimmten Fieberhöhe, unmittelbar bei Auftreten einer auf eine Sepsis hindeutenden klinischen Symptomatik z.B. bei Fieberanstieg, bei Auftreten von Schüttelfrost. Blutentnahme möglichst vor Beginn einer antibiotischen Therapie. Wegen der bei Endokarditis kontinuierlich auftretenden Bakteriämie braucht ein optimaler Zeitpunkt, z.B. eine Fieberspitze, zur Abnahme nicht abgewartet zu werden.

Bei laufender Antibiotikatherapie Therapiepause von 2-3 Tagen erwägen oder Blutentnahme unmittelbar vor Applikation der nächsten Dosis.

Anzahl der Blutkulturen

Es sollten 3 Blutkulturpaare (aerob + anaerob) durch separate Punktion entnommen werden, da dies zu einer signifikant höheren Sensitivität des Erregernachweises führt und die Interpretation der Relevanz eines nachgewiesenen Erregers erleichtert. Mit 1 BK werden nur 65%, mit 2 BK 80% und mit 3 BK 96% aller Bakteriämien erfasst.

Klinisch dringende Fälle (z.B. akute Sepsis, akute Endokarditis, Fieber unklarer Genese bei Neutropenie):

3 BK-Paare durch 3 separate Venenpunktionen innerhalb 30 Min. vor Therapiebeginn. Ein zeitlicher Mindestabstand zwischen den einzelnen Abnahmen ist nicht erforderlich.

Fieber unklarer Genese bei nicht-neutropenischen Patienten, subakute Endokarditis, hämatogene Osteomyelitis, Spondylodiszitis:

3 BK-Paare durch 3 separate Venenpunktionen innerhalb von 24 Std. (möglichst vor Therapiebeginn). Ein zeitlicher Mindestabstand zwischen den einzelnen Abnahmen ist nicht erforderlich.

Befundinterpretation

Jeder Nachweis eines Keimes in der Blutkultur ist ernst zu nehmen und sollte auf seine klinische Relevanz hin überprüft werden.

Schwierig ist die Interpretation bei Keimen, die auch zur physiologischen Hautflora gehören z.B. Staph. epidermidis u.a. koagulase-negative Staphylokokken, Micrococcus spp., Corynebacterium spp., Propionibacterium spp.. So kann der Nachweis von Staph. epidermidis auf einer Kontamination basieren, aber auch Ursache einer Katheterinfektion oder Kunstklappenendokarditis sein. Deshalb ist, um in diesen Fällen die Relevanz von Hautkeimen zu sichern, der wiederholte Nachweis eines Keimes in mehrfach abgenommenen Blutkulturen wichtig. Propionibakterien in Blutkulturen sind ebenfalls meist Folge einer Kontamination durch die Haut, in seltenen Fällen können sie aber auch Erreger einer Endokarditis sein. Auch in diesem Fall ist der wiederholte Nachweis dieser Bakterien in mehreren Blutkulturen zur Sicherstellung der klinischen Relevanz notwendig. Der Nachweis von Hefepilzen in Blutkulturen ist nahezu immer von klinischer Relevanz und erfordert in der Regel eine antifungale Therapie.

Bordetella parapertussis IgA-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunfluoreszenz-Test
Normalwerte	< 1:100 Titer-E
Indikationen	DD: Bronchitis bei Infektionen mit Chlamydien Adenoviren und RSV
Anmerkungen	° Fremdleistung
Bordetella parapertussis IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:100 Titer-E
Indikationen	Pertussis-ähnliches Krankheitsbild pertussiformer Husten
Anmerkungen	° Fremdleistung
Bordetella parapertussis PCR°	
Probenmaterial	Sputum, Nasopharynx-Abstriche steril
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Erregerdirektnachweis, frühzeitige Diagnostik, da Antikörper erst 2-3 Wochen nach Krankheitsbeginn nachweisbar sind.
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Die PCR erfasst B. pertussis und B. parapertussis.
Bordetella pertussis PCR°	
Probenmaterial	Nasopharynx-Abstriche steril
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Erregerdirektnachweis, frühzeitige Diagnostik, da Antikörper erst 2-3 Wochen nach Krankheitsbeginn nachweisbar sind.
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Die PCR erfasst B. pertussis und B. parapertussis.

Bordetella pertussis Toxin IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 15,0 IU/ml grenzwertig 15,0 - 20,0 IU/ml positiv > 20,0 IU/ml
Indikationen	Infektionsstatus V. a. Pertussis, stakkatoartiger Husten z.T. mit Erbrechen, Bronchitis, Tracheitis; bei Neugeborenen: Pneumonie
Anmerkungen	Keuchhusten Analyt Kürzel: BPTA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Bordetella pertussis Toxin IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 40,0 IU/ml grenzwertig 40,0 - 100,0 IU/ml positiv > 100,0 IU/ml
Indikationen	Infektionsstatus, Impferfolgskontrolle (eingeschränkt)
Anmerkungen	Keuchhusten Analyt Kürzel: BPTG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Bor im Urin°	
Probenmaterial	Urin
Methode	IPC-MS
Normalwerte	214 - 3010 µg/l Nachweisgrenze 2 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: BORUR Ansatztage: nach Bedarf Testdauer: 24 Std. Spurenelemente
Borrelien DNA°	
Probenmaterial	1-2 ml Liquor Punktat (Synovialis)
Methode	PCR
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. akute oder chronische Borreliose Erregerdirektnachweis
Anmerkungen	° Fremdleistung

Borrelien-IgG-Ak im Liquor°	
Probenmaterial	1 ml Liquor für Indexbestimmung taggleiches Serum erforderlich
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0,7 - 1,5 AI positiv > 1,5 AI
Indikationen	Bei V.a. Neuroborreliose Ak-Nachweis im Serum und Liquor vom selben Abnahmetag
Anmerkungen	° Fremdleistung
Borrelien-IgG-Ak im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 3 U/ml negativ 3 - 5 U/ml grenzwertig > 5 U/ml positiv
Indikationen	V.a. Borreliose, Erythema migrans, Arthritis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BOG2 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. signifikanter IgG-Anstieg innerhalb von 3-6 Wochen bei normalem Krankheitsverlauf, ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion in der Frühphase nicht aus. Im Suchtest (EIA) positive Ergebnisse entstehen ggf. durch Kreuzreaktionen z.B. mit anderen Spirochätenarten. Zur Bestätigung wird der Immunoblot durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass bei der Antikörper-Indexbestimmung andere Referenzbereiche für Serum gelten.
Borrelien IgG-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Westernblot (Immunoblot)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BOBG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Borrelien-IgM-Ak im Liquor°	
Probenmaterial	1 ml Liquor für Indexbestimmung taggleiches Serum erforderlich
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0.7 – 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Indikationen	Bei V.a. Neuroborreliose, Ak-Nachweis im Serum und Liquor vom selben Abnahmetag
Anmerkungen	° Fremdleistung
Borrelien-IgM-Ak im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 3 U/ml negativ 3 - 5 U/ml grenzwertig > 5 U/ml positiv
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BOM2 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. IgM-Anstieg in der frühen Erkrankungsphase innerhalb von 2-4 Wochen ein negatives Ergebnis schließt eine Infektion in der Frühphase nicht aus Im Suchtest (EIA) – positive Ergebnisse entstehen ggf. durch Kreuzreaktionen z.B. mit anderen Spirochätenarten zur Bestätigung wird der Immunoblot durchgeführt Bitte beachten Sie, dass bei der Antikörper-Indexbestimmung andere Referenzbereiche für Serum gelten.
Borrelien IgM-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Westernblot (Immunoblot)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Bestätigungstest für positive IgM-Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: BOBM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Brivaracetam (LC-MS/MS)	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	0,50 - 0,90 µg/ml

Bromazepam°	
Probenmaterial	Serum ohne Gel
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	50 - 200 µg/l Überdosierung > 300 µg/l
Indikationen	Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: BRAZ Ansatztage: Di., Do. Kein Röhrchen mit Trenngel verwenden - Wirkstoffadsorption möglich.
Bromid°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	therap. Bereich 1000 – 1750 µg/ml
Indikationen	V.a. Intoxikation
Anmerkungen	° Fremdleistung
Brucella-IgA-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Infektionsverdacht, Fieber
Anmerkungen	° Fremdleistung
Brucella-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Infektionsverdacht, Fieber
Anmerkungen	° Fremdleistung

BSG Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit	
Probenmaterial	2 ml Citratblut BSG-Monovetten (0.4 ml Citrat; 1.6 ml Blut) Angabe der Abnahmezeit
Methode	Westergrenmethode
Normalwerte	Männer 5 – 11 mm/h Frauen 5 – 20 mm/h
Indikationen	beschleunigt bei Entzündungen, Infektionen, Tumoren, Anämie, Gravidität Plasmozytom (Sturzsenkung) verzögert bei Polyglobulie, Polyzythämia vera, Sichelzellanämie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BSG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
bullöses Pemphigoid AK°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung

Bupropion im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN! keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Bupropion und Hydroxybupropion Als Antidepressivum: Therapeutischer Bereich: 850 - 1500 ng/ml kritisch ab: 2000 ng/ml Als Entzugstherapeutikum: Therapeutischer Bereich: 550 - 1500 ng/ml kritisch ab: 2000 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BUPRO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Halbwertszeiten: 1-15 h (Bupropion) Aufgrund der geringen Stabilität von Bupropion (etwa 7 h bei 2-8 °C), bitten wir Sie als Material für die Analyse tiefgefrorenes Serum einzusenden. Durch diese präanalytische Maßnahme kann falsch niedrigen Messergebnissen vorgebeugt werden.

Bupropion im Urin°	
Probenmaterial	Urin
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: BUPROP Ansatztage: 2 x je Woche Testdauer: 24 Std. Spontanurin, möglichst frisch, nicht angesäuert. Qualitative Untersuchung.
C1-Esteraseinhibitor	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	22 - 38 mg/dl
Indikationen	C1-Esterase-Inhibitor-Mangel verursacht Angioödemie (Quincke Ödem) s.a. C1, C2, CH50
Anmerkungen	C1-Inaktivator Konzentration
C1-Inhibitor (Aktivität)°	
Probenmaterial	1 ml Citratplasma (1+9) GEFROREN!
Methode	enzymatisch/chromogen
Normalwerte	70 – 130 %
Anmerkungen	Versand gefroren Bestimmung von Aktivität und Konzentration empfohlen ° Fremdleistung
C1q-Komplement°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RID
Normalwerte	5 – 25 mg/dl
Anmerkungen	° Fremdleistung
C3-Komplement	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	0,90 – 1,80 g/L
Anmerkungen	Analyt Kürzel: C3C__S Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

C3-Nephritis-Faktor°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	AGGL: Agglutinationstest
Normalwerte	negativ
Indikationen	Differenzialdiagnose der membranoproliferativen Glomerulonephritis und der Lupus-Nephritis; weitere Untersuchung bei nachgewiesenem Mangel an C3-Komplementfaktor
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: C3NE Ansatztage: 1 x je Woche Der C3-Nephritis-Faktor wird vor allem bei der membranoproliferativen Glomerulonephritis und einer partiellen Lipodystrophie gefunden. In seltenen Fällen kann der C3-Nephritis-Faktor bei einem systemischen Lupus erythematoses nachgewiesen werden.
C4-Komplement	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	0,10 – 0,40 g/L
Anmerkungen	Analyt Kürzel: C4C__S Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

CA 125																					
Probenmaterial	2 ml Serum																				
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)																				
Normalwerte	<35 U/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!																				
Indikationen	Tumormarker: Therapie- und Verlaufskontrolle des serösen Ovarialkarzinoms; bei V.a. mucinöses Ovarial-Ca Kombination mit CA 72-4; bei V.a. Keimzelltumoren des Ovars Kombination mit AFP																				
Anmerkungen	Analyst Kürzel: C125 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr><th colspan="2">Lagerung:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>24 Wochen</td></tr> <tr> <td>2-8°C</td><td>5 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>8 Stunden</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th colspan="2">ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)</th></tr> <tr> <td>Methode:</td><td>Rechenwert</td></tr> <tr> <td>Referenzbereich:</td><td>Prämenopause < 11,4</td></tr> <tr> <td></td><td>Postmenopause < 29,9</td></tr> <tr> <td>Indikation:</td><td>Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	24 Wochen	2-8°C	5 Tage	Raum Temperatur	8 Stunden	ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)		Methode:	Rechenwert	Referenzbereich:	Prämenopause < 11,4		Postmenopause < 29,9	Indikation:	Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.
Lagerung:																					
Temperatur	Dauer																				
-20°C	24 Wochen																				
2-8°C	5 Tage																				
Raum Temperatur	8 Stunden																				
ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)																					
Methode:	Rechenwert																				
Referenzbereich:	Prämenopause < 11,4																				
	Postmenopause < 29,9																				
Indikation:	Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.																				

CA 15-3 Carbohydrate Antigen 15 - 3

Probenmaterial	2 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	<25.0 U/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	Tumormarker: Diagnostik und Verlaufskontrolle des Mammakarzinoms. In Kombination mit CEA stellt CA 15-3 den effizientesten Tumormarker bei Mamma-Ca dar.										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CA15 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table><tr><td colspan="2">Lagerung:</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>90 Tage</td></tr><tr><td>2-8°C</td><td>5 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>2 Tage</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	90 Tage	2-8°C	5 Tage	Raum Temperatur	2 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	90 Tage										
2-8°C	5 Tage										
Raum Temperatur	2 Tage										

CA 19-9

Probenmaterial	2 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	<34 U/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	Tumormarker: Pankreas-Ca (CEA), Magen-Ca (CA 72-4, CEA), Gallenwegs-Ca und Colon-Ca (CEA) Erhöhung auch bei benignen Erkrankungen von Leber, Gallenwegen und Pankreas										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: C199 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei Personen mit dem Blutgruppenmerkmal Levis (a-; b-) wird kein CA 19-9 nachgewiesen (3-7% d. Bevölkerung). <table><tr><td colspan="2">Lagerung:</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>3 Monate</td></tr><tr><td>2-8°C</td><td>14 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>5 Tage</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	3 Monate	2-8°C	14 Tage	Raum Temperatur	5 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	3 Monate										
2-8°C	14 Tage										
Raum Temperatur	5 Tage										

CA 50°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 19 U/ml
Indikationen	Tumormarker: Pankreas Ca (CA19-9, CEA), Gastrointestinaltrakt (CEA, CA 19-9), Endometrium (CA 19-9), Harnblase (TPS, CA 19-9) Erhöhung auch bei benignen Erkrankungen z.B. Leberzirrhose, Colitis ulcerosa, Pankreatitis
Anmerkungen	° Fremdleistung
CA 72-4 Cancer Antigen	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 6.9 RU/mL
Indikationen	Tumormarker: Magen-Ca (mit CEA, CA 19-9) Ovarialkarzinom (mit CA 125)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CA-72-4 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Cadmium i. Blut°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	AAS
Normalwerte	< 1 µg/l
Indikationen	Krebserzeugender Arbeitsstoff Exposition am Arbeitsplatz, Tabakrauch Schädigung vor allem in der Niere
Anmerkungen	° Fremdleistung
Cadmium i. Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
Normalwerte	< 0.8 µg/l
Indikationen	Krebserzeugender Arbeitsstoff Exposition am Arbeitsplatz, Tabakrauch Schädigung vor allem in der Niere
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: CDU Ansatztage: 2 x je Woche Präanalytik: Stabilität bei 4°C > 4 Wochen und bei -20°C 6 Monate (konzentrationsabhängig)

Calcitonin	
Probenmaterial	3 ml Serum GEFROREN!
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	Frauen ab 16 Jahren < 5 pg/ml Männer ab 16 Jahren < 11.5 pg/ml Kinder 0 - 15 Jahre < 11.5 pg/ml
Indikationen	medulläres Schilddrüsen-Ca (C-Zell-Karzinom) Familienscreening bei Pat. mit medullärem Schilddrüsen-Ca, relative Indikation bei Pat. mit neuroendokrinen Tumoren
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CALC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Calcitonin-Stimulationstest Pentagastrin-Test (jeweils Serum für Calcitonin)	
Probenmaterial	1. Basalwert 2., 3., 4. Serum stimuliert GEFROREN!
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Pentagastrin stimuliert die Calcitoninsekretion bei Patienten mit medullärem Schilddrüsenkarzinom deutlicher Calcitonin-Anstieg bei C-Cell-Hyperplasie leicht erhöhte Werte Pentagastrin subkutan: 6 µg pro kg Körpergewicht
Calcium im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	4.3 – 5.2 mval/l
Indikationen	erhöht: Hyperparathyreoidismus, maligne Tumore, Photometrie Plasmozytom, paraneoplastisch, Immobilisation Medikamente: Thiazid Diuretika, Vitamin D-Überdosierung erniedrigt: Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom, Vit. D-Mangel, Rachitis, Hypoparathyreoidismus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CAL Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Calcium im Urin	
Probenmaterial	5 ml vom 24-Std.-Urin angesäuert mit 20 – 30 ml 6 M HCl Tagesmenge angeben
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 15 mval/d
Indikationen	erhöht: Hyperparathyreoidismus, maligne Tumore, Photometrie Plasmozytom, paraneoplastisch, Immobilisation Medikamente: Thiazid Diuretika, Vitamin D-Überdosierung erniedrigt: Leberzirrhose, nephrotisches Syndrom, Vit. D-Mangel, Rachitis, Hypoparathyreoidismus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CAU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Tagesmenge angeben
Calcium ionisiert°	
Probenmaterial	zusätzliches, ungeöffnetes Serumröhrchen mit Gel
Anmerkungen	°Fremdversand Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: CA_K Eine Verfälschung der ionisierten Calciumwerte kann durch folgende präanalytische Faktoren entstehen: • pH-Verschiebung in den sauren Bereich durch Lactat oder CO₂, verlängerte Venenstauung und Azidose (Erniedrigter pH-Wert durch respiratorische oder metabolische Übersäuerung) oder Alkalose (Proben stehen zu lange geöffnet, CO₂ entweicht, somit Zunahme des pH-Wertes) • zu lange Aufbewahrungszeiten, siehe geringe Stabilität • ungeeignete Antikoagulanzen wie z. B. EDTA, Oxalat, Fluorid, Citrat

Calcium-Kanal-Protein-Ak (P/Q-Typ) (Serum (S))°	
Probenmaterial	Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 30 pmol/l
Indikationen	• V. a. Lambert-Eaton-Syndrom • Differenzialdiagnose der Myasthenia gravis
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Ansatztage: 1 x Woche Die primär pathophysiologische Störung beim Lambert-Eaton Syndrom (LES) liegt in einer verminderten Freisetzung des Neurotransmitters Acetylcholin aus den Nervenendigungen in den synaptischen Spalt. Ursache für diesen präsynaptischen Defekt sind Autoantikörper gegen in der Membran der Nervenzelle lokalisierte spannungsabhängige Calciumkanäle (VGCC). Die VGCC kontrollieren die Neurotransmitter-Freisetzung an der neuromuskulären Verbindung und sind das Zielantigen der Autoantikörper. Bei dem meisten Menschen mit Lambert-Eaton-Syndrom (LES) findet sich ein bösartiger Tumor, häufig ein kleinzelliges Bronchialkarzinom, gelegentlich auch ein Prostatakarzinom, ein Thymom oder eine lymphoproliferative Erkrankung. Das LES gehört zu den paraneoplastischen Syndromen und kann schon in einem frühen Stadium auftreten, bevor der Tumor bekannt ist. Bei einige der Patienten findet sich kein bösartiger Tumor. Diese idiopathische Form ist besonders bei Patienten unter 30 Jahren häufig und oft mit anderen Autoimmunerkrankungen, besonders dem Systemischen Lupus erythematodes assoziiert.
Calprotectin	
Probenmaterial	Spezialröhrchen für Stuhl (Best. Nr.: 319060)
Methode	Chemiluminiszenz-Immunoassay (CLIA)
Normalwerte	normal: < 50 µg/g grenzwertig: 50 – 120 µg/g erhöht > 120 µg/g
Indikationen	DD chronisch entzündliche Darmerkrankungen (z.B. M. Crohn, Colitis ulcerosa, Infektion) in Abgrenzung von funktionellen Beschwerden Aktivitätsmonitoring; s.a. Lactoferrin
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CALP Beschreibung: Die LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus- Methode Bestellung: Spezialröhrchen für Stuhl (Best. Nr.: 319060)

Campylobacter fetus-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	KBR
Normalwerte	Grenzstufe 1:10
Indikationen	Infektassozierte reaktive Arthritiden, Guillain-Barré-Syndrom
Anmerkungen	° Fremdleistung
Campylobacter jejuni-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Grenzstufe 1:10
Anmerkungen	° Fremdleistung
Campylobacter spp.	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	Kultur/ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Indikationen	akute Enteritis; neben den Salmonellen häufigste Erreger einer akuten Enteritis Häufung im Sommer, fäkal-orale Übertragung
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Neben den Salmonellen- zählen Campylobacter-Infektionen zu den häufigsten Ursachen akut bakterieller Durchfallerkrankungen. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch kontaminierte Lebensmittel und durch Kontakt mit infizierten Tieren. Saisonale Häufung im Sommer. Inkubationszeit 2-7 Tage.
C-ANCA Anti-Neutrophilen Cytoplasmatische Antikörper	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	Fluoreszenzmikroskop: < 1:10
Anmerkungen	Serologie Analyt Kürzel: qualitativ: ANCC quantitativ: ANCCQ Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Candida albicans	
Methode	Kultureller Nachweis
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 3 Tagen

Candida albicans-IgA-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Candida albicans-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Candida albicans-IgM-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Cannabis	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	Schwellenwert 50 ng/ml
Indikationen	Tetrahydrocannabinol (THC) bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CANN Ansatztage: täglich Mi. + Fr. V.a. bestimmte Substanzgruppen bitte mitteilen! Kreatinin wird zur Kontrolle des Urins mitbestimmt; ggf. Bestätigungstest einer immunologisch positiven Messung
Cannabis, als THC-COOH, als THC, als THC-COOH	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht

Carbamazepin						
Probenmaterial	1 ml Serum					
	Abnahme vor nächster Gabe					
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)					
Normalwerte	therap. Bereich 4.0 – 12 µg/ml toxisch > 12 µg/ml					
Indikationen	Antiepileptikum; Therapieeinstellung Kontrolle von BB, Leberenzymen und Kreatinin empfohlen					
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CAR Ansatztage: täglich Mo. - Fr.					
Carbamazepinopoxid°						
Probenmaterial	1 ml Serum					
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)					
Normalwerte	therap. Bereich 0.5 – 3 µg/ml					
Anmerkungen	wirksamer Metabolit					
	° Fremdleistung					
Carbidopa°						
Probenmaterial	EDTA-Plasma GEFROREN!					
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)					
Normalwerte	<table><tr><th>Referenzbereich / Entscheidungsgrenze</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Qualitative Bestimmung</td><td>Cut-Off: 20 µg/L</td></tr></table>	Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert	Qualitative Bestimmung	Cut-Off: 20 µg/L	
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert					
Qualitative Bestimmung	Cut-Off: 20 µg/L					
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: CDOPA Ansatztage: 2 x je Woche Testdauer: 24 Std. Optimales Probenmaterial ist tiefgefrorenes EDTA-Plasma, das direkt nach der Entnahme als Spitzenspiegel gewonnen und tiefgefroren wurde, Versand ebenfalls tiefgefroren.					
	Carbidopa besitzt eine biologische Halbwertszeit von ca. 2 h und ist in Plasma bei 20 - 24 °C nicht stabil.					
	Stabilität bei -18°C 14 Tage					

Carbimazol (Thiamazol)°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	50 – 700 ng/ml
Indikationen	Hyperthyreosetherapie
Anmerkungen	Nach Einnahme von 9 mg Carbimazol werden innerhalb von 1-2 Stunden maximale Serumspiegel von 150 ng/ml erreicht. Bei höherer Dosierung können Maximalwerte von 650 ng/ml erreicht werden. ° Fremdleistung
Cardiolipin-IgA-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 14 U/ml
Indikationen	Anti-Phospholipid-Syndrom Thrombosescreening, habituelle Aborte s. a. Thrombophiliescreening, Gerinnung, Phospholipid-Profil
Anmerkungen	° Fremdleistung
Cardiolipin-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 10 U/ml
Indikationen	Anti-Phospholipid-Syndrom Thrombosescreening, habituelle Aborte s. a. Thrombophiliescreening, Gerinnung, Phospholipid-Profil
Anmerkungen	° Fremdleistung
Cardiolipin IgG/IgM°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Verdacht auf Antiphospholipid-Syndrom (APS); s. auch Lupus Antikoagulans
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: CARM/CARG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Cardiolipin-IgM-Ak°							
Probenmaterial	1 ml Serum						
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)						
Normalwerte	< 10 U/ml						
Indikationen	Anti-Phospholipid-Syndrom Thrombosescreening, habituelle Aborte s. a. Thrombophiliescreening, Gerinnung, Phospholipid-Profil						
Anmerkungen	° Fremdleistung						
Carnitin, frei°							
Probenmaterial	1 ml Serum						
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)						
Normalwerte	Kinder altersabhängig Frauen: 17,9 - 45,5 umol/l Männer: 24,6 - 51,0 umol/l						
Indikationen	Muskelschwäche, Myalgie, Myopathie, Kardiomyopathie						
Carnosin°							
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!						
Normalwerte	0 µmol/l						
Anmerkungen	° Fremdleistung						
CDT Carbohydrate-Deficient-Transferrin							
Probenmaterial	1 ml Serum						
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)						
Normalwerte	<table border="1"> <tr> <td>Normalbereich:</td><td>21,7 %</td></tr> <tr> <td>Schwangere: 2. und 3. Trimeser:</td><td>< 2,1 %</td></tr> <tr> <td>Forensischer cut-off-Wert</td><td>2,0 %</td></tr> </table>	Normalbereich:	21,7 %	Schwangere: 2. und 3. Trimeser:	< 2,1 %	Forensischer cut-off-Wert	2,0 %
Normalbereich:	21,7 %						
Schwangere: 2. und 3. Trimeser:	< 2,1 %						
Forensischer cut-off-Wert	2,0 %						
Indikationen	Marker für chronischen Alkoholabusus, spezifischer Nachweis von regelmäßigem Alkoholkonsum (ab 60 g Alkohol pro Tag) Normalisierung bei Abstinenz: HWZ ca. 5 - 10 Tage, bis zu 14 Tage						
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CDT_S Ansatztage: 2 - 3 x/Woche Stabilität: Raumtemperatur 24 Std.; 2-8 °C bis 7 Tage						

CEA Carcinoembryonales Antigen

Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	< 2.5 ng/ml										
Indikationen	Tumormarker bei Colon- und Rektum-Ca: Therapie und Verlaufskontrolle. Mamma-Ca, Bronchial-Ca, benigne Erkrankungen, Leberzirrhose, Hepatitis, entzündl. Erkrankungen der Lunge und des Gastrointestinaltraktes										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CEA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table><tr><td colspan="2">Lagerung:</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr><tr><td>2-8 °C</td><td>14 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>7 Tage</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8 °C	14 Tage	Raum Temperatur	7 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8 °C	14 Tage										
Raum Temperatur	7 Tage										

Chikungunya-Virus IgG°

Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	IIFT
Normalwerte	negativ < 1:20
Indikationen	V.a. akute oder durchgemachte Infektion, Fieber und Arthritis nach Tropenaufenthalt
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: CHIKG

Chikungunya-Virus IgM°

Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	IIFT
Normalwerte	negativ < 1:20
Indikationen	V.a. akute oder durchgemachte Infektion, Fieber und Arthritis nach Tropenaufenthalt
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: CHIKM

Chinidin°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich 1– 5 µg/ml Maximum 1 Std. nach Einnahme Retard-Präparate nach ca. 8 Std. toxisch > 10 µg/ml
Indikationen	Therapiekontrolle, Eliminationshalbwertszeit ca. 6 Std.
Anmerkungen	Abnahme vor nächster Gabe ° Fremdleistung
Chlamydia pneumoniae-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10-13 U/ml positiv > 13 U/ml
Indikationen	Infektionen der Atemwege, trockener Husten, atypische Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHPA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Chlamydia pneumoniae-IgA-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: CHBA Ansatztage: nach positivem ELISA
Chlamydia pneumoniae-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10-12 U/ml positiv > 12 U/ml
Indikationen	Infektionen der Atemwege, trockener Husten, atypische Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHPG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf

Chlamydia pneumoniae-IgG-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: CHBG Ansatztage: nach positivem ELISA
Chlamydia psittaci-IgA-Ak-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Psittakose, Ornithose, atypische Pneumonie: Übertragung durch Vogelkot (Staub) und bei Vogelkontakt (Berührung) (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: PSBA Ansatztage: nach positivem ELISA Methode außerhalb der Akkreditierung
Chlamydia psittaci-IgG-Ak-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Psittakose, Ornithose, atypische Pneumonie: Übertragung durch Vogelkot (Staub) und bei Vogelkontakt (Berührung) (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: PSBG Ansatztage: nach positivem ELISA Methode außerhalb der Akkreditierung

Chlamydia trachomatis IgA-AK	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 9 U/ml grenzwertig 9 - 16 U/ml
Indikationen	C. trachomatis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHTA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Cervicitis, Urethritis, Adnexitis, Sterilität, Prostatitis, Arthritis, Konjunktivitis, Pharyngitis, Otitis media; interstitielle Pneumonie (bei Neugeborenen) mit häufig schwerwiegendem klinischen Verlauf bei Aspiration von chlamydienhaltigen Sekret unter der Geburt
Chlamydia trachomatis IgA-AK-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: CHTBA Ansatztage: nach positivem ELISA
Chlamydia trachomatis IgG-AK	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 - 15 U/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHTG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Cervicitis, Urethritis, Adnexitis, Sterilität, Prostatitis, Arthritis, Konjunktivitis, Pharyngitis, Otitis media; interstitielle Pneumonie (bei Neugeborenen) mit häufig schwerwiegendem klinischen Verlauf bei Aspiration von chlamydienhaltigen Sekret unter der Geburt
Chlamydia trachomatis IgG-AK-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: CHTBG Ansatztage: nach positivem ELISA

Chlamydia trachomatis-PCR°	
Probenmaterial	Abstriche, Urin
Methode	PCR (Polymerase-Chain-reaktion)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	DNA-Nachweis Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.
Chlamydien-PCR STD (sexual transmitted disease)	
Probenmaterial	Erststrahlurin Morgendlicher Erststrahlurin oder erste Urinportion nach 4-stündiger Miktionskarenz. Stabilität der Probe: Raumtemperatur (15-30°C) bis zu 24 Std.; Kühlschranktemperatur (2-8°C) bis zu 7 Tage Urethralabstrich (Spezial-Abstrichset) Urethrasekret wird von der Harnröhrenöffnung entnommen. Bei fehlendem Sekret sollte ein Urethralabstrich nach 4-stündiger Miktionskarenz entnommen werden. Vor der Abstrichentnahme beim Mann empfiehlt es sich, Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne zu befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen, in Spezial-Abstrichröhrchen überführen und Tupfer im Medium belassen. Stabilität der Probe: Raumtemperatur bis zu 12 Monate Bei Hemmung der PCR im Abstrichmaterial sollte die Untersuchung mit Erststrahlurin wiederholt werden. Zervixabstrich (Spezial-Abstrichset) Chlamydien sind obligat intrazelluläre Erreger, daher müssen zellreiche Abstriche gewonnen werden. Mit einem Tupfer Schleim von der Portio entfernen und werfen. Den mitgelieferten Tupfer in den Zervikalkanal einführen, bis die Tupferspitze nicht mehr sichtbar ist. Tupfer 3-5 sec drehen und herausziehen, ohne die Wände der Vagina zu berühren, in Spezial-Abstrichröhrchen überführen und Tupfer im Medium belassen. Stabilität der Probe: Raumtemperatur bis zu 12 Monate Ejakulat / Douglaspunktat (Untersuchungen außerhalb der Akkreditierung) Probe <i>nativ</i> in sterilem Schraubverschlussröhrchen.
Methode	PCR (Polymerase-Chain-reaktion)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.

Chlamydien und Gonokokken

Probenmaterial	Erststrahlurin Zervix- oder Vaginalabstrich Uretralabstrich Analabstrich Pharyngealabstrich
Methode	PCR (Polymerase-Chain-reaktion)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. Der Nachweis von Chlamydia trachomatis und/oder Neisseria gonorrhoeae erfordert einen gesonderten Zielauftrag. Die Untersuchung erfolgt als DNA-Nachweis mittels PCR. Neisseria gonorrhoeae kann auch mikroskopisch und kulturell nachgewiesen werden. Hierfür sind Abstrichbestecke, die ein Transportmedium mit Kohlepartikeln (schwarzes Gel) enthalten, zu verwenden, die möglichst umgehend ins Labor gebracht werden müssen (idealerweise innerhalb von 4 Std). Wegen der höheren Sensitivität und der weniger zeitempfindlichen Transportdauer ist die Gonokokken-PCR jedoch bei der Diagnostik zu bevorzugen. Weitere Informationen zur Gonokokken-Kultur unter Materialien aus dem Genitaltrakt

Chlorid im Liquor°

Probenmaterial	1 ml Liquor
Methode	Titration
Normalwerte	119 – 129 mval/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Chlorid im Serum

Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Elektrochemische Untersuchung
Normalwerte	95 – 105 mmol/l (L.Thomas 2024)
Indikationen	Störungen des Elektrolyt- und Säure-Base Haushaltes metabolische Azidose (Anionenlücke)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHL Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Chlorid im Urin	
Probenmaterial	10 ml aus 24-Std. Menge
Methode	ISE
Normalwerte	110 – 250 mval/d
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CLU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Tagesmenge angeben
Chlorprothixen°	
Probenmaterial	Serum ohne Gel
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	20 - 300 µg/l toxisch > 400 µg/l
Indikationen	Neuroleptikum, Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: CHLO Ansatztage: täglich Di., Do. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden; Blutentnahme unmittelbar vor nächster Gabe
Cholera	
Probenmaterial	Stuhl
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. Bei Choleraverdacht ist das Labor sofort telefonisch zu verständigen und die Stuhlprobe auf schnellstem Weg noch am selben Tag ins Labor zu bringen. Schon der Verdacht auf Cholera ist meldepflichtig! Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. 1/3 mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlanteile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen.

Cholesterin	
Probenmaterial	1 ml Serum, nach 12 h Nahrungskarenz
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 200 mg/dl
Indikationen	V.a. Hypercholesterinämie Fettstoffwechselstörung Arteriosklerose-Vorsorge: Homocystein, Lipoprotein (a) HDL-, LDL-Cholesterin, Neutralfett, Apolipoproteine, Lipidelektrophorese
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHO Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Cholesterin, gesamt	
Probenmaterial	3 ml Serum nüchtern
Cholinesterase (CHE)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen 16 - 39 Jahre, nicht schwanger, keine hormonellen Kontrazeptiva: 4260 – 11250 U/L Frauen (ab 40 Jahren): 5320 – 12920 U/L Männer: 5320 – 12920 U/L
Indikationen	V.a. eingeschränkte Syntheseleistung der Leber Substrat: Butyrylthiocholinjodid chronische Lebererkrankungen, akut toxische Leberschäden
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CHE Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Cholinesterase-Varianten°	
Probenmaterial	5 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Dibucainzahl° - Fluoridzahl normal > 70 % intermediär 30 – 70 % atypisch < 30 %
Indikationen	V.a. hereditäre atypische CHE-Varianten
Anmerkungen	vor Gabe von Succinylcholin (Narkose Zwischenfälle mit verlängerter Apnoephase nach Succinylcholin) unklare CHE-Erniedrigung (ohne Hepatopathie) ° Fremdleistung

Chrom°	
Probenmaterial	3 ml Serum 10 ml Urin, Schichtende 2 ml EDTA-Blut
Methode	AAS
Normalwerte	Serum < 0.4 µg/l Urin < 0.6 µg/l EDTA 0.5 µg/
Indikationen	Exposition am Arbeitsplatz krebserzeugender Arbeitsstoff! Chrom VI-Intoxikation: gleichzeitige Bestimmung von Chrom im Plasma und in Erythrozyten empfohlen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Chromogranin A°	
Probenmaterial	Serum: 1 ml, Versand tiefgefroren
Methode	TRACE
Normalwerte	< 100 ng/ml Erhöhte Serum-Chromogranin-A-Werte werden bei verschiedenen neuroendokrin aktiven Tumoren (Phäochromozytom, Karzinoid, C-Zell-Karzinom, Gastrinom, Inseldtumor, kleinzelliges Bronchialkarzinom) gefunden sowie bei Niereninsuffizienz, atrophischer Gastritis und unter Einnahme von Protonenpumpenhemmern.
Anmerkungen	°Fremdleistung Analyt Kürzel: CHRA Tumormarker der Wahl bei: Karzinoid, MEN 1, MEN 2, Neuroblastom, Phäochromozytom Zusätzlicher Marker bei: kleinzelliges Bronchial-Ca
Chromosomenanomalie	
Probenmaterial	Lithium Heparinblut
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. ° Fremdleistung

Citalopram	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 50-110 ng/ml
Indikationen	Antidepressivum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CITA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikerische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.(1-2 Wochen nach Therapiebeginn); Biologische Halbwertszeit 38 - 48 Std.
Citrat°	
Probenmaterial	Ejakulat im NaF-Röhrchen 10 ml vom 24-Std.-Urin
Methode	GC/MS
Normalwerte	Ejakulat 250 – 850 mg/dl Urin 90 – 800 mg/d
Indikationen	Zitronensäure im Urin: erniedrigte Citratausscheidung korreliert mit erhöhter Oxalatausscheidung
Anmerkungen	Tagesmenge angeben ° Fremdleistung
Citrullin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 16 - 46 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

CK (Creatin-Kinase)	
Probenmaterial	1 ml Serum, hämolysefrei
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen < 167 U/l Männer < 190 U/l Kinder altersabhängig
Indikationen	Herzinfarkt Skelettmuskelerkrankung Muskeldystrophie entzündliche Muskelerkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CK Ansatztage: täglich Mo. - Fr. zur Differenzierung: CK-MB, GOT, LDH + HBDH erhöhte CK-Werte bei sportlicher Betätigung DD Herzinfarkt: CK-MB
CK-Isoenzyme°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	CK-MM (Muskeltyp): 97 bis 100 % CK-MB (Myokardtyp): 0 - 3 % bei einer Gesamtaktivität zwischen 15 und 500 U/l CK-MB (Myokardtyp): 0 - 4 % bei einer Gesamtaktivität über 500 U/l CK-BB (Hirntyp): 0% Makro-CK Typ 1: 0 % Makro-CK Typ 2: 0 %
Indikationen	Unklare CK Erhöhung
Anmerkungen	° Fremdleistung
Clomethiazol°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0,5 - 3,0 µg/ml
Indikationen	Distraneurin® Alkoholentzug
Anmerkungen	Blutentnahme 1 - 3 Std. nach Medikamentengabe ° Fremdleistung

Clomipramin	
Probenmaterial	3 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Summe Clomipramin und Desmethylclomipramin: therap. Bereich 230 – 450 ng/ml kritisch ab: > 400 ng/ml
Indikationen	Antidepressivum, Anafranil® Trizyklische Antidepressiva
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CLOM Ansatztage: 2 x / Woche N-Desmethyl-Clomipramin° Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 16 - 60 Std.
Clonazepam°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich 20 – 70 ng/ml toxisch > 80 ng/ml
Indikationen	Benzodiazepin Rivotril® Therapiekontrolle
Anmerkungen	Abnahme vor nächster Gabe keine Gel-Röhrchen verwenden! ° Fremdleistung
Clostridium difficile	
Probenmaterial	Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)/Kulturelle Anzucht
Indikationen	Patienten mit blutiger/wässriger Diarrhoe bei Antibiotikaeinnahme in den letzten 60 Tagen oder Risikopatienten (> 65 Jahre, immunsupprimiert, schwere bzw. gastrointestinale Grunderkrankung); außerdem jede > 3 Tage andauernde Diarrhö mit/ohne vorherige Antibiose.
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: ELISA Ergebnis von C. difficile GDH nach 24Std., bei pos. GDH und neg. C. difficile Toxin aus Direktmaterial Ergebnis des Toxinnachweises aus Kultur nach 3 - 4 Tagen Stuhl Diagnostik sollte innerhalb von 3 Tagen erfolgen. Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Bei negativem Ergebnis und weiterbestehendem klinischen Verdacht sollten weitere Stuhlproben eingesandt werden.

Clostridium difficile-Toxin	
Probenmaterial	ca. 2 g Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	Toxin A und B negativ
Indikationen	unklare blutige Durchfälle Diarrhoe unter Antibiotikatherapie bei immunsupprimierten Patienten
Anmerkungen	direkter Toxinnachweis Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: ELISA Ergebnis von C. difficile GDH nach 24Std., bei pos. GDH und neg. C. difficile Toxin aus Direktmaterial Ergebnis des Toxinnachweises aus Kultur nach 3 - 4 Tagen
Clozapin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich 350 – 600 ng/ml tox. Bereich ab 1000 ng/ml
Indikationen	Neuroleptikum Leponex® Therapiekontrolle
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CLOZ Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! zum Ausschluss von Nebenwirkungen auch großes BB bestimmen
Cocaethylen i. Haar (GCMS)°	
Probenmaterial	Haare
Methode	GCMS
Normalwerte	<0,02 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung
Codein°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang)

Codein im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 10 ng/ml therap. Bereich 30 – 250 ng/ml toxisch > 500 ng/ml
Indikationen	Drogenanalytik
Codein° im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	GC/MS
Normalwerte	< 100 ng/ml
Indikationen	Drogenanalytik
Anmerkungen	° Fremdleistung
Coeruloplasmin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	Frauen: 0,16 – 0,45 g/L Männer: 0,15 – 0,30 g/L
Indikationen	erniedrigt bei M. Wilson; Menkes Syndrom s. Kupfer i. Serum, Kupfer i. Urin erhöht als akute Phase-Protein bei Infektionen und Entzündungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: COER_R Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
CO-Hämoglobin°	
Probenmaterial	2 ml Heparin- oder EDTA-Blut
Methode	Photometrie
Normalwerte	des Ges. Hb: <5.0% Raucher: <10.0%
Indikationen	Kohlenmonoxidvergiftung
Anmerkungen	° Fremdleistung
Colitis ulcerosa	
Probenmaterial	1 ml Serum

Coombs-Test direkt	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut (Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!) oder Nabelschnurblut. Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss das Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein. Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Normalwerte	negativ
Indikationen	Nachweis einer IgG- oder C3d-Beladung der Erythrozyten
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CD Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Coombs-Test indirekt	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut (Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!) oder Nabelschnurblut. Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss das Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein. Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Normalwerte	negativ
Indikationen	Verträglichkeitsproben vor Bluttransfusionen Schwangerschaftsvorsorge/Schwangerschaftsabbruch Im Rahmen der Blutgruppenbestimmung z.B. OP-Vorbereitung
Coombs-Test indirekt Antikörpersuchtest	
Probenmaterial	5 ml Vollblut
Indikationen	Nachweis irregulärer Erythrozyten- Antikörper im Serum

Copeptin° COA CT-proAVP/Copeptin

Probenmaterial	0.5 ml Serum Abnahmen morgens nüchtern, nach 8 Std. Dursten, ggf. zusätzlich nach 16 Std. Dursten
Methode	TRACE
Indikationen	Polyurie-Polydipsie-Syndrom Diabetes insipidus
Anmerkungen	Korrelation mit Osmolalität beachten! Gleichzeitige Bestimmung der Osmolalität empfohlen ADH-Bestimmung wurde durch Bestimmung Copeptin abgelöst. ° Fremdleistung

Cortisol ACTH-Stimulationstest (Kurztest)	
Probenmaterial	1 ml Serum zur Bestimmung des Cortisols, evtl. auch Abnahme von 4 ml EDTA-Blut (bitte Präanalytik beachten, siehe Eintrag ACTH) zur ACTH- Bestimmung vor ACTH-Applikation
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	$\geq 20 \mu\text{g/dl}^*$
Indikationen	Verdacht auf NNR-Insuffizienz (Morbus Addison)
Anmerkungen	Synacthen-Test Analyt Kürzel: ACTHT ACTH stimuliert physiologischerweise die Cortisolfreisetzung in der Nebennierenrinde über eine Feedback-Kopplung. Präanalytik: Der ACTH-Stimulationstest erlaubt keine Differenzierung zwischen primärer und sekundärer Nebennierenrinden-Insuffizienz: in beiden Fällen bleibt ein deutlicher Cortisol-Anstieg aus. Erst bei mehrtägiger ACTH-Stimulation zeigt sich eine wiedereintretende Cortisol-Sekretion bei sekundärer Insuffizienz. Wesentlich einfacher lässt sich die Nebennierenrinden-Insuffizienz durch eine Bestimmung des basalen ACTH-Spiegels differenzieren. Der ACTH-Kurztest dient lediglich als Screeningtest. Ein normaler Test schließt eine primäre und vollständige sekundäre Nebennierenrinden-Insuffizienz aus. Durchführung: Vorbereitung des Patienten: Stress vermeiden Der Test wird morgens (zwischen 8 und 10 Uhr) durchgeführt. Die Anlage eines peripheren venösen Zugangs zur Injektion und Blutabnahme wird empfohlen. Abnahme von 1 ml Serum zur Bestimmung des Cortisols, evtl. auch Abnahme von 4 ml EDTA-Blut zur ACTH-Bestimmung vor ACTH-Applikation. Durch liegende Kanüle anschließend Injektion von 0,25 mg (1 Ampulle) Synacthen (bei Kindern die Dosis entsprechend anpassen). Erneute Blutabnahme nach 60 Minuten zur Bestimmung von Cortisol. Interpretation: Ausschluss mit großer Sicherheit bei normwertigem basalen Cortisol und einem poststimulatorischen Anstieg auf $\geq 20 \mu\text{g/dl}^*$ nach 60 Minuten. *Quelle: Lothar Thomas Labor und Diagnose, Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik

Cortisol-Dexamethasonhemmtest (Kurz-Test 2 mg)

Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)		
Normalwerte	Eine fehlende Suppression von Cortisol nach 2 mg Dexamethason beweist bei akurater Testdurchführung einen Hypercortisolismus und erfordert eine weitere Differenzialdiagnostik. Negativer Dexamethason-Hemmtest: Normal ist eine Suppression von Cortisol $< 1,8 \mu\text{g/dl}$ ($< 50 \text{ nmol/l}$).		
Indikationen	Screeningtest bei Verdacht auf M. Cushing oder Cushing-Syndrom		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CORD <table><tr><td>Durchführung</td><td> • 1. Blutabnahme um 8 Uhr für Cortisol-Basalwert • Gabe von 2 mg Dexamethason p.o. um 23 Uhr • 2. Blutabnahme am folgenden Morgen um 8 Uhr, Beschriftung: „nach Dexamethason“ </td></tr></table>	Durchführung	• 1. Blutabnahme um 8 Uhr für Cortisol-Basalwert • Gabe von 2 mg Dexamethason p.o. um 23 Uhr • 2. Blutabnahme am folgenden Morgen um 8 Uhr, Beschriftung: „nach Dexamethason“
Durchführung	• 1. Blutabnahme um 8 Uhr für Cortisol-Basalwert • Gabe von 2 mg Dexamethason p.o. um 23 Uhr • 2. Blutabnahme am folgenden Morgen um 8 Uhr, Beschriftung: „nach Dexamethason“		

Cortisol im Serum					
Probenmaterial	Serum				
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)				
Normalwerte	Referenzbereich: Erwachsene: vormittags (7 - 10 Uhr): 4.8 - 19.5 µg/dl [133 - 537 nmol/l] nachmittags (16 - 20 Uhr): 2.5 - 11.9 µg/dl [68 - 327 nmol/l] nachts, schlafend (24 Uhr, Serum): < 1.8 µg/dl [< 50 nmol] Nach 1 mg Dexamethason: < 1.8 µg/dl [< 50 nmol/l] Nach ACTH: > 20 µg/dl [> 552 nmol/l] Kinder und Jugendliche vormittags: bis 15 Jahre: 2.1 - 20.5 µg/dl [58 - 568 nmol/l] 15 - 20 Jahre (weiblich): 1.7 - 13.2 µg/dl [47 - 367 nmol/l] 15 - 20 Jahre (männlich): 3.7 - 29.3 µg/dl [103 - 814 nmo/l] Ein basaler Cortisolwert oberhalb der angegebenen Referenzbereiche spricht für ein Cushing-Syndrom. Allein anhand der Cortisolkonzentration ist eine weitere Differenzierung nicht möglich. Ein Wert im Referenzbereich schließt ein Cushing-Syndrom jedoch nicht aus. Eine vermehrte Sekretion kann dennoch vorliegen, wenn die typische zirkadiane Rhythmik mit Abfall der Cortisolkonzentration von 8-24 Uhr aufgehoben ist. Zur Diagnosesicherung sollten gegebenenfalls weitere Tests wie die Cortisolbestimmung um 24 Uhr (z.B. aus Speichel), Bestimmung des Cortisols im 24-h-Urin und ein Dexamethason-Kurztest (1 mg) herangezogen werden. Erhöhte Cortisolwerte, teilweise mit aufgehobener Tagesrhythmik, können auch bei starken Stresseinwirkungen (schwere Allgemeinerkrankungen, Operationen), akuten Psychosen, Adipositas, Anorexia nervosa, Alkoholismus und bei erhöhter Östrogenkonzentration (Schwangerschaft, Östrogen-Therapie, orale Kontrazeptiva) gefunden werden. METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!				
Indikationen	Verdacht auf Funktionsstörungen der Nebennierenrinde				
Anmerkungen	Analyt Kürzel: COR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lagerung:</td></tr> <tr> <td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer
Lagerung:					
Temperatur	Dauer				

Cortisol im Serum			
	-20°C	12 Monate	
	2-8°C	4 Tage	
	Raum Temperatur	1 Tag	
Cotin ⁱⁿ °			
Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	GC/MS		
Normalwerte	Nichtraucher < 10 ng/ml Passiv/Gelegenheitsraucher 10 – 100 ng/ml starke Raucher > 100 ng/ml		
Indikationen	Metabolit des Nikotins spezifischer Marker für Nikotinaufnahme		
Anmerkungen	° Fremdleistung		
Cotin ⁱⁿ im Urin°			
Probenmaterial	Morgenurin		
Normalwerte	Passiv/Nichtraucher < 50 µg/g Krea Raucher > 100 µg/g Krea		
Anmerkungen	° Fremdleistung		
Coxsackie Virus IgG-Ak			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)		
Normalwerte	negativ < 11 U/ml grenzwertig 11 - 15 U/ml		
Indikationen	Myokarditis, Perikarditis, chronisches Müdigkeitssyndrom, Erkrankungen der oberen Atemwege		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: COXG Ansatzage: 1 x / Woche		
Coxsackie Virus IgM-Ak			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)		
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 - 15 U/ml		
Indikationen	Frühphase der Infektion Abklärung bei Myo- und Perikarditis		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: COXM Ansatzage: 1 x / Woche		

C-Peptid	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN! 2. Serum nach Stimulation GEFROREN!
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	Basalwert 1.1 – 3.6 ng/ml < 8 ng/ml stimuliert
Indikationen	„Connecting Peptide“, Parameter der Insulinsekretion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: C-PE Ansatztage: täglich Mo. - Fr. erhöht: Diabetes mellitus Typ IIb, Insulinom erniedrigt: Diabetes mellitus Typ I
Creatin-Kinase-MB	
Probenmaterial	1 ml Serum, hämolysefrei
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 25 U/l bzw. bis 6 % der CK
Indikationen	Herzinfarktdiagnostik: CK-MB-Wert pathologisch, wenn über 6 % der CK Gesamtaktivität gemessen werden bei CK-MB-Werten über 25 % besteht V.a. CK-Varianten (z.B. CK-BB, Makro-CK)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CKMB Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
CRP C-reaktives Protein	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	quantitativ: < 5 mg/L
Indikationen	Akute-Phase-Protein akut entzündliche Erkrankungen z.B. bakterielle Infektionen, Rheumatoide Arthritis Tumore
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CRPST Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
CRP sensitiv	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 0.3 mg/dl
Indikationen	Risikofaktor: Herzinfarkt, Schlaganfall, art. Verschlusskrankheit
Cryptococcus neoformans	
Probenmaterial	Kultureller Nachweis 2 ml Serum 1 ml Liquor
Methode	kulturelle Anzahl
Indikationen	Lungenmykose vor allem bei HIV-Patienten V.a. Cryptococcus Meningitis
Anmerkungen	Mikrobiologie

Cyclosporin A	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut Abnahme kurz vor nächster Dosierung
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 80 – 320 ng/ml
Indikationen	Überwachung des Cyclosporinspiegels und seiner immunsuppressiv wirkenden Metaboliten Medikament: Sandimmun®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CYCL Ansatztage: bei Bedarf
CYFRA 21-1	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 2,37 ng/mL
Indikationen	Tumormarker für nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom (CEA, SCC) Plattenepithel-Ca Adeno-Ca der Lunge Harnblasen-Ca
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CYFR_R Ansatztage: 1 - 2 x Woche
Cystathionin	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 3 µmol/l
Cystatin C	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 1 Jahr: 0,59 - 1,97 mg/L < 18 Jahre: 0.5 – 1.27 mg/L < 50 Jahre: 0.53 – 0.95 mg/L < 120 Jahre: 0.58 – 1.05 mg/L
Indikationen	sensitiver Marker der glomerulären Filtrationsrate (GFR), auch bei eingeschränkter Beurteilbarkeit von Serum-Kreatinin
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FCYSKH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Cystin (frei) im Plasma°	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! sofort abseren
Normalwerte	Kinder altersabhängige Normwerte. Erwachsene: 35 - 63 µmol/l
Anmerkungen	s.a. Aminosäuren sofort abseren Versand gefroren ° Fremdleistung
Cystin frei im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin über 5-10 ml Eisessig Angabe der Tagesmenge
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Cystinurie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CYSFU
Cystin frei/Kreatinin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin über 5-10 ml Eisessig Angabe der Tagesmenge
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	1 - 19 mmol/mol Kinder altersabhängig
Indikationen	Cystinurie
Anmerkungen	Angabe der Tagesmenge ° Fremdleistung Analyt Kürzel: CYSFUK
Cystin im Serum°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0,30 - 1,80 mg/dl
Anmerkungen	s.a. Aminosäuren, sofort abseren ° Fremdleistung

Cystische Fibrose	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR u. Direktsequenzierung (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	Mekoniumileus Gedeihstörung chron. rezid. Bronchitiden Pneumonien Pankreasinsuffizienz
Anmerkungen	Mukoviszidose, CTFR Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. ° Fremdleistung
Cytomegalie DNA°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril) BAL, TS, Liquor, Stuhl, Biopsie
Methode	PCR
Normalwerte	Plasma: PCR, quantitativ < 100 IU/ml andere Materialien: PCR qualitativ
Indikationen	sensitive Methode zum Erkennen einer aktiven Cytomegalievirusinfektion CMV; Therapiemonitoring
Anmerkungen	° Fremdleistung

Cytomegalie IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum 1 ml Liquor°
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 25 U/ml grenzwertig 25 – 40 U/ml positiv > 40 U/ml
Indikationen	Verlaufskontrolle der CMV-Infektion: CMV IgG-Ak mit signifikanten Titeranstieg bei gleichzeitigem CMV IgM-Ak-Nachweis spricht für eine aktive Infektion.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CYEG, CMVWB Ansatztage: täglich Mo. - Fr. ° Fremdleistung Liquor
Cytomegalie IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum 1 ml Liquor°
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	CMV IgM-Ak bis zu 12 Monate post infectionem nachweisbar, auch bei reakt. Infektion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CYEM Ansatztage: täglich Mo. - Fr. ° Fremdleistung Liquor
Cytomegalie pp65° Lower Matrix Protein°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	latent persistierende Infektion, Immundefizienz-Syndrom
Anmerkungen	CMV ° Fremdleistung

Cytomegalievirus (CMV) PCR°:	
Probenmaterial	BAL bronchoalveoläre Lavage
Methode	PCR
Indikationen	vorwiegend bei Immunsuppression
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CMVPCR Ansatztage: bei Bedarf ° Fremdleistung
Darm-AP	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 14 U/l
Darmbilharziose / Bilharziose (Schistosomen)°	
Probenmaterial	Mikroskopischer Nachweis: Stuhlprobe Antikörpernachweis: 1 ml Serum
Methode	Mikroskopischer Nachweis
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: nach Bedarf Nachweis von Schistosoma-Eiern aus dem Stuhl. Bei der Probenentnahme sind blutige und schleimige Anteile zu bevorzugen. Aufgrund der intermittierenden Ausscheidung der Eier, sollten mind. 3 Proben von 3 verschiedenen Tagen (am besten im Abstand von jeweils 2 Tagen) eingesandt werden. Bei wiederholt negativem Stuhlbefund und weiterbestehendem V.a. Infektion, kann der Nachweis aus einer Biopsie der hinteren Rektumschleimhaut versucht werden. Bei negativem mikroskopischen Nachweis sollte unbedingt ein Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr durchgeführt werden. Antikörpernachweis: Bei Patienten, die nicht aus Endemiegebieten stammen, schließt ein negativer Antikörpernachweis > 3 Monate nach Rückkehr eine Schistosoma-Infektion mit großer Sicherheit aus.

D-Dimere	
Probenmaterial	Citratplasma GEFROREN!
Methode	immunologische Messung
Normalwerte	< 0.50 µg/ml
Indikationen	Gerinnungsdiagnostik: Fibrinspalt-Produkte V.a. venöse Thromboembolie disseminierte intravasale Gerinnung Kontrolle der Lysetherapie
Anmerkungen	Versand gefroren Analytkürzel: FISP Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Latexverstärkter Immunoassay Endogene und therapeutische Hyperfibrinolyse Verbrauchskoagulopathie mit reaktiver Hyperfibrinolyse Verlaufskontrolle bei hämolytisch urämischem Syndrom Abstoßungskrisen nach Organtransplantation Verdacht auf latente Thrombose
Dehydroapiprazol im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Einheit in ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DARIP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Dehydro-aripiprazol im Serum	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	100 - 350 ng/ml

Dehydroepiandrosteron-Sulfat DHEA-S

Probenmaterial	2 ml Serum				
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)				
Normalwerte	weiblich: 0 Wochen 108,0 - 607,0 µg/dl von 1 Woche - 3 Wochen 31,6 - 431,0 µg/dl von 4 Wochen - 11 Monate 3,4 - 124,0 µg/dl von 12 Monate - 4 Jahre 0,5 - 19,4 µg/dl von 5 Jahre - 9 Jahre 2,8 - 85,2 µg/dl von 10 Jahre - 14 Jahre 33,9 - 280,0 µg/dl von 15 Jahre - 19 Jahre 65,1 - 368,0 µg/dl von 20 Jahre - 24 Jahre 148,0 - 407,0 µg/dl von 25 Jahre - 34 Jahre 98,8 - 340,0 µg/dl von 35 Jahre - 44 Jahre 60,9 - 337,0 µg/dl von 45 Jahre - 54 Jahre 35,4 - 256,0 µg/dl von 55 Jahre - 64 Jahre 18,9 - 205,0 µg/dl von 65 Jahre - 74 Jahre* 9,4 - 246,0 µg/dl von 75 Jahre - 120 Jahre* 12,0 - 154,0 µg/dl männlich: 0 Wochen 108,0 - 607,0 µg/dl von 1 Woche - 3 Wochen 31,6 - 431,0 µg/dl von 4 Wochen - 11 Monate 3,4 - 124,0 µg/dl von 12 Monate - 4 Jahre 0,5 - 19,4 µg/dl von 5 Jahre - 9 Jahre 2,8 - 85,2 µg/dl von 10 Jahre - 14 Jahre 24,4 - 247,0 µg/dl von 15 Jahre - 19 Jahre 70,2 - 492,0 µg/dl von 20 Jahre - 24 Jahre 211,0 - 492,0 µg/dl von 25 Jahre - 34 Jahre 160,0 - 449,0 µg/dl von 35 Jahre - 44 Jahre 88,9 - 427,0 µg/dl von 45 Jahre - 54 Jahre 44,3 - 331,0 µg/dl von 55 Jahre - 64 Jahre 51,7 - 295,0 µg/dl von 65 Jahre - 74 Jahre* 33,6 - 249,0 µg/dl von 75 Jahre - 120 Jahre* 16,2 - 123,0 µg/dl METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!				
Indikationen	Differenzierung adrenaler und ovarieller Ursachen einer vermehrten Testosteron aktivität Hirsutismus Virilisierung bei Frauen Androgen-produzierender Tumor der NNR ACTH-abhängiger Hypercortisolismus				
Anmerkungen	Analyst Kürzel: DHEA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lagerung:</td></tr> <tr> <td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer
Lagerung:					
Temperatur	Dauer				

Dehydroepiandrosteron-Sulfat DHEA-S			
	-20°C	12 Monate	
	2-8°C	14 Tage	
	Raum Temperatur	5 Tage	
Delpech Blau Quotient			
Probenmaterial	5 ml Liquor und 2 ml Serum		
Normalwerte	0.38 – 0.7		
Anmerkungen	ohne Serum ist keine Auswertung bezüglich intrathekalen Synthese oder Schrankenstörung möglich		
Dengue-Virus Antigen°			
Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	ELISA (Enzym-Linked-ImmunoSorbent-Assay)		
Normalwerte	negativ		
Indikationen	Fieber, Exanthem nach Tropenaufenthalt. V.a. akute oder zurückliegende Infektion		
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: DENGAG		
Dengue Virus IgG/IgM°			
Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	IFT		
Normalwerte	< 1:20		
Indikationen	Fieber, Exanthem nach Tropenaufenthalt. V.a. akute oder zurückliegende Infektion		
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: DENG G, DENG M		
Desethylamiodaron			
Probenmaterial	1 ml Serum		
	BE kurz vor nächster Gabe		
	keine Gel-Röhrchen verwenden!		
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)		
Normalwerte	1,0 - 2,5 µg/ml		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DESE Ansatzzeit: 1 - 2 x / Woche		

Desipramin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Imipramin und Desipramin: Therap. Ber.: 175 - 300 ng/ml Kritisch ab: 300 ng/ml
Indikationen	Trizyklische Antidepressiva
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DESI Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 15 - 18 Std.
Desmethyldiazepam	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	50 – 700 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DECL Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! wirksamer Metabolit, mit geringerer Aktivität
Desmethyldiazepam°	
Probenmaterial	2 ml Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Summe Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam und Temazepam: Therap. Bereich 100 – 2500 ng/ml kritisch ab: 3000 ng/ml
Indikationen	wirksamer Metabolit
Anmerkungen	° Fremdleistung

Desmethylfluoxetin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	0 - 200 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NFLUO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 4 - 15 Tage
Desmethylmirtazapin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Keine therapeut. Bereiche verfügbar. Nach aktuellem Wissensstand scheint Nor-Mirtazapin als Metabolit nicht zur pharmakologischen Wirkung von Mirtazapin beizutragen.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NMIRT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden.

Desoxy-Pyridinolin°	
Probenmaterial	20 ml Spontanurin aus 2. Morgenurin
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	10 – 50 µg/g Kreatinin Kinder altersabhängig
Indikationen	Osteoporosediagnostik
Anmerkungen	Marker für Knochenabbauprozesse s. a. β-CrossLaps°, Osteocalcin° ° Fremdleistung
DFS 70 IgG AK°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassays)
Normalwerte	< 1,0 Index
Indikationen	Zusatztest bei positivem Nachweis von ANA mit fraglicher Spezifität (IFT-Muster gesprenkelt). Isolierte DFS70-Antikörper sind nach derzeitiger Kenntnis nicht mit Autoimmunerkrankungen assoziiert und werden bei 5-10 % der Gesunden gefunden.
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: DFS70 Ansatztage: nach Bedarf 1 x in der Woche

Diagnostik von IgE-vermittelten Allergien	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. IgE-vermittelte Allergie, insbesondere wenn Hauttestungen nicht möglich sind
Anmerkungen	Testung mittels Anforderung von Einzelallergenen, Allergenkomponenten oder Screening. Die parallele Bestimmung von Gesamt-IgE ist hilfreich zur Beurteilung der spezifischen IgE-Werte. Häufigste Anforderung ist die Bestimmung von spezifischen IgE-Antikörper. Möglich ist die Durchführung von Screenings (z.B. SX1 (früher Phadiatop) für Inhalationsallergene oder fx5 zur Abklärung einer Nahrungsmittelallergie) oder die Bestimmung von Einzelallergenen. Zudem sind immer mehr Allergenkomponenten (z.B. Bet v 1 der Birke) im Rahmen der sog. Molekularen Allergiediagnostik verfügbar. Die Ergebnisse müssen immer im Zusammenhang mit der Klinik/Anamnese und evtl. durchgeführten Hauttesten beurteilt werden. Die Bestimmung von spezifischen IgE-Antikörpern aus Serum ist mit Hauttesten mittlerweile als gleichwertig zu betrachten. Für eine Übersicht aktuell verfügbarer Allergene steht die ImmunoCAP Allergenübersicht zur Verfügung. Die Bestimmung von Gesamt-IgE ist hilfreich zur Beurteilung der spezifischen IgE-Werte. Gesamt-IgE alleine kann jedoch nicht zum Ausschluss einer Allergie benutzt werden, da ein normales Gesamt-IgE eine atopische Erkrankung nicht ausschließt. Neben der Allergologie hat Gesamt-IgE auch eine Bedeutung bei der Diagnostik von Parasitosen und Immundefekten. Für spezielle Fragestellungen IgE-vermittelter Allergien oder bei möglichen pseudoallergischen Reaktionen, stehen Teste auf zellulärer Basis wie der CAST (Cellular Antigen Stimulation Test) zur Verfügung und der BST (Basophilen-Stimulationstest). Neben kommerziell verfügbaren Testsubstanzen können für beide Tests auch mitgeschickte Substanzen eingesendet werden (z.B. Medikamente). Wichtig ist, dass für beide Tests frisches Blut benötigt wird. Bezüglich der Allergenverfügbarkeit wird eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme angeraten. Für die Diagnostik von verzögerten allergischen Reaktionen wie zum Beispiel Kontaktallergien oder einigen Medikamentenallergien ist eine Abklärung mit IgE-Antikörpertesten nicht möglich. Hier

Diagnostik von IgE-vermittelten Allergien

besteht die Möglichkeit einen **LTT (Lymphozytentransformationstest)** einzusetzen. Hierfür wird Heparin- UND Vollblut benötigt, das zwingend taggleich im Labor eingehen muss. Wie für IgE-Teste gilt auch hier, dass die Ergebnisse immer im Zusammenhang mit Klinik und Anamnese beurteilt werden müssen.

Diaminoxidase DAO (REA)°

Probenmaterial	Serum GEFROREN! Präanalytik: Die Bestimmung der DAO ist für Schwangere nicht geeignet, da es bei schwangeren Frauen zu Verfälschungen der DAO-Werte kommen kann.
Methode	REA
Normalwerte	> 10,0 U/ml
Indikationen	V.a. Histaminintoleranz
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: DAO Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. die DAO in der Darmschleimhaut gilt als wichtigstes Enzym zum Abbau exogen zugeführten Histamins. Die Konzentrationen der DAO im Blut lässt allerdings keinen Rückschluss auf die Enzymaktivität der DAO im Dünndarm zu. So kann es trotz eines ausreichenden Serumspiegels zu Symptomen kommen und eine Histaminintoleranz vorliegen. Einer Reihe von Medikamenten wird ein negativer Einfluss auf die DAO zugeschrieben: Acetylcystein, Metamizol, Verapamil, Metronidazol oder Metoclopramid.

Diazepam°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Für die Summe aus Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam und Temazepam gilt: Therap. Bereich: 100-2500 ng/ml Kritisch ab: 3000 ng/ml Quelle: Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology (AGNP) 2017.
Indikationen	Antikonvulsivum
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden! ° Fremdleistung MVZ Dr. Eberhard & Patner Dortmund Analyt Kürzel: DIAZ Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Auswahl Medikamente: Valium® Halbwertszeit (HWZ): 24 bis 48 Std. (Diazepam) Diazepam ist selbst pharmakologisch aktiv und wird zu den ebenfalls pharmakologisch aktiven Metaboliten Desmethyldiazepam, Temazepam und Oxazepam metabolisiert, woraus insgesamt eine lange Halbwertszeit resultiert. Gemäß AGNP wird das TDM von Diazepam nicht grundsätzlich für die Dosisfindung empfohlen, kann aber für spezielle Indikationen oder besondere Probleme potenziell nützlich sein und sollte daher auf spezifische Fragestellungen beschränkt werden. (Empfehlung AGNP Stufe 4: TDM Potentiell nützlich)
Diclofenac	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Bereich: min: 50 - 500 ng/ml max: 100 - 2500 ng/ml

Differentialblutbild / Großes Blutbild	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Widerstandsmessprinzip hydrodynamische Fokussierung Clusteranalyse Mikroskopie der Ausstriche
Normalwerte	Werte altersabhängig, siehe Befund
Indikationen	Beurteilung der Hämatopoese: Rechts-, Linksverschiebung des Blutbildes bei Leukozytose, Leukopenie, Infektionen, Intoxikationen, Tumorerkrankungen Leukämien und andere hämatologische Systemerkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DIFF Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Digitoxin	
Probenmaterial	1 ml Serum, 8 bis 24 h nach letzter Einnahme
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 10 – 25 ng/ml toxisch > 30 ng/ml
Indikationen	Digimerck® Digitoxintherapieüberwachung Digitalisintoxikation Eliminationshalbwertszeit 6 - 8 Tage
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DGT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Kreuzreaktivität mit Triamteren
Digoxin	
Probenmaterial	1 ml Serum, 8 bis 24 h nach letzter Einnahme
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 0.6 – 2 ng/ml
Indikationen	Novodigal®; Lanitop®; Digoxintherapie Überwachung Digitalisintoxikation Eliminationshalbwertszeit 1 - 2 Tage
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DIG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Dihydrocodein°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang) in Schmerz-/ Hustenmitteln (Paracodin Remedacen u.a.); Therapeutikum

Dihydrocodein/Dihydromorphin	
Probenmaterial	5 ml Urin
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Dihydrocodein im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Dihydrotestosteron°	
Probenmaterial	3 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Frauen 2.4 – 36.8 ng/dl Männer 25 – 99 ng/dl
Indikationen	Hypogonadismus Klinefelter-Syndrom Impotenz NNR-Hyperplasie NNR-Tumore Hirsutismus polyzystische Ovarien
Anmerkungen	° Fremdleistung
Diltiazem°	
Probenmaterial	Serum GEFROREN! , Lichtgeschützt
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich: 50 - 200 µg/L Toxischer Bereich: > 800 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: DILS Ansatzstage: täglich, Mo., Mi., Fr. Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe, HWZ 6 Std. Präanalytik: Tiefgefroren und lichtgeschützt. Nicht älter als 1 maximal 2 Tage nach Einnahme.
Dimorphe Pilze	
Methode	Kultureller Nachweis
Anmerkungen	für weitere Details siehe www.rki.de (Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatidis, Paracoccidioides brasiliensis) Diese Pilze fallen unter die Risikostufe 3 und unterliegen verschärften Vorschriften bzgl. Umgang und Transport. Bei Verdacht und entsprechender Anamnese ist daher eine Rücksprache mit dem Labor dringend erforderlich!

Diphtherie <i>Corynebacterium diphtheriae</i>°	
Probenmaterial	Nasopharyngeal- und Rachenabstrich
Methode	Kultureller Nachweis / PCR
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei Krankheitsverdacht muss für die gezielte Erregersuche das Labor unbedingt vorab telefonisch informiert werden. Geeignet sind Nasopharyngeal- und Rachenabstriche, die unter laryngoskopischer Kontrolle unterhalb des abgehobenen pseudomembranösen Belags entnommen oder mit einer Zange abgezipft werden (Vorsicht: Gefahr der Verlegung der Atemwege). Bereits der V.a. Diphtherie ist meldepflichtig und stellt eine Indikation für die sofortige Antitoxingabe und Antibiotikatherapie dar. (Bei V.a. eine kutane Infektion mit <i>C. diphtheriae</i> sind neben Haut- auch Nasopharyngeal- und Rachenabstriche zu gewinnen.)
Diphtherie-Toxoid-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Indikationen	Prüfung der Immunität
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DIPA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
DKK3 (Dickkopf 3) Konzentration°	
Probenmaterial	Urin
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung

DMPS-Test (Dimival®-Test) Probe I: Zink-Bestimmung	
Probenmaterial	Urin I: 10 – 20 ml
Methode	Spontanurin
Indikationen	vor Gabe von DMPS Zink < 140 µg/g Kreatinin spricht für chronischen Zinkmangel
Anmerkungen	(keine Kassenleistung) Dimival®: Kontraindikation und Nebenwirkungen sind zu beachten, s. Herstellerangaben Gabe von 3 mg DMPS (Dimival®)/kg Körpergewicht langsam i.v. oder 10 mg DMPS (Dimival®)/kg Körpergewicht als Kapsel oral auf nüchternen Magen (Probe I), danach Patienten ca. 150 ml trinken lassen, z.B. Tee, Wasser (Probe II).
DNS-AK (Doppelstrang-DNA)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 10.0 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml
Indikationen	Diagnose/Therapiekontrolle Systemischer Lupus erythematodes
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DSDN_S Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.
Dobrava Belgrad-IgG /-IgM-Ak DOBV	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: DOGB, DOMB Ansatzstage: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Vorkommen: Mitteleuropa und europäischer Teil Russlands Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS). Dieses Syndrom ist bei den in Deutschland vorkommenden Virustypen (PUUV und DOBV) sehr selten.

Dopamin°															
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin gesammelt mit 10 ml HCl														
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)														
Normalwerte	<table> <tr> <th></th><th>Dopamin (nmol/Tag)</th></tr> <tr> <td>Erwachsene</td><td><3300</td></tr> <tr> <td>Kinder</td><td></td></tr> <tr> <td><1 Jahr</td><td><555</td></tr> <tr> <td>1 bis 2 Jahre</td><td><914</td></tr> <tr> <td>2 bis 4 Jahre</td><td><1697</td></tr> <tr> <td>4 bis 18 Jahre</td><td><2612</td></tr> </table>		Dopamin (nmol/Tag)	Erwachsene	<3300	Kinder		<1 Jahr	<555	1 bis 2 Jahre	<914	2 bis 4 Jahre	<1697	4 bis 18 Jahre	<2612
	Dopamin (nmol/Tag)														
Erwachsene	<3300														
Kinder															
<1 Jahr	<555														
1 bis 2 Jahre	<914														
2 bis 4 Jahre	<1697														
4 bis 18 Jahre	<2612														
Indikationen	Katecholamine und Metabolite im Urin s. auch VMS Metanephrine freie Katecholamine Homovanillinsäure Neuroblastom Melanoblastom arterielle Hypertonie														
Anmerkungen	Tagesmenge angeben ° Fremdleistung														
Doxepin/Nordoxepin°															
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.														
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)														
Normalwerte	Summe Doxepin und Nordoxepin therap. Bereich: 50 - 150 ng/ml Kritisch ab: 300 ng/ml														
Indikationen	Aponal® Antidepressivum unterschiedliche individuelle Abbaurate poor/rapid metabolizer														
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DOXE, NDOX Ansatztage: 2 - 3 x / Woche Trizyklische Antidepressiva keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 15 - 20 Std.														
Doxycyclin															
Probenmaterial	Serum														
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 1,0 - 10 µg/ml														

Probenmaterial	Amphetamine	50 ml Urin
	Barbiturate	
	Benzodiazepine	
	Cannabis	
	Kokain	
	Opiate	
	Drogeneinzelnachweis / Bestätigungstest°	5 ml Urin, 2 ml Serum°
	Amphetamine	
	Amphetamin	
	Methamphetamin	
	MDA	
	MDMA	
	MDE	
	Barbiturate	5 ml Urin, 2 ml Serum°
	Benzodiazepine	5 ml Urin, 2 ml Serum°
	Cannabis	
	als THC-COOH	5 ml Urin
	als THC	2 ml Serum°
	Kokain	5 ml Urin
	Kocain/Benzoyllecgonin	2 ml Serum °
	LSD	5 ml Urin °, 2 ml Serum°
	Methadon	5 ml Urin, 2 ml Serum°
	Opiate	5 ml Urin, 2 ml Serum°
	Morphin	
	6-Acetylmorphin	5 ml Urin°
	Dihydrocodein	2 ml Serum°
	Dihydrocodein/Dihydromorphin	5 ml Urin°
	Weitere Untersuchungen auf Anfrage: z.B. Ergotamin, Glutethimid, Hydroxyzin, Meprobamat, Methadon, Nicotin, Pentazocin, Pethidin, Polamidon, Tilidin.	
	Drogen im Haar°	fingerdickes Haarbüschel ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang)

Drogenanalytik		
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/ GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)	
Normalwerte	Amphetamine	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg Amphetamin, Metamphetamin
	Kokain	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
	Methadon	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
	Codein	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
	Dihydrocodein	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg in Schmerz-/Hustenmitteln (Paracodin Remedacen u.a.); Therapeutikum
	Morphin	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
	6-Monoacetylmorphin	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
	9-Tetrahydrocannabinol	Nachweisgrenze 0.05 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung	
Drogen-Suchtest		
Probenmaterial	10 ml Urin	
Methode	KIMS	
Normalwerte	Schwellenwert 100 ng/ml	
Indikationen	V.a. Medikamentenmissbrauch V.a. akute Intoxikation	
Anmerkungen	bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern	
Drogen-Suchtest-Barbiturate		
Probenmaterial	10 ml Urin	
Methode	KIMS	
Normalwerte	Schwellenwert 200 ng/ml	
Indikationen	V.a. Medikamentenmissbrauch akute Intoxikation, Überwachung bei Entzugsbehandlung	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BARB Ansatztage: täglich Mi. + Fr.	
	Bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern	

Duloxetine	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	30 - 120 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DULO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Iktische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 9 - 19 Std.
EBNA-1-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	lebenslange Persistenz bei durchgemachter Infektion; Antikörperbildung 6-8 Wochen oder später (bis zu 6 Monate) nach Erkrankungsbeginn
Anmerkungen	Epstein-Barr-Virus Humane Herpes-Viren (HHV Typ 4) Inkubationszeit: 30 - 50 Tage. Fieberhafter Infekt mit zervikaler Lymphknotenschwellung, Tonsillitis, Pharyngitis, Hepatosplenomegalie. Nach Infektion persistiert das Virus lebenslang in ruhenden B-Zellen, Reaktivierung möglich. Assoziation mit Nasopharyngealkarzinom, Burkitt-Lymphom sowie andere Tumore möglich (z.B. NHL - Non Hodgkin Lymphom, Morbus Hodgkin). Schwerwiegende Komplikationen (z.B. Meningoenzephalitis, Myokarditis, Pneumonie) sind selten.

EBV-DNA°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril), Liquor
Methode	PCR
Normalwerte	negativ
Indikationen	Reaktivierung; insbesondere bei immunsupprimierten Patienten
Anmerkungen	Epstein-Barr-Virus Humane Herpes-Viren (HHV Typ 4) Inkubationszeit: 30 - 50 Tage. Fieberhafter Infekt mit zervikaler Lymphknotenschwellung, Tonsillitis, Pharyngitis, Hepatosplenomegalie. Nach Infektion persistiert das Virus lebenslang in ruhenden B-Zellen, Reaktivierung möglich. Assoziation mit Nasopharyngealkarzinom, Burkitt-Lymphom sowie andere Tumore möglich (z.B. NHL - Non Hodgkin Lymphom, Morbus Hodgkin). Schwerwiegende Komplikationen (z.B. Meningoenzephalitis, Myokarditis, Pneumonie) sind selten. ° Fremdleistung
EBV-VCA-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv >15 U/ml
Indikationen	Virus-Capsid-Antigen-IgG-Ak Spätphase der Erkrankung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EBIG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Epstein-Barr-Virus Humane Herpes-Viren (HHV Typ 4) Inkubationszeit: 30 - 50 Tage. Fieberhafter Infekt mit zervikaler Lymphknotenschwellung, Tonsillitis, Pharyngitis, Hepatosplenomegalie. Nach Infektion persistiert das Virus lebenslang in ruhenden B-Zellen, Reaktivierung möglich. Assoziation mit Nasopharyngealkarzinom, Burkitt-Lymphom sowie andere Tumore möglich (z.B. NHL - Non Hodgkin Lymphom, Morbus Hodgkin). Schwerwiegende Komplikationen (z.B. Meningoenzephalitis, Myokarditis, Pneumonie) sind selten.

EBV-VCA-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 9 U/ml grenzwertig 9 – 13 U/ml positiv > 13 U/ml
Indikationen	Virus-Capsid-Antigen-IgM-Ak, Primärinfektion, Frühphase der Erkrankung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EBIM Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Epstein-Barr-Virus Humane Herpes-Viren (HHV Typ 4) Inkubationszeit: 30 - 50 Tage. Fieberhafter Infekt mit zervikaler Lymphknotenschwellung, Tonsillitis, Pharyngitis, Hepatosplenomegalie. Nach Infektion persistiert das Virus lebenslang in ruhenden B-Zellen, Reaktivierung möglich. Assoziation mit Nasopharyngealkarzinom, Burkitt-Lymphom sowie andere Tumore möglich (z.B. NHL - Non Hodgkin Lymphom, Morbus Hodgkin). Schwerwiegende Komplikationen (z.B. Meningoenzephalitis, Myokarditis, Pneumonie) sind selten.
Echinokokken-Ak, IgG-Ak, IgG-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA Immunoblot (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	IgG-Ak: negativ
Indikationen	Echinokokkose, Fuchsbandwurm, Hundebandwurm
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) bei positivem Bestätigungstest
Echinokokken-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	E. granulosus und E. multilocularis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ECHG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest über Echinokokken-IgG Blot°

Echinokokken-IgG Blot°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	negativ
Indikationen	E. granulosus und E. multilocularis
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest ° Fremdleistung
ECP Eosinophil Cationic Protein°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 24 ng/ml
Indikationen	Verlaufsparameter bei schweren allergischen Erkrankungen
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ECP Ansatztag: täglich, Mo. - Fr. Präanalytik: Für die korrekte Bestimmung von ECP ist Serum erforderlich, das nach einer Gerinnungszeit von 60 - 120 Min. vom Blutkuchen abgetrennt werden muss. Die Einsendung von Vollblut kann wegen der kontinuierlichen Freisetzung von ECP zu falsch hohen Werten führen. Bei Verwendung eines Entnahme-Röhrchens mit Trenngel muss das Serum direkt nach Zentrifugation in ein separates Röhrchen überführt werden und dieses Röhrchen muss entsprechend beschriftet werden. Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 h nach der Applikation erfolgen, da hohe Biotin-Gaben die Bestimmung stören können. Interpretation: Da ECP erst im Rahmen der Blutgerinnung aus voraktivierten eosinophilen Granulozyten freigesetzt wird, erlaubt die Bestimmung einen Einblick in den Aktivierungszustand der Zellen im peripheren Blut. Dies muss nicht unbedingt mit dem Aktivierungszustand am Erfolgsorgan, z. B. Haut, Lunge, Nase, korrelieren. Auch kann keine Beziehung zur Anzahl der eosinophilen Granulozyten im peripheren Blut hergestellt werden. Bei den Basalwerten des ECP bestehen große interindividuelle Schwankungen. Deshalb hat die ECP-Bestimmung nur im Rahmen von Verlaufsbeurteilungen (Longitudinal-Beurteilung) bei Patienten mit schweren allergischen Erkrankungen eine Bedeutung. <i>Literatur: Renz, H. et al.: Leitlinien-Update 061/017 in vitro-Allergie-Diagnostik, J. Lab. Med. 2010; 34 (4): 177-195</i>

EHEC Enterohämorrhagischer E. coli (EHEC)*	
Probenmaterial	Stuhl
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	Diarrhoe durch bakterielle Erreger, Blutige Diarrhoe, Immunsupprimierte Patienten
Anmerkungen	*Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage (Meldepflicht IfSG) Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. 1/3 mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlaneile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen.

Einzelallergene, spez. IgE																	
Probenmaterial	1 bis 5 ml Serum je Allergen mind. 0,1 ml																
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)																
Normalwerte	Signifikanz: negativ: CAP-Klasse 0 positiv: steigende IgE allergenspezifische Antikörper-Konzentration CAP-Klasse 1 bis 6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bewertung Klasse</th><th>Konzentration</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>< 0,35 kU/l</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0,35 - 0,70 kU/l</td></tr> <tr> <td>2</td><td>0,70 - 3,50 kU/l</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,50 - 17,5 kU/l</td></tr> <tr> <td>4</td><td>17,5 - 50,0 kU/l</td></tr> <tr> <td>5</td><td>50,0 - 100 kU/l</td></tr> <tr> <td>6</td><td>über 100 kU/l</td></tr> </tbody> </table>	Bewertung Klasse	Konzentration	0	< 0,35 kU/l	1	0,35 - 0,70 kU/l	2	0,70 - 3,50 kU/l	3	3,50 - 17,5 kU/l	4	17,5 - 50,0 kU/l	5	50,0 - 100 kU/l	6	über 100 kU/l
Bewertung Klasse	Konzentration																
0	< 0,35 kU/l																
1	0,35 - 0,70 kU/l																
2	0,70 - 3,50 kU/l																
3	3,50 - 17,5 kU/l																
4	17,5 - 50,0 kU/l																
5	50,0 - 100 kU/l																
6	über 100 kU/l																
Anmerkungen	CAP-RAST -Anforderungsbogen bitte im Labor anfordern zur Abklärung einer Histaminintoleranz Diaminoxidase DAO bestimmen Der Allergieanforderungsbogen beinhaltet eine Vielzahl von Einzelallergenen in verschiedenen Gruppen: Mikroorganismen und rekombinante Allergene (Mikroorganismen) Nahrungsmittel und rekombinante Allergene von Nahrungsmitteln: Cerealien, Nüsse, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Gewürze, Milch und Milchprodukte, Hühnerei, Fleischsorten, Fische, Muscheln, Schalentiere, rekombinante Allergene (Nahrungsmittel), sonstige Nahrungsmittel Pflanzliche Allergene Gräser- und Getreidepollen, Kräuterpollen, Baumpollen und rekombinante (pflanzliche) Allergene Sonderallergene: weitere Allergene auf Anfrage Allergenspezifische IgG-Antikörper: Therapieverlaufsbeobachtungen (z. B. SIT - spezielle Immuntherapie), Exogen-allergische-Alveolitis, Nahrungsmittelintoleranz. Erfasst werden sensibilisierende und blockierende Ak sowie Ak bei Typ III Reaktion.																

Einzelnachweis Medikamente/Drogen		
Probenmaterial	5 ml Serum 10 ml Urin	
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)	
Normalwerte	Therap. Bereiche der Serumwerte s. Befund	
Indikationen	z.B. Barbital, Bromazepam, Butalbital, Cyclobarbitol, Flurazepam, Hexobarbital, Lorazepam, Oxazepam, Pentobarbital, Secobarbital	
Einzelstrang-DNA (ssDNA)-Ak°		
Probenmaterial	Serum	
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)	
Normalwerte	< 20,0 RE/ml	
Indikationen	Verdacht auf Arzneimittel-induzierten Lupus erythematodes	
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: DNSE Ansatzstage: bei Bedarf	
	Interpretation:	Hochtitrige Ergebnisse deuten neben hochtitrigen Histon-Antikörpern auf arzneimittelinduzierten Lupus hin.
	Weiterführende Analysen:	Histon-Antikörper, ein SLE-Marker (z. B. Doppelstrang-DNA oder SmD-Antikörper) zum Ausschluss eines SLE.
Eisen		
Probenmaterial	1 ml Serum, hämolysefrei	
Methode	Photometrie	
Normalwerte	Frauen 37 – 145 µg/dl Männer 59 – 158 µg/dl	
Indikationen	Eisenverwertungs- und Verteilungsstörungen V.a. renale Anämie	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FES Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.	

Eisensorptionstest	
Probenmaterial	Serum
Methode	Eisen-Resorptionstest
Normalwerte	• Unauffälliger Befund: Ausgangswert im Referenzbereich, Anstieg um ca. 40% nach Fe^{2+} • Eisenmangel: Ausgangswert erniedrigt, Anstieg > 100 % bzw. > 40 $\mu\text{mol/L}$ nach Fe^{2+} • Eisenresorptionsstörung: Ausgangswert erniedrigt, nur geringer Anstieg nach Fe^{2+} • Eisenüberladung: Ausgangswert erhöht, geringer Anstieg nach Fe^{2+}
Indikationen	V.a. Eisenresorptionsstörung
Anmerkungen	Analyst Kürzel: FES, FES2, FES3 Ansatztage: nach Bedarf Testprinzip: Eisen wird im Duodenum und oberen Jejunum als zweiwertiges Eisen (Fe^{2+}) zu 5-10% resorbiert und ins Blut abgegeben. Hinweise: • Untersuchung eines Eisenmanels durch alternative Analysen bevorzugen (z.B. Ferritin und CRP, Transferrinsättigung, Anteil hypochromer Erythrozyten, löslicher Transferrin-Rezeptor (sTfR), Hämoglobingehalt der Retikulozyten) • Der Test wird nur in Ausnahmefällen zur Diagnostik von Eisenresorptionsstörungen eingesetzt. Testdurchführung: 1. Blutentnahme basal (morgens nüchtern) Eisen (0 min) 2. Anschließend orale Einnahme von 200 mg Fe^{2+} 3. Blutentname nach 2 h und 4 h Eisen
Eisenstoffwechsel, Anämiediagnostik	
Probenmaterial	1 ml Serum 1 ml EDTA-Blut
Anmerkungen	Zur Anämiediagnostik sollten Eisen, Transferrin, Ferritin und löslicher Transferrin-Rezeptor aus Serum sowie Retikulozyten Hb aus EDTA-Blut bestimmt werden (s. a. Retikulozyten).

Eiweiß-Elektrophorese im Serum		
Probenmaterial	1 ml Serum Abnahme nüchtern	
Methode	KZE Kapillarzonenelektrophorese	
Normalwerte	Albumin	55.8 – 66.1 %
	α1-Globulin	2.9 – 4.9 %
	α2-Globulin	7.1 – 11.8 %
	β1 -Globulin	4.7 – 7.2 %
	β2 -Globulin	3.2 – 6.5 %
	γ -Globulin	11.1 – 18.8 %
Indikationen	Suchtest auf Dysproteinämien entzündliche Aktivität Nieren- und Lebererkrankungen Monoklonale Gammopathie (siehe Immunfixation) M. Waldenström Plasmozytom Antikörpermangel (quantitative Immunglobulinbestimmung) Immunfixationselektrophorese	
Anmerkungen	Abnahme nüchtern	
Eiweiß im Liquor		
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen	
Methode	Turbidimetrie	
Normalwerte	20 - 40 mg/dl	
Indikationen	DD: Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EIW_L Ansatztage: nach bedarf	
Eiweiß im Urin		
Probenmaterial	Urin	
Methode	Combur-Test	
Normalwerte	< 150 ml/l	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HEI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Elastase 1 im Serum°, E 1 im Serum		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)	
Normalwerte	< 3.5 ng/ml	
Indikationen	akute Pankreatitis, akuter Schub einer chronischen Pankreatitis	
Anmerkungen	° Fremdleistung	

Elastase 1 im Stuhl, E 1 im Stuhl	
Probenmaterial	Spezialröhrchen für Stuhl (Best. Nr.: 319060)
Methode	Chemiluminiszenz-Immunoassay (CLIA)
Normalwerte	normal: $\geq 200 \mu\text{g/g}$ Leichte bis moderate exokrine Pankreasinsuffizienz: $100 - < 200 \mu\text{g/g}$ Schwere exokrine Pankreasinsuffizienz: $< 100 \mu\text{g/g}$
Indikationen	Pankreas-Elastase: exokrine Pankreasinsuffizienz, chronische Pankreatitis, Pankreastumor, Mukoviszidose, Steatorrhoe
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ELST unter Substitution gegebene Enzympräparate haben keinen Einfluss auf das Messergebnis Beschreibung: Die LIAISON® Q.S.E.T. Device Plus- Methode Bestellung: Spezialröhrchen für Stuhl (Best. Nr.: 319060)
EMA Test°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	$> 400 \text{ MFI}$
Indikationen	Untersucht die Eosin-5-Maleimid Bindung an die Erythrozytenmembran V.a. Membrandefekt der Erythrozyten vermindert bei hereditärer Sphärozytose
Anmerkungen	° Fremdleistung

ENA-Ak, Autoantikörper gegen Extrahierbare Nukleäre Antigene

Probenmaterial	1 ml Serum																																
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)																																
Indikationen	Kollagenosen Autoimmunhepatitis Antinukleäre-Ak indirekter IFT SLE medikamenteninduzierter SLE <table><tr><td>Autoimmunerkrankung</td><td>Prävalenz von ANA</td></tr><tr><td>SLE (Systemischer Lupus erythematoses)</td><td>95 – 100 %</td></tr><tr><td>Medikamenten-ind. LE</td><td>95 – 100 %</td></tr><tr><td>Kutane LE-Formen</td><td>20 – 80 %</td></tr><tr><td>Mischkollagenose (MCTD, Sharp-Syndrom)</td><td>95 – 100 %</td></tr><tr><td>CREST-Syndrom</td><td>95 – 100 %</td></tr><tr><td>Sjögren Syndrom</td><td>50 – 95 %</td></tr><tr><td>Felty-Syndrom</td><td>60 – 95 %</td></tr><tr><td>Rheumatoide Arthritis</td><td>20 – 50 %</td></tr><tr><td>Juvenile chronische Arthritis</td><td>25 – 60 %</td></tr><tr><td>Autoimmunhepatitis</td><td>60 – 100 %</td></tr><tr><td>Progressive Systemisklerose</td><td>85 – 95 %</td></tr><tr><td>Polymyositis/ Dermatomyositis</td><td>40 – 80 %</td></tr><tr><td>Virushepatitis</td><td>< 30 %</td></tr><tr><td>Thyreoiditis</td><td>20 – 40 %</td></tr><tr><td>Normalpersonen (> 60 J)</td><td>< 30 %</td></tr></table> Das ANA-Fluoreszenzmuster kann differenzialdiagnostisch von Bedeutung sein: Bei Verdacht auf eine Autoimmunerkrankung, insbesondere aus dem rheumatischen Formenkreis, ist die indirekte Immunfluoreszenz die beste Screening-Methode zum Nachweis von zirkulierenden ANA. Bei ANA-positiven Befunden wird zur Bestätigung die Untersuchung auf dsDNA und ENA empfohlen.	Autoimmunerkrankung	Prävalenz von ANA	SLE (Systemischer Lupus erythematoses)	95 – 100 %	Medikamenten-ind. LE	95 – 100 %	Kutane LE-Formen	20 – 80 %	Mischkollagenose (MCTD, Sharp-Syndrom)	95 – 100 %	CREST-Syndrom	95 – 100 %	Sjögren Syndrom	50 – 95 %	Felty-Syndrom	60 – 95 %	Rheumatoide Arthritis	20 – 50 %	Juvenile chronische Arthritis	25 – 60 %	Autoimmunhepatitis	60 – 100 %	Progressive Systemisklerose	85 – 95 %	Polymyositis/ Dermatomyositis	40 – 80 %	Virushepatitis	< 30 %	Thyreoiditis	20 – 40 %	Normalpersonen (> 60 J)	< 30 %
Autoimmunerkrankung	Prävalenz von ANA																																
SLE (Systemischer Lupus erythematoses)	95 – 100 %																																
Medikamenten-ind. LE	95 – 100 %																																
Kutane LE-Formen	20 – 80 %																																
Mischkollagenose (MCTD, Sharp-Syndrom)	95 – 100 %																																
CREST-Syndrom	95 – 100 %																																
Sjögren Syndrom	50 – 95 %																																
Felty-Syndrom	60 – 95 %																																
Rheumatoide Arthritis	20 – 50 %																																
Juvenile chronische Arthritis	25 – 60 %																																
Autoimmunhepatitis	60 – 100 %																																
Progressive Systemisklerose	85 – 95 %																																
Polymyositis/ Dermatomyositis	40 – 80 %																																
Virushepatitis	< 30 %																																
Thyreoiditis	20 – 40 %																																
Normalpersonen (> 60 J)	< 30 %																																
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ANAPR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table><tr><td colspan="2">Lagerung:</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>3 Monate</td></tr><tr><td>2-8°C</td><td>7 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>1 Tag</td></tr></table> Nachforderbarkeit: max. 7 Tage	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	3 Monate	2-8°C	7 Tage	Raum Temperatur	1 Tag																						
Lagerung:																																	
Temperatur	Dauer																																
-20°C	3 Monate																																
2-8°C	7 Tage																																
Raum Temperatur	1 Tag																																

Endomysium-AK IgA (IFT)°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:10
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ENDOMYA Ansatztage: bei Bedarf Keine IgA-Ak gegen Endomysium nachweisbar. Ein negativer Endomysium-IgA-Antikörper-Nachweis schließt eine Zöliakie nicht aus; ca. 10% der Zöliakie-Patienten weisen einen selektiven IgA-Mangel auf. Zusätzlich Gesamt IgA-Bestimmung empfohlen. Weiterführende Analysen: Transglutaminase - IgA-Ak (tTG-IgA-AK), Giadin-IgG-Ak, Immunglobulin, HLA-DQ-Antigene
Endomysium-AK IgG (IFT)°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:10
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ENDOMYG Ansatztage: bei Bedarf Bestimmung empfohlen bei V.a. Zöliakie ohne NW von IgA-AK gegen Endomysium. Ein negativer Endomysium-IgA-Antikörper-Nachweis schließt eine Zöliakie nicht aus; ca. 10% der Zöliakie-Patienten weisen einen selektiven IgA-Mangel auf. Endomysiale IgA-Antikörper werden häufig bei glutensensitiver Enteropathie/Zöliakie, ggf. in Kombination mit einer Dermatitis herpetiformis Duhring (DHD) nachgewiesen. Weiterführende Analysen: Transglutaminase - IgA-Ak (tTG-IgA-AK), Giadin-IgG-Ak, Immunglobulin, HLA-DQ-Antigene
Enteroviren IgG-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 11 U/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung
Enteroviren IgM-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 10 U/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung

Eosinophile		
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 0,5 - 5,5 %	
Anmerkungen	siehe Differential Blutbild Analyt Kürzel: EOS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Eosinophile absolut		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in x 1000/µl
	1 - 3 Tage	0,03 - 1,00
	4 - 7 Tage	0,04 - 1,00
	8 - 14 Tage	0,05 - 1,00
	15 - 29 Tage	0,05 - 0,95
	1 - 3 Monate	0,05 - 0,90
	4 - 6 Monate	0,05 - 0,85
	7 - 11 Monate	0,05 - 0,80
	1 - 2 Jahre	0,03 - 0,70
	3 - 6 Jahre	0,02 - 0,75
	7 - 12 Jahre	0,02 - 0,70
	13 - 15 Jahre	0,02 - 0,65
	16 - 18 Jahre	0,02 - 0,55
	ab 19 Jahre	0,02 - 0,50
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EOSA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

EPEC (Meldepflicht IfSG), Entero-Pathogener E. coli (EPEC)°	
Methode	PCR
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2-3 Tage Entero-Pathogener E. coli (EPEC) I.d.R. nur bis zu einem Alter von 3 Jahren sinnvoll; wird bei Kindern bis zu 3 Jahren bei Anforderung auf „pathogene Keime“ stets mit untersucht Mit dem im Transportgefäß enthaltenen Löffelchen ist je nach Anforderungsumfang eine mind. haselnussgroße Menge zu entnehmen bzw. das Röhrchen max. 1/3 mit Stuhl zu füllen. Möglichst blutige, eitrige oder schleimige Stuhlanteile entnehmen. Alternativ kann in Ausnahmefällen ein Rektalabstrich eingesandt werden (vorsichtig, aber ausreichend tief durch den Analkanal im Rektum abstreichen, sodass sich eine sichtbare Verfärbung durch Stuhl ergibt, Abstrichtupfer mehrmals drehen und in Transportmedium überführen). Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern. Der Probeneingang im Labor sollte innerhalb von 24 Std. erfolgen.
Epidermale Basalmembran Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Bullöse Dermatosen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Erregerspezifischer Antikörperindex	
Probenmaterial	Serum und Liquor vom selben Tag erforderlich
Normalwerte	negativ 0.7 – 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Erythromycin	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 40 pg/ml

Erythropoetin EPO°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	LIA
Normalwerte	4.3 – 29 U/l
Indikationen	V.a. renale Anämie; paraneoplastische EPO Bildung; Therapiekontrolle bei Behandlung mit EPO
Anmerkungen	siehe auch: Retikulozyten-Hb(CHR), Hypochrome Erythrozyten ° Fremdleistung
Erythrozyten	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Frauen 18 - 65 Jahre: 3.90 - 5.20 Mill/µl Frauen ab 66 Jahre: 3.85 - 5.20 Mill/µl Männer 18 - 65 Jahre: 4.30 - 5.75 Mill/µl Männer ab 66 Jahre: 4.00 - 5.65 Mill/µl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ERY Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Erythrozytenfragmente	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ERYF Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Erythrozyten Protoporphyrine°	
Probenmaterial	2 ml Heparinblut
Methode	Fluorometrie
Normalwerte	< 50 mg/dl
Indikationen	Bleivergiftung erythropoetische Porphyrie
Anmerkungen	° Fremdleistung
Erythrozyten-Resistenz	
Anmerkungen	siehe EMA-Test

Erythrozyten Verteilungsbreite	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	11,5 - 14,5 %
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EVB Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Erythrozytenzählung im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Normalwerte	< 5 mm ³
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ERYZ Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Escitalopram	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Normalwerte	15 - 80 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ESCI Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit 27 - 32 Std.
Eslicarbazepin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	12 - 35 ug/ml therap. Bereich kritischer Bereich: ab 45 ug/ml
Ethanolamin	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 0 - 11 µmol/l

Ethosuximid	
Probenmaterial	1 ml Serum BE direkt vor nächster Gabe, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	40 – 100 µg/ml toxisch > 120 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum Petnidan®, Pyknolepsinum®, Suxinutin®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ETO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. max. Spiegel 2 – 4 h nach Einnahme keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 33 - 55 Std.
Ethylglucuronid (ETG)°	
Probenmaterial	10 ml Urin 1 ml Serum Haarprobe
Methode	ELISA Chromatographie LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/ Massenspektrometrie)
Indikationen	Abstinenzkontrolle
Anmerkungen	Nachweis über ELISA, Chromatographie Bestätigungstest: LC-MS/MS ° Fremdleistung
Etiocholanolon°, Ätiocholanolon°	
Probenmaterial	20 ml vom 24-Std.-Urin sammeln über 1 ml Eisessig
Methode	GC Enzym-Immunoassay Chromatographie
Normalwerte	< 4.9 mg/d Frauen < 5.6 mg/d Männer Kinder altersabhängig
Anmerkungen	Angabe der Tagesmenge ° Fremdleistung

Etoricoxib°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: ETOR Ansatztage: Mo., Mi., Fr. Testdauer: 24 Std. Nach Mehrfachdosis von 120 mg/d werden Maximalwerte von 2,3-4,9 mg/L ca. 1,5 Std. nach Gabe erhalten. Die Minimalwerte nach 24 Std. ca. 1,2 mg/L. Biol. HWZ ca. 25 Std. Stabilität: 4 Tage bei Raumtemperatur
Everolimus	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut BE direkt vor nächster Gabe
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Empfohlene therapeutische Bereiche (Talspiegel): Nach Nierentransplantation: 3-8 ng/ml in Kombination mit dosisred. Cyclosporin A oder Tacrolimus, Basiliximab und Glucocortikoiden Nach Lebertransplantation: 3-8 ng/ml in Kombination mit Tacrolimus Nach Herztransplantation: 3-8 ng/ml in Kombination mit dosisred. Cyclosporin A oder 5-10 ng/ml in Kombination mit Mycophenolat und Glucocortikoiden Nach Lungentransplantation: 3-8 ng/ml in Kombination mit Calcineurin-Inhibitor Für Talspiegel >10 ng/ml wurden gehäuft unerwünschte Wirkungen beschrieben.
Indikationen	Überwachung des Everolimusspiegels Certican®, Zortress®, Afinitor®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EVER Ansatztage: 3 x / Woche Di., Do., Fr. Blutspiegel unter 3 ng/ml und über 12 ng/ml sollten vermieden werden.

Faktor I (Fibrinogen)	
Probenmaterial	2 ml Citratblut Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden
Methode	Koagulometrisch
Normalwerte	200 – 393 mg/dl
Indikationen	Verbrauchskoagulopathie, Hyperfibrinolyse, hämorrhagische Diathesen, Störung der Fibrinvernetzung, Überwachung einer fibrinolytischen Behandlung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FIB Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Gerinnungsuntersuchungen Die Referenzbereiche gelten für Erwachsene. Die Referenzbereiche für Kinder können altersabhängig abweichen.

Faktor II Aktivität°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>45 - 74 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>47 - 111 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>74 - 117 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>49 - 130 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>68 - 132 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>48 - 119 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>79 - 131 %</td></tr></table>		0 Monate	45 - 74 %	von 1 Monat - 4 Monate	47 - 111 %	von 5 Monate - 10 Monate	74 - 117 %	von 11 Monate - 4 Jahre	49 - 130 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	68 - 132 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	48 - 119 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	79 - 131 %
0 Monate	45 - 74 %															
von 1 Monat - 4 Monate	47 - 111 %															
von 5 Monate - 10 Monate	74 - 117 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	49 - 130 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	68 - 132 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	48 - 119 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	79 - 131 %															
Indikationen	• Abklärung eines erniedrigten Quick-Wertes unklarer Genese, sinnvoll in der Regel nur mit den Faktoren V, VII und X • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel in der Familie Hinweis: Zum Ausschluss einer Thromboseneigung Faktor II-Genmutation anfordern, s. a. Thrombophiliediagnostik.															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FII Ansatztage: täglich Mi. - Fr. Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Interpretation: Isolierte Verminderung bei: • angeborenem Defekt mit verminderter Synthese oder Synthese eines dysfunktionellen Faktor II-Moleküls (beides extrem selten!) Kombinierte Verminderung mit den Faktoren VII, X und XI bei: • Leber-Insuffizienz bei akuter oder chronischer Leber-Erkrankung mit Verminderung der Syntheseleistung • Therapie mit Antikoagulanzen (Vitamin K-Antagonisten z. B. Cumarin-Derivate) • Vitamin K-Mangel • Thrombin-Inhibitoren, Faktor Xa-Inhibitoren															

Faktor II Aktivität°	
	Gesteigerte Faktor II-Aktivität: • reaktiv nach Vitamin K-Gabe • postoperativ Eine isolierte Faktor II-Bestimmung ist selten indiziert.
Faktor II-Mutation (Prothrombinmutation)°	
Probenmaterial	EDTA-Blut: 1-2 ml
Methode	PCR und Schmelzpunktanalyse (Lightcycler) des Nukleotids 20210 G>A
Indikationen	Thromboembolien, insbesondere bei jüngeren Patienten. Nicht selten mit der FV-Leiden-Mutation assoziiert.
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FIIGE Einwilligung nach Gendiagnose Gesetz erforderlich.

Faktor IX°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>30 - 77 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>29 - 105 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>51 - 107 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>53 - 129 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>55 - 156 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>60 - 138 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>65 - 150 %</td></tr></table>		0 Monate	30 - 77 %	von 1 Monat - 4 Monate	29 - 105 %	von 5 Monate - 10 Monate	51 - 107 %	von 11 Monate - 4 Jahre	53 - 129 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	55 - 156 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	60 - 138 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	65 - 150 %
0 Monate	30 - 77 %															
von 1 Monat - 4 Monate	29 - 105 %															
von 5 Monate - 10 Monate	51 - 107 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	53 - 129 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	55 - 156 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	60 - 138 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	65 - 150 %															
Indikationen	• Abklärung einer verlängerten aPTT unklarer Genese • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel (Hämophilie B) in der Familie • Überwachung einer Substitutionstherapie mit Faktor IX-Konzentrat bei Hämophilie B • Hypersensitivität gegenüber Coumarinen															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FIX Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Präanalytik: Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Isolierte Verminderung: • angeborene isolierte Verminderung: Hämophilie B (verminderte Synthese oder Synthese eines dysfunktionellen Faktor IX-Moleküls) • beachte: Hämophilie B wird X-chromosomal vererbt. Jungen und Männer erkranken, Frauen sind Konduktorinnen. Konduktorinnen können über die Faktorbestimmung nicht sicher erkannt werden, weil auch normale Werte vorkommen. Um eine Konduktorin sicher zu erkennen, sind genetische Tests empfehlenswert. • erworbene isolierte Verminderung: Faktor IX-Inhibitoren															

Faktor IX°

- erworbene Verminderung in Kombination mit einem erniedrigten Quick-Wert:

Vitamin K-Mangel oder Vitamin K-Antagonisierung
- Erhöhte Aktivität führt nach neueren Erkenntnissen zu einem erhöhten Thrombose-Risiko.

Faktor V Aktivität°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>69 - 124 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>60 - 147 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>59 - 160 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>73 - 188 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>82 - 141 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>62 - 125 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>62 - 139 %</td></tr></table>		0 Monate	69 - 124 %	von 1 Monat - 4 Monate	60 - 147 %	von 5 Monate - 10 Monate	59 - 160 %	von 11 Monate - 4 Jahre	73 - 188 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	82 - 141 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	62 - 125 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	62 - 139 %
0 Monate	69 - 124 %															
von 1 Monat - 4 Monate	60 - 147 %															
von 5 Monate - 10 Monate	59 - 160 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	73 - 188 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	82 - 141 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	62 - 125 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	62 - 139 %															
Indikationen	• Abklärung eines erniedrigten Quick-Wertes unklarer Genese, sinnvoll in der Regel nur mit den Faktoren II, VII und X • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel in der Familie • Diagnose und Verlaufskontrolle einer Verbrauchs-Koagulopathie bei disseminierter intravasaler Gerinnungsaktivierung (DIC) • Ausschluss eines Faktor V-Inhibitors															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FV Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Präanalytik: Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Aktivitätsminderung durch Synthesestörung: a) angeborener Mangel (die homozygote Form ist sehr selten, die heterozygote Form häufiger) b) erworbener Mangel (schwere Leberschäden, paraneoplastisch) Erhöhter Verbrauch: Verbrauchs-Koagulopathien (DIC), Hyperfibrinolyse Gesteigerte Aktivität bei • entzündlichen Prozessen															

Faktor V Aktivität°

- postoperativ
- in Phase 1 der Verbrauchskoagulopathie
- bei akuten Thrombosen (nicht obligat)
- Urämie
- Protein C-Mangel
- Cholestase
- Thrombin-Inhibitoren, Faktor Xa-Inhibitoren

Beachte: nicht zu verwechseln mit Faktor V-Leiden, Faktor V-Leiden Mutationsanalyse und Abklärung einer Thrombophilie. Siehe auch Thrombophilie-Screening für weitere Hinweise.

Faktor VII°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>Monate</td><td>55 - 108 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>43 - 141 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>55 - 128 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>48 - 124 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>55 - 135 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>55 - 133 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>50 - 129 %</td></tr></table>		Monate	55 - 108 %	von 1 Monat - 4 Monate	43 - 141 %	von 5 Monate - 10 Monate	55 - 128 %	von 11 Monate - 4 Jahre	48 - 124 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	55 - 135 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	55 - 133 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 129 %
Monate	55 - 108 %															
von 1 Monat - 4 Monate	43 - 141 %															
von 5 Monate - 10 Monate	55 - 128 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	48 - 124 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	55 - 135 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	55 - 133 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 129 %															
Indikationen	• Abklärung eines erniedrigten Quick-Wertes unklarer Genese, begleitende Diagnostik: Faktoren II, V und X • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel in der Familie															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FVII Ansatztage: täglich Mo. - Sa. Präanalytik: Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Aktivitätsverminderung durch Synthesestörung: • angeborener Mangel; homozygoter Faktor-VII-Mangel mit Werten < 10 % der Norm sehr selten, heterozygoter Mangel mit leicht verminderter Aktivität relativ häufig und in der Regel symptomlos. • kombinierter Mangel der Faktoren II, VII, IX und X • erworbener Mangel bei Vitamin K-Mangel, Cumarin-Therapie und Lebersyntheseschaden. • beachte: die Ausprägung der Blutungsneigung bei Homozygoten korreliert NICHT mit den Plasmaspiegeln und kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Symptome treten meist erst bei Plasmaspiegeln unter 30% auf.															

Faktor VIII°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>65 - 153 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>50 - 187 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>53 - 132 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>59 - 167 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>61 - 154 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>43 - 155 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>50 - 150 %</td></tr></table>		0 Monate	65 - 153 %	von 1 Monat - 4 Monate	50 - 187 %	von 5 Monate - 10 Monate	53 - 132 %	von 11 Monate - 4 Jahre	59 - 167 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	61 - 154 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	43 - 155 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 150 %
0 Monate	65 - 153 %															
von 1 Monat - 4 Monate	50 - 187 %															
von 5 Monate - 10 Monate	53 - 132 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	59 - 167 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	61 - 154 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	43 - 155 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 150 %															
Indikationen	• Abklärung einer verlängerten aPTT unklarer Genese. Sinnvoll ist hier die zusätzliche Bestimmung der Faktoren IX, XI und XII sowie ein Test auf Lupus-Antikoagulanzen • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel in der Familie: z. B. Hinweis auf Hämophilie • Abklärung einer Thrombose-Neigung bzw. Verdacht auf erhöhtes Thrombose-Risiko bei asymptomatischen Personen z. B. bei auffälliger Familien-Anamnese • Überwachung einer Substitutionstherapie mit Faktor VIII-Konzentrat bei Hämophilie A															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FVIII Ansatztage: Mi. + Fr. Präanalytik: Citrat-Blut nach der Entnahme vorsichtig mischen, zentrifugieren (10 Min. bei 1.500 x g), Plasma in Zweitröhrchen pipettieren, dieses mit Citrat-Plasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Isolierte Faktor-VIII-Verminderung • angeborene isolierte Verminderung: • ◦ Hämophilie A, verminderte Synthese oder Synthese eines dysfunktionellen Faktor VIII-Moleküls ◦ von Willebrand-Syndrom Typ II N, spezifischer Defekt der Faktor VIII-Bindungsstelle des von Willebrand-Faktors • erworbene isolierte Verminderung:Faktor VIII-Inhibitoren Kombinierte Verminderung: • von Willebrand-Syndrom (vWS):Da der von Willebrand-Faktor auch Transport-Protein für Faktor VIII ist, liegt wegen der Faktor VIII-															

Faktor VIII°	
	Verminderung auch weniger Transport-Protein vor. Dies führt zum Typ II N eines von Willebrand-Syndroms. • Angeborener kombinierter Mangel der Faktoren V und VIII (sehr selten). Gelegentlich findet sich eine Verminderung im Rahmen einer Verbrauchskoagulopathie bei DIC. • Angeborene Faktor VIII-Erhöhung: Faktor VIII ist ein Akute-Phase-Protein und deshalb postoperativ, bei akuten und chronischen Entzündungen erhöht. Die angeborene Faktor VIII-Erhöhung stellt einen Risikofaktor für venöse Thrombosen dar (der molekulare Mechanismus ist noch ungeklärt).
Faktor V Mutation°	
Probenmaterial	1 - 2 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR und Schmelzpunktanalyse des Codons 506 Lightcycler
Indikationen	Thrombose (Embolie)-Abklärung Ausschluss erhöhter Thromboseneigung (Thrombophilie)
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. ° Fremdleistung

Faktor X°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>66 - 92 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>68 - 122 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>76 - 134 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>60 - 153 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>71 - 162 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>64 - 131 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>77 - 131 %</td></tr></table>		0 Monate	66 - 92 %	von 1 Monat - 4 Monate	68 - 122 %	von 5 Monate - 10 Monate	76 - 134 %	von 11 Monate - 4 Jahre	60 - 153 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	71 - 162 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	64 - 131 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	77 - 131 %
0 Monate	66 - 92 %															
von 1 Monat - 4 Monate	68 - 122 %															
von 5 Monate - 10 Monate	76 - 134 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	60 - 153 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	71 - 162 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	64 - 131 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	77 - 131 %															
Indikationen	• Abklärung eines erniedrigten Quick-Wertes bzw. verlängerter PTT unklarer Genese sinnvoll in der Regel nur mit den Faktoren II, V und VII • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktoren-Mangel in der Familie															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FX Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Präanalytik: Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Aktivitätsminderung durch: • angeborenen Mangel; homozygoter Faktor X-Mangel sehr selten, heterozygote Merkmalsträger mit leicht verminderter Aktivität häufiger • erworbenen Mangel: Leber-Insuffizienz bei akuten und chronischen Leber-Erkrankungen, Amyloidose, Cumarin-Intoxikation, Verbrauchskoagulopathie bei DIC • gesteigerte Faktor X-Aktivität: Reaktiv nach Vit. K-Gabe															

Faktor XI°																
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden															
Methode	koagulometrisch															
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>33 - 75 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>28 - 126 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>61 - 126 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>58 - 154 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>32 - 154 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>55 - 139 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>65 - 150 %</td></tr></table>		0 Monate	33 - 75 %	von 1 Monat - 4 Monate	28 - 126 %	von 5 Monate - 10 Monate	61 - 126 %	von 11 Monate - 4 Jahre	58 - 154 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	32 - 154 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	55 - 139 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	65 - 150 %
0 Monate	33 - 75 %															
von 1 Monat - 4 Monate	28 - 126 %															
von 5 Monate - 10 Monate	61 - 126 %															
von 11 Monate - 4 Jahre	58 - 154 %															
von 5 Jahre - 9 Jahre	32 - 154 %															
von 10 Jahre - 16 Jahre	55 - 139 %															
von 17 Jahre - 120 Jahre*	65 - 150 %															
Indikationen	• Abklärung einer verlängerten aPTT unklarer Genese, sinnvoll ist die zusätzliche Abklärung der Faktoren IX und XII • Anamnestisch Blutungsneigung oder bekannter Faktorenmangel in der Familie															
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FXI Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. • Angeborene isolierte Verminderung: verminderte Synthese oder Synthese eines dysfunktionellen Faktor XI-Moleküls (sehr selten) • Erworbene isolierte Verminderung:durch Inhibitoren gegen Faktor XI (sehr selten) • Erhöhte Aktivität führt zu einem erhöhten Thrombose-Risiko (wird derzeit diskutiert).															

Faktor XII°																	
Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden																
Methode	koagulometrisch																
Normalwerte	<table><tr><td>0 Monate</td><td>25 - 81 %</td></tr><tr><td>von 1 Monat - 4 Monate</td><td>38 - 137 %</td></tr><tr><td>von 5 Monate - 10 Monate</td><td>48 - 156 %</td></tr><tr><td>von 11 Monate - 4 Jahre</td><td>50 - 175 %</td></tr><tr><td>von 5 Jahre - 9 Jahre</td><td>49 - 154 %</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 16 Jahre</td><td>49 - 154 %</td></tr><tr><td>von 17 Jahre - 120 Jahre*</td><td>50 - 150 %</td></tr></table>			0 Monate	25 - 81 %	von 1 Monat - 4 Monate	38 - 137 %	von 5 Monate - 10 Monate	48 - 156 %	von 11 Monate - 4 Jahre	50 - 175 %	von 5 Jahre - 9 Jahre	49 - 154 %	von 10 Jahre - 16 Jahre	49 - 154 %	von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 150 %
0 Monate	25 - 81 %																
von 1 Monat - 4 Monate	38 - 137 %																
von 5 Monate - 10 Monate	48 - 156 %																
von 11 Monate - 4 Jahre	50 - 175 %																
von 5 Jahre - 9 Jahre	49 - 154 %																
von 10 Jahre - 16 Jahre	49 - 154 %																
von 17 Jahre - 120 Jahre*	50 - 150 %																
Indikationen	• Abklärung einer verlängerten aPTT unklarer Genese, sinnvoll ist die zusätzliche Bestimmung der Faktoren IX und XI Hinweis:Ein Faktor XII-Mangel führt nicht zu einer erhöhten Blutungsneigung, sondern wird als Risikofaktor für venöse Thrombosen diskutiert!																
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FXII Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. • Isolierte Verminderung: Ein Faktor XII-Mangel führt nicht zu einer erhöhten Blutungsneigung, auch nicht bei Operationen. Ein Faktor XII-Mangel wird als Risikofaktor für venöse Thrombosen diskutiert. • Erworbene isolierte Verminderung durch Faktor XII-Inhibitoren																

Faktor XIII Antigen°

Probenmaterial	1 ml Citratplasma GEFROREN! Bitte immer ein getrenntes Citratplasma einsenden		
Methode	Turbidimetrie		
Normalwerte	0 Monate	78,4 - 100,0 %	
	von 1 Monat - 4 Monate	55,3 - 133,2 %	
	von 5 Monate - 10 Monate	51,1 - 136,8 %	
	von 11 Monate - 4 Jahre	49,4 - 137,2 %	
	von 5 Jahre - 9 Jahre	53,5 - 142,4 %	
	von 10 Jahre - 16 Jahre	64,4 - 133,1 %	
	von 17 Jahre - 120 Jahre*	75,2 - 154,8 %	
Indikationen	• Blutungsneigung bei sonst normalen Gerinnungstests • Verdacht auf Faktor XIII-Mangel wegen anhaltender, rezidivierender Nachblutung und Störung der Wundheilung in der postoperativen Phase bei Normal befunden für Quick und aPTT und Thrombozytenzahl • Überwachung einer Substitutionstherapie mit Faktor XIII-Konzentrat		
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FXIII Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g zentrifugieren. Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Angeborene Verminderung: • verminderte Synthese oder Synthese eines dysfunktionellen Faktor XIII-Moleküls sind sehr selten Erworbene isolierte Verminderung: • postoperativ (typische Symptomatik: anhaltende rezidivierende Nachblutungen) • entzündliche Darm-Erkrankungen • Inhibitor gegen Faktor XIII (extrem selten)		

Faktor XIII Antigen°	
	Erworbene kombinierte Verminderung: • Sepsis/SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) • hämatologische System-Erkrankung • Leber-Erkrankung mit Protein-Synthesestörung
Felbamat im Serum°	
Probenmaterial	Serum ohne Gel
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	30 - 80 mg/l
Indikationen	Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: FELB Ansatztage: täglich Di. - Sa. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden. Blutentnahme unmittelbar vor der nächsten Medikamentengabe.
Ferritin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	Männer 30 – 350 ng/ml Frauen 25 – 150 ng/m Postmenopause 25 – 300 ng/m Kinder altersabhängig
Indikationen	Korrelation zum Speichereisengehalt des retikuloendothelialen Systems (RES) V.a. Anämie, Eisenmangel V.a. Hämochromatose, Akute-Phase-Protein
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FER Ansatztage: täglich Mo. - Fr. erhöht auch bei chron. Entzündungen und malignen Tumoren

Fettstoffwechsel-Diagnostik	
Probenmaterial	3ml Serum nüchtern BE nach 12 h Nahrungskarenz
Indikationen	V.a. Fettstoffwechselstörung, familiäre Hyperlipoproteinämie, Risikoabschätzung für die Entwicklung einer Arteriosklerose
Anmerkungen	Cholesterin, gesamt LDL-Cholesterin HDL-Cholesterin Triglyceride Homocystein (benötigt Spezialröhrchen) Lipidelektrophorese (Typisierung nach Fredrickson) Lipoprotein (a) Apolipoprotein A Apolipoprotein B
Fisteln	
Probenmaterial	Flüssiges Sekret, Kürettage
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: nach bedarf Fistelöffnung reinigen und desinfizieren. Dünnen, sertilen Katheter so weit wie möglich einführen und aus der Tiefe Exsudat ansaugen. Gelingt dies nicht, sollte Gewebe aus tiefergelegenen Anteilen der Wand des Fistelganges mit einer Kürette abgeschabt werden. In chronischen Entzündungsprozessen ist die Erregerkonzentration häufig geringer, sodass hier auf ein ausreichend großes Probenvolumen zu achten ist. Transport: Flüssiges Sekret: In der zur Probenentnahme verwendeten Spritze mit Verschlusskonus (luftfrei) einsenden. Kürettage: In sterilem Schraubverschlussröhrchen mit 0,5 - 1 ml steriler 0,9%iger NaCl-Lösung.

Flecainid°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	200 - 800 µg/l
Indikationen	Antiarrhythmikum Tambocor® Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden! GEFROREN! ° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: FLEC Ansatztage: täglich, Di, Do. Präanalytik: Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden; Blutentnahme unmittelbar vor nächster Gabe
Fluorid°	
Probenmaterial	2 ml Serum 10 ml Urin
Methode	ISE
Normalwerte	Serum < 30 µg/l therap. Ber. 100 – 300 µg/l Urin < 1 mg/l
Indikationen	Arbeitsplatzbelastung Fluoridprophylaxe und -therapie
Anmerkungen	° Fremdleistung

Fluoxetin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	30 - 500 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FLUO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Iktische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 4 - 6 Tage
Flupentixol®	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	GC-MS
Normalwerte	0.5 – 5 ng/ml
Indikationen	Neuroleptikum
Anmerkungen	° Fremdleistung
Fluphenazin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	1,0 - 10 ng/ml

Fluspirilen°							
Probenmaterial	Serum						
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)						
Normalwerte	0,1 - 2,2 µg/L						
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: FLUSP Ansatztage: Mo., Mi., Fr. Testdauer: 24 Std.						
	<table><tr><td>Analysengruppen</td><td>Antipsychotika, Psychopharmaka-Screening</td></tr><tr><td>Bemerkungen</td><td>Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe, HWZ 7-14 Tage.</td></tr><tr><td>Präanalytik</td><td>Stabilität bei 2-8°C 14 Tage</td></tr></table>	Analysengruppen	Antipsychotika, Psychopharmaka-Screening	Bemerkungen	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe, HWZ 7-14 Tage.	Präanalytik	Stabilität bei 2-8°C 14 Tage
	Analysengruppen	Antipsychotika, Psychopharmaka-Screening					
	Bemerkungen	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe, HWZ 7-14 Tage.					
Präanalytik	Stabilität bei 2-8°C 14 Tage						
Fluvoxamin							
Probenmaterial	Serum						
Normalwerte	therap. Bereich 60 - 230 ng/ml tox. Bereich > 500 ng/ml						
Folsäure							
Probenmaterial	1 ml Serum Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 48h						
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)						
Normalwerte	3.89 – 26.8 ng/ml Folsäure-Mangel : < 2 ng/ml						
Indikationen	Megaloblastäre Anämie, Folsäuremangel bei Schwangerschaft, Dialyse, Alkoholiker Malabsorption						
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FOLS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.						
	Stabilität 2-8 °C: 48h						
freies 25-OH-Vitamin D°							
Probenmaterial	Serum mit Lichtschutz						
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)						
Normalwerte	8,49 - 28.3 pg/ml						
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: 25OHVD						
	Stabilität: 48 Std bei Raumtemperatur; gefroren: 4 Wochen						

freies Cortisol im Serum°

Probenmaterial	1 ml Serum Probenentnahme möglichst 8 Uhr, grundsätzlich Tageszeit notieren
Methode	Rechenparameter aus Cortisol und Transcortin
Normalwerte	8 Uhr: 0,45 - 1,70 µg/dl 16 Uhr: 0,20 - 0,90 µg/dl
Indikationen	Hypercortisolismus
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: CORF

freies Cortisol im Speichel°

Probenmaterial	2 ml Speichel
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Mitternacht (ab 18 Jahre): 0,006 - 0,108 µg/dl (Median 0,021) Abhängig von Zeit nach dem Aufwachen (ab 6 Jahre): 0 Std.: 0,113 - 0,803 µg/dl (Median 0,343) 0,5 Std.: 0,200 - 1,076 µg/dl (Median 0,478) 1,0 Std.: 0,101 - 0,936 µg/dl (Median 0,384) 2,0 Std.: 0,083 - 0,574 µg/dl (Median 0,234) 5,0 Std.: 0,074 - 0,355 µg/dl (Median 0,150) 8,0 Std.: 0,055 - 0,314 µg/dl (Median 0,116) 12,0 Std.: 0,032 - 0,322 µg/dl (Median 0,082)
Indikationen	Überprüfung kortikotrope Achse, Wie im Serum folgt die Konzentration des Cortisols im Speichel einer ausgeprägten circadianen Rhythmik. Dabei finden sich minimale Konzentrationen gegen Mitternacht, maximale Konzentrationen in der Regel direkt bis 60 min nach dem Aufwachen. Zeitlich etwas versetzt sinkt die Konzentration anschließend im Laufe des Tages korrelierend zum Serum kontinuierlich ab.
Anmerkungen	Spezialröhrchen (Salivette®) anfordern ° Fremdleistung Analyt Kürzel: CORSP

freies Cortisol im Urin°

Probenmaterial	24 Std.-Urin: 10 ml ohne stabilisierende Zusätze! Sammelmenge bitte angeben!
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Cortisol-Mangel, Cortisol-Exzess
Anmerkungen	° Fremdleistung Sammelmenge bitte angeben!

freies Hämoglobin

Normalwerte	< 20 mg/dl
-------------	------------

freies Protein S-Ag

Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN! abgetrenntes Plasma bitte ein 2. Mal zentrifugieren und trennen
Methode	immunologische Messung
Normalwerte	Frauen: 54,7 - 123,7 % Männer: 74,1 - 146,1 %
Indikationen	angeborener Protein S-Mangel DD: rezidivierende Thromboembolien Angabe der Abnahmezeit erforderlich
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PROS Ansatztage: 1 x Woche Mi. oder Do. Versand gefroren siehe Thrombophiliediagnostik

freies PSA

Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PSAF Ansatztage: täglich Mo. - Fr. zusätzlich zum ges. PSA aus einer Serumprobe bestimmen <table border="1"><tr><th colspan="2">Lagerung:</th></tr><tr><th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr><tr><td>-20°C</td><td>12 Wochen</td></tr><tr><td>2-8 °C</td><td>5 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>8 Stunden</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	12 Wochen	2-8 °C	5 Tage	Raum Temperatur	8 Stunden
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	12 Wochen										
2-8 °C	5 Tage										
Raum Temperatur	8 Stunden										

freies Valproat	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	Therap. Ber.: 5.0-15.0 ug/ml
Freie-κ-Leichtketten im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	3.30 – 19.40 mg/l
Indikationen	Monoklonale Gammopathie, Plasmozytom, Multiples Myelom
Freie-κ-Leichtketten im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 33 mg/l
Anmerkungen	(2. Morgenurin)
Freie-λ-Leichtketten im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	5.71 – 26.30 mg/l
Indikationen	Leichtketten Myelom, Leichtketten Amyloidose
Freie-λ-Leichtketten im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 5 mg/l
Anmerkungen	(2. Morgenurin)
Fructosamine	
Probenmaterial	Serum
Methode	Farbtest
Normalwerte	205- 285 umol/L
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FRUCT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Fruktosamin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	physiologisch: < 285 µmol/l befriedigende Diabteseinstellung: 280 - 320 µmol/l
Indikationen	mittelfristige Therapie- und Verlaufskontrolle bei Diabetes mellitus (Stoffwechsellage der letzten 1-3 Wochen)

Fruktose im Ejakulat°	
Probenmaterial	Ejakulat im Fluorid-Röhrchen
Methode	Photometrie
Normalwerte	> 120 mg/dl
Indikationen	Fertilitätsdiagnostik: der Fruktosegehalt im Ejakulat spiegelt die Sekretion der Samenbläschen wider
Anmerkungen	° Fremdleistung
Fruktoseintoleranz°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	Gastrointestinale Beschwerden, Hypoglykämie nach fruktosehaltigen Mahlzeiten
Anmerkungen	HFI Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. ° Fremdleistung

FSH Follikelstimulierendes Hormon

Probenmaterial	1 ml Serum				
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)				
Normalwerte	weiblich: von 0 - 5 Tage < 4,5 mIU/ml von 6 Tage - 29 Tage < 22,0 mIU/ml von 30 Tage - 6 Jahre < 11,1 mIU/ml von 7 Jahre - 9 Jahre 0,5 - 4,8 mIU/ml von 10 Jahre - 17 Jahre 1,3 - 9,4 mIU/ml Follikelphase: 3.5 - 13.0 mIU/ml Ovulationsphase: 4.7 - 22.0 mIU/ml Lutealphase: 1.7 - 7.7 mIU/ml von 18 Jahre - 34 Jahre Follikelphase: 3.5 - 13 mIU/ml Ovulationsphase: 4.7 - 22 mIU/ml Lutealphase: 1.7 - 7.7 mIU/ml von 35 Jahre - 120 Jahre* Follikelphase: 3.5 - 13 mIU/ml Ovulationsphase: 4.7 - 22 mIU/ml Lutealphase: 1.7 - 7.7 mIU/ml Postmenopause: 26 - 135 mIU/ml männlich: von 0 - 5 Tage < 4,5 mIU/ml von 6 Tage - 29 Tage < 22,0 mIU/ml von 30 Tage - 6 Jahre < 3,8 mIU/ml von 7 Jahre - 10 Jahre < 3,3 mIU/ml von 11 Jahre - 13 Jahre 0,7 - 6,7 mIU/ml von 14 Jahre - 17 Jahre 1,1 - 11,2 mIU/ml von 18 Jahre - 120 Jahre* 1,5 - 12,0 mIU/ml METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!				
Indikationen	Frauen: DD primär./sekund. Hypogonadismus Ovarialinsuffizienz, Amenorrhoe, anovulatorische Zyklen primäre Ovarialinsuffizienz (hohe FSH-Werte), Menopause Männer: prim./sek. Hypogonadismus Tubulusschaden (gestörte Spermatogenese) s. auch LH, Testosteron				
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FSH Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lagerung:</td></tr> <tr> <td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer
Lagerung:					
Temperatur	Dauer				

FSH Follikelstimulierendes Hormon			
	-20°C	6 Monate	
	2-8°C	14 Tage	
	Raum Temperatur	5 Tage	
FSME-IgG-Ak			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)		
Normalwerte	negativ < 100 U/ml grenzwertig 100 - 150 U/ml positiv > 150 U/ml		
Indikationen	Z.n. Infektion, Immunstatus nach Impfung, Infektionsstatus		
Anmerkungen	Analyst Kürzel: FSME Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Frühsommer-Meningo-Enzephalitis; Flaviviren; Übertragung durch Zecken; Meningitis, Meningo-Enzephalitis nach Zeckenstich. Inkubationszeit 7-20 Tage, in Einzelfällen bis 28 Tage. Nach Impfung zeigt sich ein Anstieg der spezifischen IgG-Antikörper, IgM-Antikörper können auch über eine längere Zeit persistieren. Nach Infektion mit FSME können Antikörper meist mit Beginn der zweiten Krankheitsphase (neurologische Symptome) nachgewiesen werden. Diagnostische Methode der Wahl ist der simultane Nachweis von FSME-viruspezifischen IgM- und IgG-Antikörpern in Serum oder Liquor. Ein 4-facher Titer-Anstieg der spezifischen Antikörper nach wiederholter Untersuchung im Abstand von 2-3 Wochen gilt als beweisend für eine akute Infektion. Die stark ausgeprägte Antikörper-Kreuzreaktivität (insbesondere bei IgG-Antikörpern) mit anderen Flaviviren (Gelbfieber-Virus, Dengue-Virus, Japanisches Enzephalitis-Virus, West-Nil-Virus, ggf. auch nach entsprechenden Impfungen) ist zu berücksichtigen.		

FSME-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 - 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	Frühphase der Infektion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FSMM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Frühsommer-Meningo-Enzephalitis; Flaviviren; Übertragung durch Zecken; Meningitis, Meningo-Enzephalitis nach Zeckenstich. Inkubationszeit 7-20 Tage, in Einzelfällen bis 28 Tage.
FSME PCR°	
Probenmaterial	EDTA-Blut 2-3 ml, Liquor 500 µl, Zecke nativ (gemäß Anforderungsschein für Zecken)
Methode	RT-PCR
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME-Virus)
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FSMEP/FSMEPL Das FSME-Virus gehört zu den Flaviviren, die Übertragung erfolgt durch Zecken. Hochendemiegebiete in Deutschland sind Baden-Württemberg, Bayern sowie die südlichen Teile von Hessen und Thüringen. In Europa vor allem Österreich, Polen, Schweden und Russland. Zweiphasiger Verlauf: 1. Phase: nach Zeckenstich Fieber, Kopfschmerzen, Besserung nach ca. 1 Woche. 2. Phase: hohes Fieber, Meningitis, Meningoenzephalitis, Enzephalomyelitis. Inkubationszeit: 7 (- 20) Tage Meldepflichtige Erkrankung!
FT3 Freies Trijodthyronin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	3.1 – 6.7 pmol/l Kinder altersabhängig
Indikationen	V.a. Schilddrüsendysfunktion, T3-Hyperthyreose, Ergänzung zur FT4-Bestimmung, Therapiekontrolle
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FT3 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

FT4 Freies Thyroxin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	0.9 – 1.7 ng/dl
Indikationen	V.a. Schilddrüsendysfunktion Strumaabklärung, Therapiekontrolle bei Substitution oder Suppression
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FT4 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
FTA-ABS	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	nicht reaktiv
Anmerkungen	Bestätigungstest bei reaktivem TPHA, ca. 3 Wochen nach der Infektion reaktiv, bleibt meist auch nach adäquater Therapie lebenslang positiv.
FTA-ABS-19S-IgM IFT°	
Probenmaterial	500 µl Serum, Vollblut
Methode	ITF
Normalwerte	< 1:10
Indikationen	Nachweis einer behandlungsbedürftigen Treponemen-Infektion
Anmerkungen	° Fremdleistung
Furmecyclox (Xyligen B)	
Methode	GC/MS
GAD-Ak° Glutamat Decarboxylase-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IRMA
Normalwerte	< 1,0 U/ml
Indikationen	Typ I-Diabetes Frühdiagnose: 70-90 % der Typ I-Diabetiker weisen bis zu 8 Jahre vor der klinischen Manifestation der Erkrankung GAD-Ak auf. Kombination mit Ak gegen Insulin-spezifische Thyrosinphosphatase (IA2) sinnvoll
Anmerkungen	° Fremdleistung
gamma-Globulin	
Probenmaterial	Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	11,1% - 18,8 %

Gamma-GT γ -Glutamyltransferase	
Probenmaterial	0.5 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen < 39 U/l Männer < 66 U/l Normwerte für Kinder altersabhängig
Indikationen	Erkrankung der Leber und Gallenwege isolierte g-GT-Erhöhung Alkoholabusus hepatotoxische Medikamente
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GGT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Gastrin°	
Probenmaterial	2 ml Serum nüchtern BE morgens GEFROREN!
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	nüchtern 13 – 115 pg/ml
Indikationen	Gastrinom, Zollinger-Ellison-Syndrom peptische Ulcera; rezidivierende Ulcera nach Magenteilresektion vor BE 24 h lang keine Medikamente
Anmerkungen	° Fremdleistung
Gefäßendothel-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 1 : 100
Anmerkungen	° Fremdleistung
Gentamicin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	0.5 - 10 $\mu\text{g/ml}$ Talwert : 0.5 - 2 $\mu\text{g/ml}$ Spitzenwert: 6 - 10 $\mu\text{g/ml}$
Indikationen	BE kurz vor nächster Gabe; 30 – 60 min nach Infusion; 1h nach i.m.-Gabe
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GENT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. oder nach Bedarf

gesamt-25-Hydroxyvitamin D	
Probenmaterial	2 ml Serum mit Lichtschutz, Abnahme morgens, nüchtern Stabilität 2-8 °C: 5 Tage
Methode	CLIA
Normalwerte	Mangel < 10,0 ng/ml Unzureichende Versorgung 10,0 - 30,0 ng/ml Ausreichende Versorgung 30,0 - 100, 0 ng/ml Toxizität > 100, 0 ng/ml
Indikationen	Verdacht auf Vitamin D3-Mangel z. B. bei Hypocalcämie, Hypophosphatämie, primärer Hyperparathyreoidismus, Hypocalciurie, erhöhter AP, Pseudofrakturen, Looser-Umbauzonen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VD3 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Stabilität 2-8 °C: 5 Tage
Gesamteiweiß	
Probenmaterial	1 ml Serum, Biuret-Reaktion 1 ml Liquor 5 ml Urin vom 24 Std.-Urin
Methode	Photometrie/Turbidimetrie
Normalwerte	Serum 6.5 – 8 g/dl Liquor < 45 mg/dl Urin < 150 mg/l
Indikationen	Dysproteinämie, Störung der Blut-Hirn-Schranke Proteinurie, Ödeme, Polyurie chronische Nierenerkrankungen Infektanfälligkeit
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GEI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Gesamteiweiß im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Turbidimetrische Methode
Normalwerte	1.1 – 2.2 g/dl
Indikationen	• Nephrotisches Syndrom (Proteinurie: glomerulär oder tubulär) • Malabsorptionssyndrom • schwere Leberschädigung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EIU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage

Gesamt-IgE	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	Erwachsene < 120 U/ml Säuglinge und Kinder: altersabhängige Normalwerte
Indikationen	IgE gesamt: Allergie vom Soforttyp Asthma, Rhinitis, rezidivierende Urtikaria, unklare Symptome Magen-Darm-Trakt, Neurodermitisverdacht, Arzneimittelallergie, Parasitosen, Verbrennungen, Tumore IgE-Myelom (extrem selten)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGE Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. Bei V.a. Allergie, auch bei normalem Gesamt-IgE-Spiegel, bitte spezielle Allergiebögen anfordern und allergenspezifische IgE-Antikörper nach Anamnese bestimmen.
Glatte Muskulatur-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	negativ
Indikationen	chronisch aggressive Hepatitis, Autoimmunhepatitis
Anmerkungen	s. auch Autoantikörper
Glatte Muskulatur Ak Titer	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	< 1:100
Indikationen	Autoimmunhepatitis
Anmerkungen	Bei positivem Nachweis empfiehlt sich die Untersuchung auf anti-Actin-Spezifität.
Gliadin-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	grenzwertig: 7 bis 10 U/ml positiv: > 10 U/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLIDPA Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. Bei Patienten mit Zöliakie findet sich häufiger ein IgA-Mangel als in der Allgemeinbevölkerung, ggf. IgA quantitativ bestimmen, siehe auch: Transglutaminase Ak, Endomysium Ak.

Gliadin IgE	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	V.a. Weizenallergie
Gliadin-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	grenzwertig: 7 bis 10 U/ml positiv: > 10 U/ml
Indikationen	Zöliakie Sprue Dermatitis herpetiformis Duhring asymptotische glutensensitive Enteropathie M. Crohn Colitis ulcerosa
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLIDPG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. siehe auch: Transglutaminase Ak, Endomysium Ak.
glomeruläre Basalmembran (GBM)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 7 U/ml grenzwertig 7 - 10 U/ml positiv > 10 U/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GBMAK Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Glomeruläre Filtrationsrate GFR (MDRD/ CKD-EPI-Formel) Serum

Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	GFR berechnet nach CKD-EPI-Formel		
Normalwerte	Kategorie	GFR (ml/min per 1,73m ²)	GFR
	G1	≥90	normal oder erhöht
	G2*	60-89*	leicht reduziert*
	G3a	45-59	leicht bis moderat reduziert
	G3b	30-44	moderat bis schwergradig reduziert
	G4	15-29	schwergradig reduziert
	G5	<15	Nierenversagen

Indikationen Chronische Nierenerkrankung Erwachsener, Stadieneinteilung der Nierenschädigung

Anmerkungen Analyt Kürzel: GFRMDR| Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.

* die Kategorie G2 der GFR (60-89 ml/min per 1,73m²) muss nicht obligatorisch auf eine Nierenerkrankung hindeuten. Die GFR ist stets im Zusammenhang mit weiteren Parametern (z.B. Alter, Albumin-Creatinin-Ratio) zu werten und im Verlauf zu betrachten. Für weitere Informationen siehe entsprechende Leitlinien, z.B.:

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

oder

Interdisziplinäre S2k-Leitlinie Rationelle Labordiagnostik zur Abklärung Akuter Nierenschädigungen und Progredienter Nierenerkrankungen

Glomeruläre Filtrationsrate GFR (Urin)

Probenmaterial	1 ml Serum und 10 ml Urin vom 24 h Urin Tagesmenge angeben
Anmerkungen	Berechnung über Harnstoff- und Kreatinin Clearance mit Tagesmenge, Größe und Gewicht des Patienten Hinweis: GFR-Berechnung über Cystatin C (Kreatinin unabhängiger Parameter)

Glomerulus-Basalmembran Ak°

Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Goodpasture Syndrom Autoimmunglomerulonephritis
Anmerkungen	° Fremdleistung

Glucose im Serum - Analyse wird nicht mehr durchgeführt	
Anmerkungen	Analyse Wird nicht mehr durchgeführt Analyt Kürzel: BZIS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Blutzucker im Serum ist nicht empfohlen, bitte NaF-Röhrchen verwenden
Glucose, nüchtern	
Probenmaterial	Glukoexakt-Röhrchen Best. Nr.: 05.1074.001 1ml NaF-Blut Best.-Nr. 05.1073 oder 20µl Kapillarblut (end to end): in Hämolysathütchen, kräftig schütteln! Best.-Nr. 41.1443.904 Vollblut ist ungeeignet!
Methode	Spektrometrie, UV-/VIS-Photometrie - NaF Blut, Glukoexakt-Röhrchen Elektrochemische Untersuchung, Amperometrie - Kapillarblut
Normalwerte	60 - 100 mg /dl gestörte Nüchternglucose: 100 - 125 mg/dl manifeste Diabetes mellitus Nüchternglucose: > 126 mg/dl Schwangerschaft Nüchternglucose bis 90 mg/dl (bitte beachten: Glucoexact-Röhrchen)
Indikationen	Abklärung diabetische Stoffwechsellage; Therapiekontrolle des Diabetikers; Beurteilung des Kohlehydratstoffwechsels bei Erkrankungen, die reaktiv zu einer Störung des Kohlehydratstoffwechsels führen können, z.B. Schwangere, chronisch Leberkranke, akute und chronische Pankreatitiden, Akromegalie, M. Addison, Therapie mit Kortikosteroiden und Medikamenten, die eine Hyperglykämie induzieren, Stressreaktionen; Schwangerschaftsdiabetes; Abklärung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLU_F Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Glucose postprandial	
Probenmaterial	1 - 2 h nach einer Mahlzeit Glukoexakt-Röhrchen Best. Nr.: 05.1074.001 1ml NaF-Blut Best.-Nr. 05.1073 oder 20µl Kapillarblut (end to end): in Hämolysathütchen, kräftig schütteln! Best.-Nr. 41.1443.904 Vollblut ist ungeeignet!
Methode	Spektrometrie, UV-/VIS-Photometrie - NaF Blut, Glukoexakt-Röhrchen Elektrochemische Untersuchung, Amperometrie - Kapillarblut
Normalwerte	60 - 140 mg/dl
Indikationen	Abklärung diabetische Stoffwechsellage; Therapiekontrolle des Diabetikers; Beurteilung des Kohlehydratstoffwechsels bei Erkrankungen, die reaktiv zu einer Störung des Kohlehydratstoffwechsels führen können, z.B. Schwangere, chronisch Leberkranke, akute und chronische Pankreatitiden, Akromegalie, M. Addison, Therapie mit Kortikosteroiden und Medikamenten, die eine Hyperglykämie induzieren, Stressreaktionen; Schwangerschaftsdiabetes; Abklärung einer Hypoglykämie bei unklarem Koma.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OGTS50 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei Schwangerschaft siehe oGTT 50g

Glucose Tagesprofil	
Probenmaterial	1ml NaF-Blut Best.-Nr. 05.1073 oder 20µl Kapillarblut (end to end): in Hämolsathütchen, kräftig schütteln! Best.-Nr. 41.1443.904 Vollblut ist ungeeignet!
Methode	Spektrometrie, UV-/VIS-Photometrie - NaF Blut Elektrochemische Untersuchung, Amperometrie - Kapillarblut
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BZT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. 1. Blutentnahme nüchtern ca. 8 Uhr, danach normal essen 2. Blutentnahme vor dem Mittagessen (12 Uhr), danach normal essen 3. Blutentnahme 16 Uhr
Glukagon°	
Probenmaterial	EDTA Plasma - Spezialröhrchen anfordern und für Abnahme verwenden - GEFROREN!
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 209 pg/ml
Indikationen	Verdacht auf Glukagonom (typische Beschwerden: Gewichtsabnahme, psychische Veränderungen wie Depressionen, Diarrhoe) Erhöht bei: • Glukagonom (Glukagon-Werte meist > 5000 pg/ml) • Diabetes mellitus • Nieren-Insuffizienz • akuter Pankreatitis
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: GLUK Ansatztage: nach Bedarf Versand gefroren Spezialröhrchen anfordern und für Abnahme verwenden. Ggf. Diagnostik zum Ausschluss oder Nachweis eines primären Hyperparathyreoidismus (PTH) und Hypophysen-Tumoren anschließen (Prolaktin, LH, FSH, TSH).

Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase°	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Normalwerte	6.97 – 20.5 U/g-Hb
Indikationen	chronisch hämolytische Anämie unklarer Genese Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase Mangel hämolytische Anämie nach Einnahme von best. Medikamenten und pflanzlichen Produkten (grüne Bohnen, Favismus)
Anmerkungen	Abnahme und Versand zum Wochenanfang erforderlich: Montag-Mittwoch Erythrozyten-Enzyme° ° Fremdleistung
Glukose im Liquor	
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen
Methode	Enzymatisch
Normalwerte	Kinder: 60 – 80 mg/dl Erwachsene: 40 – 70 mg/dl
Indikationen	DD: Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLU_L Ansatzstage: nach Bedarf
Glukose im Urin	
Probenmaterial	5 ml Urin vom 24-Std.-Urin
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 0.1 g/d
Indikationen	Diabetes mellitus renaler Diabetes toxische Nierenschädigung
Anmerkungen	Angabe der Tagesmenge, Stabilisierung mit Natriumazid empfohlen Analyt Kürzel: HZU Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.
Glukose im Urin / Liter	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	HK-Test
Normalwerte	< 0.15 g/l
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLUL Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. wegen der geringen Stabilität (2h) Urin bitte mit Na-Azid stabilisieren!

Glutamat-Dehydrogenase	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Glutamatdehydrogenase Frauen < 5.8 U/l Glutamatdehydrogenase Männer < 7.3 U/l Normwerte für Kinder altersabhängig
Indikationen	Beurteilung von Schwere und Ausmaß einer akuten Leberparenchymschädigung, Ikterus, Lebererkrankung mit Parenchymzellnekrosen, akute Intoxikationen (z.B. Pilzgifte).
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GLD Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Glutamin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 435 - 721 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Glutaminsäure°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 1 - 57 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Glutathion°	
Probenmaterial	EDTA-Blut GEFROREN!
Methode	Photometrie
Normalwerte	200 – 400 mg/l
Indikationen	Biochemisches Effektmonitoring bei Belastung
Anmerkungen	° Fremdleistung
Glycin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 123 - 319 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Gonokokken-PCR STD (sexual transmitted disease)

Probenmaterial	Erststrahlurin Bei Frauen ist die Sensitivität der Gonokokken-PCR aus Zervixabstrichen deutlich höher als aus Erststrahlurin. Bei Männern hingegen ist die Sensitivität aus Erststrahlurin genauso hoch wie aus Urethralabstrichen. Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR Urethralabstrich (Spezial-Abstrichset) Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR Bei Hemmung der PCR im Abstrichmaterial sollte bei Männern die Untersuchung aus Erststrahlurin wiederholt werden. Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C) Zervixabstrich (Spezial-Abstrichset) Probenentnahme und Stabilität der Probe: siehe Chlamydien-PCR Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C) Analabstrich (Spezial-Abstrichset) Tupfer entlang der Darmwand mit leichtem Druck ca. 2-4 cm tief in den Analkanal einführen und unter Drehen entfernen. Stark mit Stuhl verunreinigte Proben sollten verworfen werden. Tupfer mit entnommenem Material in Röhrchen mit Spezialmedium überführen und darin belassen. Probenentnahme unter Sicht (Rektoskopie) aus entzündlichen Läsionen der Analschleimhaut erhöht die Ausbeute. Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C) Pharyngealabstrich (Spezial-Abstrichset) Entnahme von der hinteren Rachenwand und den Tonsillen. Stabilität der Probe: 12 Monate (2-30°C) Ejakulat / Douglaspunktat (Untersuchungen außerhalb der Akkreditierung) Probe <i>nativ</i> in sterilem Schraubverschlussröhrchen.
Methode	PCR
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.

Gonokokken-Infektion

Anmerkungen

siehe auch Mikrobiologie Gonokokken sind gramnegative Diplokokken-Bakterien, *Neisseria gonorrhoeae*, die die Gonorrhoe verursachen. Die Übertragung erfolgt durch sexuellen Kontakt sowie perinatal. Beim Mann tritt die Erkrankung als akute Urethritis, bei der Frau als Cervicitis auf. Komplikationen: Adnexitis, ektopische Schwangerschaften, Infertilität.

Gonokokken-Kultur STD (sexual transmitted disease)

Probenmaterial	Urethralabstrich Eitriges Sekret wird beim Mann von der Harnröhrenöffnung entnommen. Bei fehlendem Sekret Urethralabstrich nach 4 stündiger Miktionskarenz gewinnen, ggf. Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen. Urin und Vaginalabstrich sind für die Gonokokkenkultur <i>nicht</i> geeignet. Zervixabstrich Vor der Entnahme vorhandenen Zervikalschleim mit einem Tupfer entfernen. Anschließend einen 2. Abstrichtupfer in die Zervix einführen, mehrfach drehen und ohne die Vaginalwand zu berühren entnehmen. Analabstrich Bei V.a. gonorrhoeische Proktitis wird ein Tupfer entlang der Darmwand mit leichtem Druck ca. 2-4 cm tief in den Analkanal eingeführt. Stark mit Stuhl verunreinigte Proben sind zu verwerfen. Die Entnahme von Proben unter Sicht (Rektoskopie) aus entzündlichen Läsionen der Analschleimhaut erhöht die Sensitivität. Pharyngealabstrich Entnahme von der hinteren Rachenwand und den Tonsillen.
Methode	Kultur
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 3 Tagen Die Gonokokken-Kultur weist nicht die hohe Sensitivität der Gonokokken-PCR auf, da der Keim auf dem Transportweg sehr schnell abstirbt. Für die korrekte Probengewinnung sind Abstrichbestecke, die ein Transportmedium mit Kohlepartikel enthalten (schwarzes Gel), zu verwenden. Diese stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Da es sich hier um den Nachweis von empfindlichen Erregern handelt, sollte die Probe umgehend ins Labor gebracht werden.

GOT, ASAT AST Aspartataminotransferase	
Probenmaterial	0.5 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen < 36 U/l Männer < 51 U/l Normwerte für Kinder altersabhängig
Indikationen	Erkrankungen von Leber, Herz- und Skelettmuskel
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GOT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
GPT, ALAT ALT Alaninaminotransferase	
Probenmaterial	0.5 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen < 36 U/l Männer < 51 U/l Normwerte für Kinder altersabhängig
Indikationen	GPT: hauptsächlich in Leber Suchenzym zur Erkennung von Lebererkrankungen Verlaufs- und Therapiekontrolle von Erkrankungen der Leber und der Gallenwege
Anmerkungen	Analyt Kürzel: GPT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Guanfacin°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich: 1 - 10 ng/ml
Indikationen	Drug Monitoring
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: GUAN Ansatztage: bis 2 x pro Woche
Haemophilus influenzae	
Methode	Kultur
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach Abschluss der Bebrütungszeit des jeweiligen Materials
Haemophilus influenzae Typ b-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Kurzzeitschutz 0.15 – 1.0 µg/ml Langzeitschutz (1J) > 1.0 µg/ml
Indikationen	Immunstatus
Anmerkungen	° Fremdleistung

Haloperidol	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Abnahme vor nächster Gabe
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 1 – 10 ng/ml toxisch ab 15 ng/ml
Indikationen	Neuroleptikum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HALO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden!
Hämatokrit	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut Lagerung bei Raumtemperatur
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder: alters abhängig Frauen: 0,36 - 0,48 L/L Männer: 0,36 - 0,48 L/L
Indikationen	prozentualer Volumenanteil der Erythrozyten im Blut „Blutviskosität“
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HK Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Hämochromatose Genotyp°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	V.a. Eisenüberladung erhöhte Transferrinsättigung und Ferritin Eisenablagerungen: Leber (Zirrhose), Pankreas, Haut, Herz (Kardiomyopathie), Gelenke (Arthrose)
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. (HFE-Genmutation) ° Fremdleistung
Hämoglobin	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	Photometrie
Normalwerte	Kinder altersabhängig Frauen: 12.0 - 15.6 g/dl Männer: 13.5 - 17.2 g/dl
Indikationen	Anämie, akuter Blutverlust
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HB Ansatzage: täglich Mo. - Fr.

Hämoglobin-Elektrophorese°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	Elektrophorese/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Für Kinder > 12 Monate und Erwachsene: HbA: >96% HbA2: 2,2 - 3,0% HbF: < 1,1% Atypische Hämoglobine: negativ
Indikationen	V.a. Hämoglobinopathien, Thalassämie, Sichelzellenanämie, chron. hämolytische Anämien
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hämoglobin, frei° (Plasma Hämoglobin)	
Probenmaterial	3 ml Heparin-Plasma BE hämolysefrei!
Methode	Spektralphotometrie
Normalwerte	< 3 mg/dl
Indikationen	intravasale Hämolyse akute hämolytische Anämie hämolytisch-urämisches Syndrom Transfusionszwischenfälle
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hämoglobin/Haptoglobin-Komplex°	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	immunoluminometrisch
Normalwerte	< 2 µg/g
Indikationen	Colon- und Rektum-Ca Tumormarker Krebsvorsorge: M2-PK
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hämoglobin im Stuhl	
Probenmaterial	Spezialröhrchen IFOBt - Test
Methode	ILMA (Immunoluminometric Assay)
Normalwerte	< 5,0 µg/g
Indikationen	V.a. okkulte Blutung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HAST Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Hämoglobinopathien°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR u. Direktsequenzierung der Globulin-Gene (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	Hypochrome, mikrozytäre Anämie erhöhte HbA2-/HbF-Werte unklare Befunde in der Hb-Elektrophorese
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. (β-Thalassämien, HbS, HbC, HbE u.a.) ° Fremdleistung
Hämoglobin-Verteilungsbreite	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	2,2 - 3,2 g/dl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBVB Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)	
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) siehe Mikrobiologie
Hämopexin°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RID
Normalwerte	0.5 – 1.15 g/l
Indikationen	Beurteilung des Ausmaßes einer intravasalen Hämolyse, hämolytischen Anämie
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hantaan-IgG /-IgM-Ak HTNV	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: HAGB, HAMB Ansatztage: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Vorkommen: ist im asiatischen Teil Russlands, China und auf der koreanischen Halbinsel endemisch → Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom. Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS).
Haptoglobin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	32 – 197 mg/dl
Indikationen	Akute Phase Protein, erniedrigte Werte bei hämolytischer Anämie, akut entzündliche Prozesse können einen hämolysebedingten Haptoglobinabfall maskieren.
Harnkonkrement°	
Probenmaterial	Konkrement im Röhrchen
Methode	Röntgendiffraktion
Indikationen	Steinanalyse
Anmerkungen	° Fremdleistung
Harnsäure im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	enzymatisch
Normalwerte	Frauen < 5.7 mg/dl Männer < 7.0 mg/dl
Indikationen	Gicht Verdacht auf Hyperurikämie Hämoplastosen Chemo- und Strahlentherapie Präeklampsie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HSE Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Harnsäure im Urin	
Probenmaterial	5 ml vom 24-Std.-Urin
Methode	Photometrie
Normalwerte	0.2 – 1.0 g/d nahrungsabhängig
Indikationen	V.a. renale Eliminationsstörung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HSU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Tagesmenge angeben
Harnstoff-Clearance	
Probenmaterial	1 ml Serum und 10 ml Urin vom 24-Std.-Urin
Normalwerte	> 64 ml/min
Anmerkungen	Angabe: Tagesmenge, Größe, Gewicht s.a. Glomeruläre Filtrationsrate
Harnstoff im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 50 mg/dl
Indikationen	chron. Niereninsuffizienz akutes Nierenversagen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HST Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Harnstoff im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin vom 24-Std.-Urin
Methode	Photometrie
Normalwerte	26 – 43 g/d
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HSTU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Angabe der Tagesmenge
Haut-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	siehe Autoantikörper Erfasst werden Antikörper gegen epidermale Basalmembranen sowie gegen interzelluläre Substanzen. ° Fremdleistung

HAV-PCR°

Probenmaterial	Stuhl 3ml EDTA-Blut
Methode	RT-PCR
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung Medizinisches Labor Nord Analyt Kürzel: HAVPCR Ansatztage: bei Bedarf Der Nachweis von HAV-RNA im Blut oder im Stuhl ist beweisend für eine akute Infektion. HAV-RNA ist ereits vor Serokonversion nachweisbar. Namentliche Labor-Meldepflicht gem. IfSG bei direktem und indirektem Erregernachweis! Zusätzliche Meldepflicht für den behandelnden Arzt bei akuter Virushepatitis (Verdacht, Erkrankung, Tod).

HbA1c (IFCC)	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut Stabilität bei Raumtemperatur 3 Tage
Methode	immunologisch Einheit entsprechend IFCC
Normalwerte	< 5,7% kein Diabetes (< 39 mmol/mol Hb kein Diabetes) 5,7 % - 6,4 % Verdacht auf "Prädiabetes" Nüchtern glukose oder oGTT (oraler Glucose-Toleranztest) empfohlen (39 bis 48 mmol/mol Hb verdacht auf "Prädiabetes" Nüchtern glukose oder oGTT [oraler Glucose-Toleranztest] empfohlen) ≥ 6,5 % Diabetes mellitus (≥ 48 mmol/mol Hb Diabetes mellitus)
Indikationen	Diabeteseinstellung Langzeitstoffwechselkontrolle und Therapieüberwachung bei Diabetes mellitus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HHA1C Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Angabe von HbA1c in Mol mmol/mol Hb, Einheit entsprechend IFCC Die Messung von geronnenen EDTA - Proben ist nicht möglich Stabilität bei Raumtemperatur 3 Tage
HBe Antigen	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Virusreplikation und Infektiosität, Verlaufsbeobachtung der akuten und chronischen Hepatitis B,
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBEA Ansatz tage: täglich Mo. - Fr.

HBs Antigen	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	akute oder chronische Hepatitis B-Infektionen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bestimmung der Infektiosität
HBs-Antigen in der Schwangerschaftsvorsorge	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBSM Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Neugeborene HBs-Ag-positiver Mütter müssen sofort nach der Geburt aktiv und passiv geimpft werden.
HBV-DNA PCR	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR
Indikationen	V.a. Infektion (akut oder chronisch), Ausschluss einer Virämie
Anmerkungen	kühl lagern, Angabe von Abnahmezeit mit Datum erforderlich
HBV-DNA quantitativ Viruslast	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR quantitativ (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	20 - $1,7 \times 10^8$ IU/ml
Indikationen	Therapiekontrolle, Bestimmung der Viruslast (Grad der Infektiosität)
Anmerkungen	kühl lagern, separates Röhrchen, Angabe von Abnahmezeit mit Datum erforderlich
HCV-Ak	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Hepatitis C-Infektion

HCV Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Normalwerte	negativ
Indikationen	Bestätigungstest für reaktive Ergebnisse im Suchtest
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HCVB
HCV-Genotypisierung°	
Probenmaterial	7 ml EDTA-Blut
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	Nachweisgrenze 15 IU/ml
Indikationen	Die Untersuchung differenziert die Genotypen 1-6 und deren Subtypen. Identifizierung des viralen Genotyps vor Einleitung einer antiviralen Therapie.
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: GEHC Ansatztage: bei Bedarf Die HCV-Therapie erfolgt unter Genotyp-abhängiger und z.T. Subtyp-abhängiger Medikation und Therapiedauer. Zum aktuellsten Stand siehe European Association for the Study of the Liver (EASL) und Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS).
HCV-RNA PCR qualitativ	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR
Normalwerte	Nachweisgrenze 15 IU/ml
Indikationen	Fragestellung der Infektiosität, bei Hepatitis-C-Antikörper-positiven Patienten erforderlich
Anmerkungen	separates Röhrchen, Angabe von Abnahmezeit mit Datum erforderlich

HCV-RNA PCR quantitativ	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ linearer Messbereich $15 - 6,9 \times 10^7$ IU/ml
Indikationen	Bestimmung der Viruslast, Therapiekontrolle
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. als separates Röhrchen, Einsendung am Entnahmetag, Angabe von Abnahmezeit mit Datum erforderlich
HDL-Cholesterin	
Probenmaterial	1 ml Serum, nach 12 h Nahrungskarenz
Methode	Photometrie
Normalwerte	> 40 mg/dl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HDL Ansatztage: täglich Mo. - Fr. höhere HDL-Werte entsprechen geringerem Arterioskleroserisiko Abfall durch „Lipidsenker“ sollte kontrolliert werden Beeinflussbarkeit durch Genussmittel und Pharmaka

HE4 (Ovar) Tumormarker°											
Probenmaterial	Serum GEFROREN!										
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)										
Normalwerte	0- 39 Jahre: bis 60 pmol/l 40 - 59 Jahre: bis 75 pmol/l 60 - 69 Jahre: bis 83 pmol/l ab 70 Jahren: bis 104 pmol/l										
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: HE4 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Human Epididymis Protein 4 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)</th></tr> <tr> <td>Methode:</td><td>Rechenwert</td></tr> <tr> <td>Referenzbereich:</td><td>Prämenopause < 11,4</td></tr> <tr> <td></td><td>Postmenopause < 29,9</td></tr> <tr> <td>Indikation:</td><td>Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.</td></tr> </table>	ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)		Methode:	Rechenwert	Referenzbereich:	Prämenopause < 11,4		Postmenopause < 29,9	Indikation:	Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.
ROMA-Index (Risk of Ovarian Cancer Malignancy Algorithm)											
Methode:	Rechenwert										
Referenzbereich:	Prämenopause < 11,4										
	Postmenopause < 29,9										
Indikation:	Tumormarker bei V. a. Ovarialkarzinom Für die Berechnung des ROMA-Index ist die Bestimmung von HE4 und CA125 notwendig.										
Helicobacter-13C-Atemtest°											
Probenmaterial	je zwei Atemproben: 1. Leerwerte (Blauer Deckel) 2. 30 Min. Proben (Roter Deckel)										
Methode	GC/MS										
Normalwerte	Delta-Wert negativ: C13 Harnstoff < 3 0/00 negativ: Diabet UBTC 13 Harnstoff < 1.5 0/00										
Indikationen	Diagnose und Erfolgskontrolle nach Eradikation einer Helicobacter pylori-Infektion										
Anmerkungen	Test mit 13C-Harnstoff 80 mg bitte im Labor bestellen Testanleitung s. Merkblatt ° Fremdleistung										

Helicobacter-Antigen	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Indikationen	Direktnachweis im Stuhl zur Diagnose und Therapiekontrolle (mind. 4 Wochen nach Ende der Therapie).
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. - 48 Std. Alternative zum Atemtest mit nahezu gleicher Sensitivität und Spezifität
Helicobacter-Kultur°	
Probenmaterial	Biopsie
Methode	kultureller Nachweis
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: 4 x wöchentlich Mo. - Do. Versand in speziellem Transportmedium innerhalb von 24 h siehe Mikrobiologie Nur durch die Kultur wird mit dem Erregernachweis auch eine Empfindlichkeitsprüfung von Antibiotika möglich.
Helicobacter pylori Antigennachweis im Stuhl	
Methode	Antigennachweis (ELISA [Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay]) im Stuhl
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. - 48 Std. Für eine zuverlässige H. pylori-Diagnostik mittels Antigennachweis oder Kultur sind folgende Mindestzeitintervalle einzuhalten: 2 Wochen nach Ende einer PPI- bzw. H2-Rezeptorblocker-Therapie und 4-6 Wochen nach vorausgegangener Eradikations- oder sonstiger Antibiotikatherapie. Direktnachweis zur Diagnose und insbesondere zur Therapiekontrolle (4-6 Wochen nach Therapieende). Der Test stellt eine sehr zuverlässige Alternative zum 13 C-Atemtest bei vergleichbarer Sensitivität und Spezifität dar. Bei gastrointestinalen Blutungen kann der Test falsch negativ ausfallen.

Helicobacter pylori Antikörpernachweis (ELISA) im Serum	
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Indikationen	Diese Untersuchung ist besonders sinnvoll, wenn ein 2-wöchiges Absetzen säurehemmender Medikamente medizinisch nicht möglich ist, bei glandulärer Magenschleimhautatrophie oder bei gastrointestinalen Blutungen (Stuhl-Antigennachweis, Atemtest bzw. Kultur evtl. falsch negativ).
Anmerkungen	Spezifische IgG-Antikörper sind bei Patienten mit H.pylori-Infektion praktisch immer vorhanden. Der IgG-Nachweis erreicht Sensitivitäts- und Spezifitätswerte von über 90% (vergleichbar mit Histologie, Antigennachweis, Atemtest, Urease-Schnelltest). Nur ein Teil der Patienten bildet spez. IgA. In einzelnen Fällen (<10%) kommen isolierte IgA-Antikörper ohne IgG-Antwort vor. Einschränkung: Bis zu 12-monatige Antikörperpersistenz nach Eradikationstherapie sowie unsichere Serokonversion bei Immunsuppression.
Helicobacter pylori-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 20 U/ml grenzwertig 20 – 30 U/ml positiv > 30 U/ml
Indikationen	Frühphase, aktive Phase der Infektion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HELA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Helicobacter pylori-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 35 U/ml grenzwertig 35 - 50 U/ml positiv > 50 U/ml
Indikationen	Gastritis, Duodenalulkus.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HELG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Im EIA positive Ergebnisse entstehen ggf. durch Kreuzreaktion z.B. mit Campylobacter

Helicobacter pylori Kultur und Resistenzbestimmung (Magenbiopsie)°

Probenmaterial	Kultur von H. pylori aus Magenbiopsien je 1 Probe aus Antrum und Corpus
Methode	Kultur
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: 4 x wöchentlich, Mo. - Do. Für eine zuverlässige H. pylori-Diagnostik mittels Antigennachweis oder Kultur sind folgende Mindestzeitintervalle einzuhalten: 2 Wochen nach Ende einer PPI- bzw. H2-Rezeptorblocker-Therapie und 4-6 Wochen nach vorausgegangener Eradikations- oder sonstiger Antibiotikatherapie.# Bei der Gastroskopie dürfen keine Entschäumer eingesetzt werden (bakterizide Wirkung). Da die Verteilung von Helicobacter pylori in der Magenschleimhaut inhomogen ist, sollte mind. je 1 Probe aus Antrum und Corpus gewonnen werden. Biopsien für die Mikrobiologie sind vor den Proben für die Pathologie zu entnehmen, um eine Kontamination mit Formalin zu vermeiden. Biopsien von Antrum und Corpus sind getrennt nach Entnahmeort unmittelbar nach Gewinnung in „Portagerm Pylori“-Transportmedium zu überführen. Dieses Transportmedium hat nur eine kurze Haltbarkeitsdauer (s. Aufdruck auf dem Gefäß), die keinesfalls überschritten werden darf. Die Biopsien müssen mind. 1 cm in das Medium eingedrückt werden, um Kontakt mit Sauerstoff zu vermeiden. Wegen der Komplexität der Untersuchung und der Empfindlichkeit des Erregers sollten keine Gastroskopien mit Probenentnahme am Freitag oder vor Feiertagen durchgeführt werden, da ansonsten evtl. mit falsch negativen Ergebnissen zu rechnen ist. Das Untersuchungsmaterial muss noch am Abnahmetag ins Labor gebracht werden. Der Transport des beimpften Mediums kann ungekühlt erfolgen.

Heparininduzierte Thrombozytopenie HIT II Diagnostik aus Serum°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Lateral Flow Assay
Normalwerte	negativ
Indikationen	• Suchtest für Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II (HIT Typ II) • Abklärung einer Thrombozytopenie unter Heparin-Therapie • 4T-Score: Klinische Wahrscheinlichkeit einer HIT Typ II. Vorliegende Diagnose-Kriterien (Symptome, Befunde, zeitlicher Ablauf) können in ein standardisiertes Punktesystem eingegeben werden. Durch die Anwendung dieses sog. 4T-Punktesystems (Thrombocytopenia, Thrombosis, Timing und Other Causes) können Patienten in Gruppen mit niedriger, mittlerer und hoher klinischer Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines HIT-Syndroms eingeteilt werden.
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: HIT / HITG Ansatztage: bei Bedarf Lassen sich keine PF4-Heparin-Antikörper nachweisen, ist eine HIT Typ II mit hoher Sicherheit ausgeschlossen. Bei einem schwach positiven oder grenzwertigen Antikörper-Nachweis wird die Überprüfung der Inhibition der Antikörper-Reaktion durch Heparin-Zugabe getestet (sog. Heparin-Inhibition). Eine Bestätigungsanalyse kann auch durch einen funktionellen Test durchgeführt werden, z. B. durch den HIPATest (Heparin-induzierter Plättchen-Aktivierungstest). Weiterführende Analysen: Thrombozytenzahl, HIPATest (Heparin-induzierter Plättchen-Aktivierungstest)

Hepatitis A-Ak gesamt	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ > 20 Immunitätslage ausreichend
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HAV, HAVQ Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Anti-HAV IgG/IgM-Ak bei positiven Befunden sollten HAV-IgM-Ak zum Ausschluss einer frischen Infektion bestimmt werden Antigen Nachweis im Stuhl, IgM-Ak und IgG-Ak im Serum (Meldepflicht IfSG) Das Hepatitis A-Virus ist ein RNA-Virus aus der Familie der Picornaviren. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral über Schmierinfektion durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel. Die Inkubationszeit beträgt 14-40 Tage. Symptome sind grippale oder dyspeptische Prodromi wie Oberbauchbeschwerden, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit; mit Beginn des Ikterus bessert sich meist das subjektive Befinden. Serum-Bilirubin und Aminotransferasen können stark erhöht sein. Remission innerhalb von 3 Wochen. Schwere akute Verläufe sind möglich. Während bei Kindern unter 5 Jahren 50-90 % der HAV-Fälle asymptomatisch oder mit Symptomen, die einem grippalen Infekt ähneln, verlaufen, ist die Häufigkeit und Schwere der Erkrankung bei Erwachsenen erheblich größer. Selten manifestiert sich eine fulminante Hepatitis mit letalem Ausgang. In der Regel keine Spätschäden. Lebenslange Immunität (Nachweis von Anti-HAV-IgG im Serum).
Hepatitis A-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Diagnose einer frischen Hepatitis A;
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AHM Ansatztage: täglich Mo. - Fr. während der Inkubationszeit können IgM-Ak noch negativ sein
Hepatitis A-Virus-Antigen°	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	direkter Nachweis der Infektiosität, nachweisbar: 2-6 Wochen nach Infektion °Fremdleistung

Hepatitis B Diagnostik

Anmerkungen

(Meldepflicht IfSG) Das Hepatitis B-Virus ist ein DNA-Virus aus der Familie der Hepadnaviren. Die Übertragung erfolgt parenteral durch Blutkontakt (z.B. Nadelstichverletzung, Drogenabhängige), sexuellen Kontakt, perinatal. Hauptrisiken im medizinischen Bereich sind nosokomiale Infektionen (z.B. Dialyse, OPs, Transfusionen, Injektionen, invasive Diagnostik). In der Gravidität ist die Frühgeburtsrate erhöht, Fetopathien sind selten. Die Inkubationszeit beträgt 40-180 Tage. Das klinische Bild ist im Einzelfall nicht von anderen Virushepatitiden abzugrenzen. Durch Leberzellenschädigung kommt es zum raschen Anstieg der Aminotransferasen und zum Ikterus. Meist akuter Verlauf mit Ausheilung. In ca. 10% der Fälle entwickelt sich eine chronisch-aktive bzw. chronisch-persistierende Hepatitis-B-Infektion. Spätfolge kann eine Leberzirrhose oder auch Leber-Ca sein. Bei überschießender Immunantwort mit Nekrose großer Leberzellareale (fulminanter Verlauf) resultiert das oft letal endende Leberzerfallskoma. Bei 5 - 10% der erwachsenen Erkrankten und bei etwa 90% der Neugeborenen kann das Virus nicht eliminiert werden. Es entstehen entweder klinisch unauffällige HBsAg-Träger oder eine chronische Hepatitis B-Infektion. Impfung Totimpfstoff (rekombinantes HBsAg), Kombinationsimpfstoff (Hep.-A und Hep.-B) möglich. Bei Neugeborenen HBsAg-positiver Mütter muss eine Impfung erfolgen. Immunität: Monate bis Jahre, je nach Anti-HBs-Titer. **Diagnostik HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc-Ak, Anti-HBc-IgM, HBe-Ag und Anti-HBe, Anti-HBs-quantitativ (Titer nach Impfung), HBV-PCR**

Hepatitis C (HCV)

Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Das Hepatitis C-Virus ist ein RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren. Es werden 6 Genotypen mit unterschiedlicher Therapieansprechrate unterschieden. Weltweite Verbreitung. Die Übertragung erfolgt parenteral (Transfusion von kontaminiertem Blut, i.v. Drogenabhängigkeit, Hämodialyse, Transplantation); der sexuelle Infektionsweg ist dagegen eher selten. Bei Gravidität ist eine vertikale Übertragung von der Mutter auf das Kind möglich. Die Inkubationszeit beträgt 3 Wochen bis 3 Monate Die akute Hepatitis C-Infektion verläuft meist inapparent oder mit milden Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchbeschwerden. Anikterische und asymptomatische Verlaufsformen sind häufiger als bei anderen Virushepatitiden. Fluktuierende Erhöhung der Aminotransferasen, insbesondere der GPT (ALAT). Die klinisch chronisch aktive Hepatitis C-Infektion führt oft zu einer Leberzirrhose, auf deren Boden sich ein primäres Leberzellkarzinom entwickeln kann. Die Häufigkeit von HCV in der Normalbevölkerung liegt in Deutschland bei bis zu 0.3 %, weltweit ca. 3 %. Bei i.v.- Drogenabhängigen bei 50-70 %, bei Hämophilen bei 60-90 % und bei Patienten mit einer chronischen Hepatitis bei ca. 90 %.
-------------	---

Hepatitis Delta Ag°

Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hepatitis Delta-Ak°

Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hepatitis Delta (HDV)°	
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Das Hepatitis D-Virus ist ein defektes Einzelstrang-RNA-Virus, das keine eigene Hülle besitzt. Eine HDV-Infektion kann daher nur bei gleichzeitiger akuter Hepatitis B-Infektion oder bei einem chronischen HBsAg-Träger auftreten. Ist HBs-Antigen negativ, dann liegt keine Delta-Virus-Infektion vor. Bei der Infektion mit HBV und HDV ist der Krankheitsverlauf ähnlich einer akuten Hepatitis B-Infektion. Meist folgt jedoch die HDV-Infektion der Hepatitis B mit einem zweigipfligen Transaminasenanstieg. Koinfektion: simultane Infektion mit HBV (HBsAg) und HD-Virus Superinfektion: Infektion mit HDV bei bestehender Hepatitis B (dabei sind keine HDV-IgM-Ak nachweisbar) ° Fremdleistung
Hepatitis Delta-IgM-Ak°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hepatitis Delta-PCR°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril) als separates Röhrchen
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Therapiekontrolle, Ausschluss einer Virämie
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hepatitis D-Virus-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	nicht nachweisbar
Indikationen	V.a. Super- oder Co-Infektion bei nachgewiesener Hepatitis B; nur sinnvoll bei nachgewiesener Hepatitis B-Infektion
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: HDDAK Ansatz tage: Mo., Di., Fr.

Hepatitis E (HEV)	
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Das Hepatitis E-Virus ist ein nicht umhülltes RNA-Virus aus der Familie der Caliciviren. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral, häufig über verunreinigtes Wasser und Speisen. Natürliches Reservoir bei Tieren, z. B. Schweine, Wild, Hunde. Endemiegebiete: Südostasien, Zentralafrika, Indien sowie Mittelamerika. In Deutschland auftretende Fälle sind meist Genotyp 3 (Genuss von unzureichend gegartem Fleisch, z. B. Schwein und Wild). Es sind insgesamt 4 humanpathogene Genotypen bekannt. Die Inkubationszeit liegt bei 20-45 Tagen. Die klinische Symptomatik gleicht in der Regel der einer Hepatitis A-Infektion. Subklinische Verläufe insbesondere bei Kindern. Therapie mit Ribaverin. Die Erkrankung ist selbstlimitierend. Fulminante Hepatitisverläufe mit stark eingeschränkter Leberfunktion kommen vor (ca. 3 % der Erkrankten). Die Letalität liegt zwischen 0.5 und 3 %; Ausnahme: bei Schwangeren bis zu 20 %.
Hepatitis E-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Hepatitis E-Infektion
Hepatitis E-IgG-Ak-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: HEPEGB Ansatztage: nach positivem ELISA
Hepatitis E-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ <20 U/ml grenzwertig 20-24 U/ml positiv >24 U/ml
Indikationen	V.a. akute Hepatitis E-Infektion
Hepatitis E-IgM-Ak-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	Bestätigung für positive Ergebnisse im Suchtest Analyt Kürzel: HEPEMB Ansatztage: nach positivem ELISA

Hepatitis E-PCR°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril) 1 g Stuhl
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Therapiekontrolle, Ausschluss einer Virämie
Anmerkungen	° Fremdleistung separates Röhrchen kühl lagern Angabe von Abnahmezeit mit Datum erforderlich
Hepcidin°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	1,67 - 49,37 ng/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung
Heroin	
Probenmaterial	50 ml Urin 5 ml Serum
Indikationen	Drogenanalytik V.a. Drogenmissbrauch
Herpes simplex Ak im Liquor	
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Anmerkungen	siehe Liquordiagnostik
Herpes simplex-Virus-PCR°	
Probenmaterial	Liquor und EDTA-Blut als separates Röhrchen Abstrich, Bläschenflüssigkeit und Bläschengrund
Indikationen	V.a. Herpesenzephalitis V.a. Herpes labialis/genitalis
Anmerkungen	° Fremdleistung
Herzmuskel-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	negativ
Indikationen	Postmyokardinfarktsyndrom (Dressler Syndrom) Perimyokarditis nach viralen oder bakteriellen Infektionen primäre Kardiomyopathie
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hippursäure°	
Probenmaterial	20 ml Urin
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 1.5 g/l
Indikationen	V.a. Intoxikation bei Toluolexposition: Probenabnahme nach Expositionsende
Anmerkungen	Hippursäure ist Metabolit von Toluol ° Fremdleistung
Histamin im Plasma°	
Probenmaterial	Heparin-Plasma
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	< 6.0 µg/l
Indikationen	Mastozytose, allergische Reaktion vom Typ I s.a. Tryptase
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: HIST Ansatztage: Mi., Fr. Testdauer: 24 Std. Diagnostisch sinnvoll ist auch die Bestimmung der Histamin-Metaboliten (Methylhistamin und 1,4-Methylimidazolessigsäure i. Urin.
Histamin im Stuhl°	
Probenmaterial	Stuhl
Normalwerte	< 950 ng/g
Anmerkungen	° Fremdleistung
Histamin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin aus 24-Std-Menge gesammelt über 10 ml Eisessig
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	10 – 73 µg/l Krea
Anmerkungen	° Fremdleistung
Histamin im Vollblut°	
Probenmaterial	5 ml Heparinblut
Normalwerte	20 – 100 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Histidin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	67 - 109 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Histone Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	medikamenteninduzierter LE, SLE
HIV- Ag/Ak (HIV-1/2-Ak + p24-Ag)	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HIV Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Suchtest auf Antigen und Antikörper Ein negatives Ergebnis im Suchtest schließt eine Infektion mit hoher Sicherheit aus, wenn die letzte potentielle Exposition mind. 6 Wochen zurück liegt. Bei frischen HIV-Infektionen oder Immunglobulinmangel kann der Test negativ ausfallen.
HIV I Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Indikationen	Bestätigungstest für reaktive Ergebnisse im Suchtest
HIV II Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Indikationen	Abklärung einer HIV-2-Infektion bei entsprechender Anamnese
HIV I RNA-PCR°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril) max. 6 h alt oder EDTA-Plasma GEFROREN!
Normalwerte	quantitativ negativ Nachweisgrenze 13 Kopien/ml
Indikationen	V.a. HIV-Infektion bei Neugeborenen von HIV-positiven Müttern Virämiemarker: Therapie und Verlaufskontrolle bei HIV-Infektion
Anmerkungen	Abnahmezeit angeben! früheste Nachweismöglichkeit (ca. 11 Tage nach Exposition) bzw. Bestätigung einer Infektion durch 2. Methode Ausschluss einer HIV-Infektion bei serologischunklaren Fällen Linearer Messbereich: 30 - 10 000 000 Kopien/ml ° Fremdleistung

HLA-Antigene	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR-SSP
Normalwerte	negativ
Indikationen	Individuelle Bewertung bestimmter Krankheiten, Transplantationen
Anmerkungen	Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen.
HLA B27	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR
Normalwerte	negativ
Indikationen	HLA-B27 ist u. a. mit folgenden Krankheiten assoziiert: • Ankylosierende Spondylarthritis (M. Bechterew) • Reiter-Syndrom • Akute Iridozyklitis • Reaktive Arthritis • Juvenile chronische Polyarthritis.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: B27COB Ansatztage: täglich Mo. - Fr. separates Röhrchen Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) positiv bei: PCR Yersinia Arthritis ca. 18-fach 6 – 8 % der Bevölkerung positiv bei: ca. 95 % bei M. Bechterew Erkrankungsrisiko erhöht für HLA B27-Träger bei: Yersinia Arthritis ca. 18-fach, Morbus Bechterew 90-fach, Morbus Reiter 36-fach, akuter Uveitis 9-fach

HLA-B27-Genmutation°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR
Normalwerte	negativ
Indikationen	Humanes Leukozyten-Antigensystem M. Bechterew
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. ° Fremdleistung
HLA-DQ-Antigene°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR-SSP
Normalwerte	negativ
Indikationen	Individuelle Bewertung bestimmter Krankheiten, Transplantationen
Anmerkungen	Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen.
HLA-DR-Antigene°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR-SSP
Normalwerte	negativ
Indikationen	Individuelle Bewertung bestimmter Krankheiten, Transplantationen
Anmerkungen	Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. ° Fremdleistung

HLA Klasse I Iso-Ak°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	PCR-SSP
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	SSP: Sequenz-Spezif-Primer HLA-Klasse I Alloantikörper im Rahmen der Transplantationsvorbereitung, des Post-Transplantationsmonitoring und bei febrilen nicht hämolytischen Transfusionsreaktionen °Fremdleistung
HLA-Typisierung°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR-SSP (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Individuelle Bewertung bestimmter Krankheiten, Transplantationen
Anmerkungen	° Fremdleistung Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen.
HMG-CoA-Ruduktase-AK°	
Probenmaterial	Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. Statin-assoziierte nekrotisierende autoimmune Myopathie (NAM)
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: HMG Ansatztage: 2 x je Woche Präanalytik: Stabilität 14 Tage bei 2 - 8 °C

Holotranscobalamin											
Probenmaterial	2 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	38.0-188.0 pmol/l METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	frühester Marker eines Vitamin B12-Mangels										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HTC Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lagerung:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> <tr> <td>2-8°C</td><td>14 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>5 Tage</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8°C	14 Tage	Raum Temperatur	5 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8°C	14 Tage										
Raum Temperatur	5 Tage										
Holzschutzmittel°											
Probenmaterial	Spezialröhrchen Holzschutzmittel anfordern										
Methode	GC/MS (Gaschromatographie/Massenspektrometrie)										
Anmerkungen	α-, β -Endosulfan α -Hexachlorcyclohexan β-Hexachlorcyclohexan Lindan (γ -HCH): β-HCH Erhöhung weist auf ernährungsbedingte Belastung hin γ -Hexachlorcyclohexan Dichlordiphenyltrichlorethan: DDT-Gruppe (DDT/DDP) Furmecyclo x (Xyligen B) Pentachlorphenol i. Serum (PCP) ° Fremdleistung										

Homocystein																	
Probenmaterial	Homocysteinröhrchen mit Stabilisator im Labor anfordern																
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)																
Normalwerte	bis 15.1 µmol/l Zielwert 10 µmol/l																
Indikationen	unabhängiger Risikofaktor für Herz- Kreislauferkrankungen (Atherosklerose)																
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HOCY Ansatztage: täglich Mo. - Fr. bei Erhöhung > 18 mmol/l erhöhtes Thromboserisiko, Mangel an Vitamin B12, -B6 Folsäure abklären. Bei ausgeprägter Erhöhung des Homocysteinspiegels kann ggf. eine molekulargenetische Untersuchung auf Punktmutationen im Methylen-Tetra-Hydro-Folat-Reduktase-(MTHFR)-Gen angeschlossen werden.																
Homovanillinsäure HVS im Urin°																	
Probenmaterial	1 mL Urin aus 24-Std-Menge, gesammelt über 5-10 mL Eisessig.																
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)																
Normalwerte	<table border="1"> <tr> <td>Säuglinge</td><td>< 1,5 mg/d</td></tr> <tr> <td>oder</td><td>< 28 mg/g Krea.</td></tr> <tr> <td>Kleinkinder</td><td>< 4,8 mg/d</td></tr> <tr> <td>oder</td><td>< 22 mg/g Krea.</td></tr> <tr> <td>Schulkinder</td><td>< 8,8 mg/d</td></tr> <tr> <td>oder</td><td>< 12,7 mg/g Krea.</td></tr> <tr> <td>Erwachsene</td><td>< 10 mg/d</td></tr> <tr> <td>oder</td><td>< 7,6 mg/g Krea.</td></tr> </table>	Säuglinge	< 1,5 mg/d	oder	< 28 mg/g Krea.	Kleinkinder	< 4,8 mg/d	oder	< 22 mg/g Krea.	Schulkinder	< 8,8 mg/d	oder	< 12,7 mg/g Krea.	Erwachsene	< 10 mg/d	oder	< 7,6 mg/g Krea.
Säuglinge	< 1,5 mg/d																
oder	< 28 mg/g Krea.																
Kleinkinder	< 4,8 mg/d																
oder	< 22 mg/g Krea.																
Schulkinder	< 8,8 mg/d																
oder	< 12,7 mg/g Krea.																
Erwachsene	< 10 mg/d																
oder	< 7,6 mg/g Krea.																
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: HVSM/HVSLM Ansatztage: 1x Woche Aus 24-Std-Menge, gesammelt über 5-10 mL Eisessig. Bei Spontanurinproben werden die Meßwerte auf Kreatinin bezogen.																
HSV-1/2-IgG-Ak																	
Probenmaterial	1 ml Serum																
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)																
Normalwerte	negativ: < 20 U/ml grenzwertig: 20-30 U/ml positiv: >30 U/ml																
Indikationen	V.a. Herpes labialis/genitalis																
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HSG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf																

HSV-1/2-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ: < 20 IU/ml grenzwertig: 20-30 IU/ml positiv: >30 IU/ml
Indikationen	IgM-Ak meist nur bei Primärinfektion nachweisbar
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HSM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
HSV-1-AI (IgG)°	
Probenmaterial	Liquor, für Index- Bestimmung mit taggleichem Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	normal: 0.7 - 1.3 positiv: > 1.5
Anmerkungen	° Fremdleistung
HSV-1-AI (IgM)°	
Probenmaterial	Liquor, für Index- Bestimmung mit taggleichem Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	normal: 0.7 - 1.3 positiv: > 1.5
Anmerkungen	° Fremdleistung
HSV-1-IgG Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Bestätigungstest und Differenzierung HSV Typ 1/Typ 2 Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest
HSV-1-IgM Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Bestätigungstest und Differenzierung HSV Typ 1/Typ 2 Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest
HSV-2-IgG Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Bestätigungstest und Differenzierung HSV Typ 1/Typ 2 Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest

HSV-2-IgM Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Bestätigungstest und Differenzierung HSV Typ 1/Typ 2 Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest
Hu-ANNA Typ 1 Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT
Normalwerte	< 1: 1000
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hu-Antikörper im Liquor°	
Probenmaterial	Liquor
Normalwerte	< 1 : 1000
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hu-D im Serum Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT
Normalwerte	< 1 : 1000
Anmerkungen	° Fremdleistung

Humanes Papillomvirus-DNA (HPV-PCR)° STI (sexuell übertragbare Infektionen)	
Probenmaterial	cobas PCR Media-Abstrichset <i>Hinweis Frauen:</i> Der dickere Tupfer dient lediglich dazu den Schleim im Zervixbereich vor der Probennahme zu entfernen. Probennahme: Dünnes Abstrichbürstchen in den Zervixkanal einführen und unter sanftem Druck 5x im Uhrzeigersinn drehen. Abstrichbesteck möglichst nicht nach der 10. SSW anwenden! <i>Hinweis Männer:</i> KEINE GKV-Leistung (IGeL) Sind keine sichtbaren Läsionen vorhanden, mit dem dünnen Bürstchen mehrfach folgende Regionen abstreichen: Glans, Corona, Sulcus coronarius, Präputium und Penis-schaft Abstrichentnahme nicht zu "zaghaft" durchführen, um genügend Zellmaterial zu gewinnen. Harnröhrenabstriche sind zur Diagnostik ungeeignet! <i>Hinweis nach Probennahme</i> Bürstchen in cobas Medium überführen und dort belassen! Bei Vorhandensein von Läsion/Condylom/Warze Biopsat in steriles Schraubverschlussröhrchen mit 0,9%iger NaCl-Lsg.; alternativ kräftiger Abstrich von Läsion/Warze (aber deutlich weniger sensitiv). Lagerung bis zum Transport: 2-8°C
Methode	1) HPV High Risk (PCR) Erfasst HPV-Typen 16, 18, andere (andere umfasst die Typen 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 und 68 als Gruppentest) 2) HPV Low Risk (PCR)
Indikationen	Kurative Leistung (EBM 19328) bei auffälliger Zervixzytologie, Kontrolle eines positiven HPV-Nachweises, Z. n. Zervix-OP Früherkennung ("Screening") von Gebärmutterhalskrebs im Rahmen des organisierten Krebsfrüherkennungsprogramms ab 35 Jahren (EBM 01763) bzw. Abklärung eines positiven Screenings (EBM 01767)
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: Bei Bedarf Analyt Kürzel: HPV High Risk: 6117 HPVHR (IGeL); 5182 HPVDNA (Privat) 20768 HRHPVP (Frauen EBM kurativ)

Humanes Papillomvirus-DNA (HPV-PCR)° STI (sexuell übertragbare Infektionen)	
	29723 HPVSZK (Frauen EBM präventiv) HPV Low Risk: 6116 HPVLR
Hyaluronidase-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	enzymatisch
Normalwerte	< 300 U/ml
Indikationen	Antistreptokokken-Hyaluronidase rheumatische Erkrankungen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hyaluronsäure°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 56 ng/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hydroxybupropion im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN! keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Bupropion und Hydroxybupropion Als Antidepressivum: Therapeutischer Bereich: 850 - 1500 ng/ml kritisch ab: 2000 ng/ml Als Entzugstherapeutikum: Therapeutischer Bereich: 550 - 1500 ng/ml kritisch ab: 2000 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HYBUPR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Halbwertszeiten: 17-47 h (Hydroxybupropion) Aufgrund der geringen Stabilität von Bupropion (etwa 7 h bei 2-8 °C), bitten wir Sie als Material für die Analyse tiefgefrorenes Serum einzusenden. Durch diese präanalytische Maßnahme kann falsch niedrigen Messergebnissen vorgebeugt werden.
Hydroxylysin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 23 Monate: < 7 µmol/l 2 - 17 Jahre: < 3 µmol/l Erwachsene: 0 - 2 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Hydroxyprolin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	0 - 33 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Hyperparathyreoidismus	
Methode	Parathormon intakt
Hyperthyreose	
Methode	TSH, FT3, FT4
Hypochrome Erythrozyten	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Mikroskopie der Ausstriche
Normalwerte	< 5 %
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ERYH Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Eisenstoffwechsel, EPO-Therapie, Erythropoese der letzten 80 Tage
Ibuprofen im Serum	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	5 - 50 µg/ml
IgA im Liquor	
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	< 0.6 mg/dl
Indikationen	DD: Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGAL Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
IgA im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 0,70 - 5,0 g/l
Indikationen	Antikörpermangelsyndrom, Infektionen, maligne Zellproliferation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage

IgA im Stuhl°	
Probenmaterial	2 g Stuhl
Methode	RID
Normalwerte	6 – 70 mg/dl
Anmerkungen	° Fremdleistung
IgA-Nephropathie	
Probenmaterial	1 ml Serum
IgA sekretorisch°	
Probenmaterial	1 ml Speichel 1 ml Tränenflüssigkeit 1 ml Nasensekret 1 ml Duodenalsaft
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	510 - 2040 µg/ml
Indikationen	Diarrhoe, chronische Enteropathie glutensensitive Malabsorptionssyndrome Rekurrende Infektionen (z. B. Respirationstrakt)
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: IGASS
IgD im Serum°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 132 mg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
IGFBP-3 Insulin-Like-Growth-Factor-Binding-Protein-3	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	altersabhängige Normwerte s. Befund
Indikationen	Verlaufskontrolle bei Therapie mit Wachstumshormon, Kombination mit Somatomedin C (IGF-1), HGH
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGBP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
IgG4/IgG Quotient im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	Berechnung
Normalwerte	< 8 %

IgG-Antikörper gegen CCP	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 7 U/ml grenzwertig 7 – 10 U/ml
Indikationen	hochspezifischer Marker für die Differentialdiagnose der rheumatoiden Arthritis, Frühmarker für rheumatoide Arthritis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CCPAKS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
IgG im Liquor	
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	< 4,0 mg/dl
Indikationen	Antikörpermangelsyndrom, Infektionen, maligne Zellproliferation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGGL Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
IgG im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 7,0 - 16,0 g/l
Indikationen	Antikörpermangelsyndrom, Infektionen, maligne Zellproliferation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage

IgG im Urin	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Sammelurin oder 2. Morgenurin
Methode	Turbidimetrie Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	< 10 mg/l
Indikationen	Bestimmung des Selektivitätsindex der glomerulären Filtration, zur Feststellung von Abstoßungsreaktionen bei Transplantationspatienten Leitprotein IgG im Urin - nicht selektiv glomeruläre Proteinurie - hochmolekulare Proteine (über 100 000 Dalton) tauchen nur bei fortgeschrittener Schädigung der Basalmembran mit Verlust der Molekularsiebfunktion im Harn auf.
Anmerkungen	Lagerung nicht empfohlen. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
IgG im Urin / die	
Probenmaterial	24 h - Sammelurin
Methode	Turbidimetrie, Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	< 8,5 mg/d
Anmerkungen	Lagerung nicht empfohlen. Analyt Kürzel: IGGD Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
IGG im Urin / Liter	
Probenmaterial	Urin
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 10 mg/l
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGGU Ansatz tage: täglich Mo. - Fr.
IgM im Liquor	
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	< 0.1 mg/dl
Indikationen	DD: Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGML Ansatz tage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage

IgM im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Frauen: 0,40 - 2,3 g/l Männer: 0,40 - 2,3 g/l
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IGM Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
Imipramin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Bereich 175 - 300 ng/ml Kritisch ab: 300 ng/ml
Indikationen	Trizyklische Antidepressiva, Antidepressivum z.B. Tofranil®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IMIP Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 11 - 25 Std.
Immunfixationselektrophorese	
Probenmaterial	1 ml Serum oder 10 ml Urin
Methode	Immunfixationselektrophorese
Indikationen	V.a. monoklonale Gammopathie: Nachweis eines monoklonalen Immunglobulins und/oder monoklonaler freier Leichtketten
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IMF/IMFU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. s.a. Leichtketten, freie Bence-Jones-Proteine(Urin) Kontraindikation: hämolytisches Serum

Immunglobuline im Liquor	
Probenmaterial	2 ml Liquor
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	IgA < 0.6 mg/dl IgG < 4.0 mg/dl IgM < 0.1 mg/dl
Indikationen	V.a. intrathekale Ak-Synthese Reiber-Diagramm; zur Berechnung erregerspezifischer Antikörperindizes ist ein zeitgleich abgenommenes Liquor-Serum Paar notwendig
Immunglobuline im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	IgA 70 – 500 mg/dl IgG 700 – 1600 mg/dl IgM 19 – 200 mg/dl IgD° < 130 U/ml Säuglinge und Kinder: Normalwerte siehe Befund
Indikationen	V.a. monoklonale Gammopathie Antikörpermangelsyndrom, Entzündungs- und Infektionserkrankungen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Immunglobulin IgG-Subklassen, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	altersabhängige Normwerte s. Befund
Indikationen	V.a. Antikörpermangel-Syndrom, insbesondere bei Infektanfälligkeit (rezidivierende bakt. Infekte) fehlende Immunantwort nach Impfungen
Immunkomplexe, zirkulierende°	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN!
Methode	RID nach PEG-Fällung
Normalwerte	14 µg/m
Indikationen	Autoimmunprozesse Rheumatische Erkrankungen chronische Infektionen; Neoplasmen
Anmerkungen	° Fremdleistung

Immunkomplex-Glomerulonephritis	
Probenmaterial	1 ml Serum
Immunkomplex-Vaskulitis	
Probenmaterial	1 ml Serum
Immunthrombozytopenie (M. Werlhof)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Infliximab°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA
Normalwerte	siehe Befund, Dimension: µg/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: INFL Ansatztage: Di.

Infliximab Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA
Normalwerte	< 9,0 RU/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: INFLA Ansatztage: Di. Bei Patienten, die > 5 mg/Tag Biotin einnehmen, sollte die Probeentnahme frühestens 24 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. Die Wirksamkeit der Infliximab-Therapie ist u. A. von der Entwicklung Anti-Drug-Antikörpern (ADA) abhängig. Bei ausbleibendem oder unzureichendem Therapieansprechen sollte der Nachweis bzw. die Konzentrationen von ADA, im Zusammenhang mit den entsprechenden Infliximab-Talspiegeln interpretiert und folgendermaßen für die therapeutischen Entscheidungen in Betracht gezogen werden: Infliximab-Talspiegel im therapeutischen Bereich ohne Nachweis von ADA: Dosisintensivierung auf individualisierter Basis oder Therapiewechsel zu einer anderen Medikamentengruppe. Infliximab-Talspiegel unterhalb des therapeutischen Bereiches mit Nachweis von ADA: Dosisintensivierung/ Anpassung des Therapieintervalls und Einführung eines Immunmodulators (bei ADA < 9 RU/ml) oder Therapiewechsel in der gleichen bzw. zu einer anderen Medikamentengruppe (bei ADA ≥ 9 RU/ml) Ref.: Papamichael K & Chieftetz AS. Curr Opin Gastroenterol. 2019;35:302., Nice R et al. Aliment Pharmacol Ther. 2021;53:128. Unsere ADA-Methode erfasst sowohl freie als auch Medikament-gebundene ADAs. Bei Patienten, die > 5 mg/Tag Biotin einnehmen, sollte die Probeentnahme frühestens 24 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. Infliximab Konzentrationen ≥10 µg/ml können zu falsch niedrigen Ergebnissen führen.

Influenza A-B-Virus-RT-PCR

Probenmaterial	Abstrich (Nasopharyngeal, Nase/Rachen) mittels cobas PCR Media Abstrichset CAVE: Nur einen der beiden mitgelieferten Abstrichtupfer verwenden und im Medium belassen!
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. akute Influenzainfektion
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. Virale Erkrankung der Atemwege. Im Winter treten gehäuft Infektionen mit Influenza A und B Viren auf. Etwa alle 10 - 30 Jahre können durch Antigenshift Epidemien bzw. Pandemien unterschiedlicher Intensität und Dauer auftreten. Risikofaktoren für schweren Krankheitsverlauf sind chronische Herz- und Lungenerkrankungen sowie Alter über 60 Jahre. Jährliche Impfung im Herbst mit dem jeweils aktuellen Impfstoff wird empfohlen. Im akuten Krankheitsstadium hohes Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Pneumonie, selten Meningoenzephalitis. Übertragung durch Tröpfcheninfektion. Inkubationszeit 2-3 Tage. Bei V.a. frische Infektion ist der direkte Erregernachweis aus Rachen oder Nasenabstrich sinnvoll.

Influenza A-IgA-Ak

Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Kinder negativ: < 6 U/ml Kinder grenzwertig: 6 - 9 U/ml Kinder positiv: > 9 U/ml Erwachsene negativ: < 10 U/ml Erwachsene grenzwertig: 10 - 15 U/ml Erwachsene positiv: > 15 U/ml
Indikationen	hohes Fieber, Myalgie, Arthralgie, Husten, Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INFA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Bei Verdacht auf akute Infektion nur Direktnachweis (PCR) empfohlen

Influenza A-IgG-Ak	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Kinder negativ: < 4 U/ml Kinder grenzwertig: 4 - 7 U/ml Kinder positiv: > 7 U/ml Erwachsene negativ: < 10 U/ml Erwachsene grenzwertig: 10 - 15 U/ml Erwachsene positiv: > 15 U/ml
Indikationen	hohes Fieber, Myalgie, Arthralgie, Husten, Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INFG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Bei Verdacht auf akute Infektion nur Direktnachweis (PCR) empfohlen
Influenza B-IgA-Ak	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Kinder negativ: < 4 U/ml Kinder grenzwertig: 4 - 7 U/ml Kinder positiv: > 7 U/ml Erwachsene negativ: < 10 U/ml Erwachsene grenzwertig: 10 - 15 U/ml Erwachsene positiv: > 15 U/ml
Indikationen	hohes Fieber, Myalgie, Arthralgie, Husten, Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INBA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Bei Verdacht auf akute Infektion nur Direktnachweis (PCR) empfohlen

Influenza B-IgG-Ak	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	Kinder negativ: < 4 U/ml Kinder grenzwertig: 4 - 7 U/ml Kinder positiv: > 7 U/ml Erwachsene negativ: < 10 U/ml Erwachsene grenzwertig: 10 - 15 U/ml Erwachsene positiv: > 15 U/ml
Indikationen	hohes Fieber, Myalgie, Arthralgie, Husten, Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INBG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Bei Verdacht auf akute Infektion nur Direktnachweis (PCR) empfohlen
Influenza-Serologie	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Indikationen	hohes Fieber Myalgie Arthralgie Husten Pneumonie
Anmerkungen	Antikörper werden ab der 2. Krankheitswoche nachweisbar.
Inhalationsscreen SX1 (Phadiatop)	
Probenmaterial	1 bis 5 ml Serum
Anmerkungen	falls IgE positiv und SX1 und fx5 negativ: Abklärung mit Allergenmischungen bzw. Einzelallergenen nach Anamnese

INR	
Probenmaterial	4 ml Citratplasma
Methode	Koagulometrisch
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Angabe der Abnahmezeit erforderlich Bei Antikoagulation (orientierende Werte, Auswahl): 2.0 – 3.0 (Sekundärprophylaxe nach tiefer Venenthrombose/Lungenembolie; Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern) Bei Antikoagulation (orientierende Werte, Auswahl): 2.5 – 3.5 (mehr als eine mechanische Herzklappe; mechanische Herzklappe plus weitere Thromboembolie - Risikofaktoren) Gerinnungsuntersuchungen Die Referenzbereiche gelten für Erwachsene. Die Referenzbereiche für Kinder können altersabhängig abweichen.
Inselzell-Ak°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	negativ < 1:10 Titer-E
Indikationen	Typ I-Diabetes mellitus
Anmerkungen	° Fremdleistung Inselzellantigen 2 IA2

Insulin											
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN! hämolysefrei nach Gerinnung sofort abseren										
Methode	CLIA (Chemolumineszenz-Immunoassay)										
Normalwerte	Nabelschnurblut: <10 µU/ml 2-12 Jahre: <10 µU/ml >12 Jahre und Erwachsene: 2.6 - 25 µU/ml (nach mindestens 8-stündigem Fasten) Bei V.a. Insulinresistenz wird die Bestimmung des HOMA-Indexes empfohlen.										
Indikationen	V.a. Insulinom V.a. Hypoglycaemia factitia Abklärung hypoglykämischer Ereignisse im Stimulationstest z.B. Tolbutamidtest oder nach Provokation im Hungerversuch										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: INS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. siehe auch Blutglucosewerte, C-Peptid <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lagerung:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> <tr> <td>2-8 °C</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>4 Stunden</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8 °C	2 Tage	Raum Temperatur	4 Stunden
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8 °C	2 Tage										
Raum Temperatur	4 Stunden										
Insulin-Autoantikörper (IAA)°											
Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	RIA (Radioimmunoassay)										
Normalwerte	< 0.40 U/ml										
Indikationen	V.a. Typ I-Diabetes; V.a. Insulinresistenz durch Antikörper gegen humanes Insulin										
Anmerkungen	° Fremdleistung Weiterführende Analysen: IA2-Ak; GAD-Ak; HbA1c										

Insulin Resistenz HOMA-Index	
Probenmaterial	Serum GEFROREN! für Nüchtern-Insulin NaF-Blut für Nüchtern-Glukose
Normalwerte	< 1,0
Anmerkungen	> 2,0 Hinweis auf Insulinresistenz > 2,5 Insulinresistenz sehr wahrscheinlich > 5,0 Durchschnittswert bei Typ 2-Diabetikern Bestimmung aus Nüchtern-Glukose und Nüchtern-Insulin nach 12-stündiger Nahrungskarenz
Interleukin-1- Beta β°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	LIA (Lumineszenz-Immuno-Assay)
Normalwerte	< 5,0 pg/ml
Indikationen	Monitoring: Knochenerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, Tumore, Immunerkrankungen, AIDS Staging
Anmerkungen	° Fremdleistung
Interleukin-1- α°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	LIA (Lumineszenz-Immuno-Assay)
Normalwerte	< 3,9 pg/ml
Indikationen	Monitoring: Knochenerkrankungen entzündliche Erkrankungen, Tumore, Immunerkrankungen, AIDS Staging, Lymphome, Leukämie, Inflammationsmarker bei Sepsis SIRS
Anmerkungen	° Fremdleistung
Interleukin-2°	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN!
Methode	CBA (Cytometric Bead Array)
Normalwerte	< 5,0 pg/ml
Indikationen	Erhöhte Interleukin-2-Spiegel weisen auf eine gesteigerte Stimulation der T-Zellen hin.
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: INT2 Ansatztage: täglich Di., Fr. Vollblut nach der Entnahme gerinnen lassen, zentrifugieren, überstehendes Serum in neues Röhrchen überführen, dieses Röhrchen beschriften, einfrieren und gefroren versenden. Bitte Probe nicht auftauen; kein hämolytisches oder ungefrorenes Serum einsenden.

Interleukin-6°	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	LIA (Lumineszenz-Immuno-Assay)
Normalwerte	< 5.4 pg/ml
Indikationen	Monitoring: Knochenerkrankungen entzündliche Erkrankungen, Tumore, Immunerkrankungen, AIDS Staging, Lymphome, Leukämie, Inflammationsmarker bei Sepsis SIRS
Anmerkungen	° Fremdleistung
Intrinsic-Faktor Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 7 grenzwertig 7 - 10 positiv > 10
Indikationen	perniziöse Anämie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: IFAKAK Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.
Isoleucin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	34 - 84 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

JAK2-Mutation V617F °

Probenmaterial

EDTA Blut

Indikationen

Erkrankung	Gen	OMIM	Dauer in Wochen
Thrombozytose, familiäre			
NGS	JAK2 , MPL, THPO	JAK2 , MPL, THPO	4-6
Laron-Syndrom	GHR, IGF1, JAK2, STAT5B	GHR, IGF1, JAK2 , STAT5B	2-4
Leukämie, atypische chronische myeloische			
NGS	ASXL1, CALR, CBL, CSF3R, ETNK1, EZH2, JAK2 , KRAS, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SRSF2, TET2, U2AF1	ASXL1, CALR, CBL, CSF3R, ETNK1, EZH2, JAK2 , KRAS, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SRSF2, TET2, U2AF1	2
Leukämie, chronische myelomonozytäre			
NGS	ASXL1, CALR, CBL, CSF3R, DNMT3A, ETNK1, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2	ASXL1, CALR, CBL, CSF3R, DNMT3A, ETNK1, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, MPL, NRAS, RUNX1, SETBP1,	2
Leukämie, myeloische (NGS)	ASXL1, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DNMT3A, EZH2, FLT3,	ASXL1, CALR, CBL, CEBPA, CSF3R, DNMT3A, EZH2, FLT3,	2

JAK2-Mutation V617F °

	Erkrankung	Gen	OMIM	Dauer in Wochen
		IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2	IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, MPL, NPM1, NRAS, R	
	Leukämie, Philadelphia- Chromosom- ähnliche			
	NGS	JAK2 , JAK1, CRLF2, KRAS, NRAS, PTPN11, IKZF1, ASXL1, ARID2, CHD2, TP53	JAK2 , JAK1, CRLF2, KRAS, NRAS, PTPN11, IKZF1, ASXL1, ARID2, CHD2, TP53	2
	Mastozytose			
	NGS	ASXL1, CBL, ETNK1, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, NRAS, RUNX1, SRSF2, TET2, U2AF1	ASXL1, CBL, ETNK1, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2 , KIT, KRAS, NRAS, RUNX1, SRSF2, TET2, U2AF1	2
	myelodysplastisches Syndrom			
	NGS	ASXL1, BCOR, CBL, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, GATA2, IDH1, IDH2, JAK2 , KRAS, MPL, NPM1, NRAS, PTPN11, RAD21, RUNX1,	ASXL1, BCOR, CBL, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, GATA2, IDH1, IDH2, JAK2 , KRAS, MPL, NPM1,	2

JAK2-Mutation V617F °

	Erkrankung	Gen	OMIM	Dauer in Wochen
		SETBP1, SF3B1, SRSF2, STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2	NRAS, PTPN11,	
	myeloproliferative Neoplasie mit Eosinophilie			
	NGS	ASXL1, CBL, EZH2, ETNK1, IDH2, JAK2 , KIT, SETBP1, SF3B1, TET2	ASXL1,CBL, EZH2, ETNK1, IDH2, JAK2 , KIT, SETBP1, SF3B1, TET2	2
	Neoplasie, myeloproliferative *			
	NGS	JAK2 , CALR, MPL	JAK2 , CALR, MPL	2
	-	JAK2 , Exon 14, V617F	JAK2 , Exon 14, V617F	1-2
	-	JAK2	JAK2	1-2
	NGS	JAK2 , CALR, MPL, ASXL1, CBL, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, TET2, TP53, ZRSR2	JAK2 , CALR, MPL, ASXL1, CBL, DNMT3A, EZH2, IDH1, IDH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, TET2, TP53, ZRSR2	2
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia MVZ Ingelheim Analyt Kürzel: JAK2 Ansatztag: nach Bedarf			

Jo-1 Antikörper	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	0,3 - 240 U/ml
Indikationen	Elia Jo-1 stellt eine Hilfe bei der klinischen Diagnose der idiopathischen entzündlichen Myopathien dar.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: JO-1_S Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Jod im Serum°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Normalwerte	46 – 70 µg/l
Indikationen	Jodintoxikation, Jodmangel: unzureichende Jodzufuhr mit der Nahrung
Anmerkungen	° Fremdleistung
Jod im Urin°	
Probenmaterial	5 ml Spontanurin
Normalwerte	Grad 0: opt. Jodversorgung: 100 - 200 ug/g Krea Grad 1: milder Jodmangel: 50 - 100 ug/g Krea Grad 2: mäßiger Jodmangel: 25 - 50 ug/g Krea Grad 3: schwerer Jodmangel: < 25 ug/g Krea
Indikationen	Jodintoxikation Jodmangel: unzureichende Jodzufuhr mit der Nahrung
Anmerkungen	° Fremdleistung Klassifizierung des Jodmangels (WHO)
Kalium im Heparinplasma	
Probenmaterial	Heparin-Plasma
Normalwerte	3,4 - 4,5 mmol/l
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KHEP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Kalium im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum In neutralem Serum-Röhrchen versenden. Blut für Kalium-Bestimmung ungestaut entnehmen, jegliche Hämolyse verhindern. Blutprobe innerhalb einer Stunde vom Blutkuchen trennen.
Methode	ISE
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 3.5 – 5.1 mmol/l
Indikationen	Störungen des Säure-Basen-Haushalts Niereninsuffizienz, Hypertonie Erbrechen, Durchfälle, Hämolyse (falsch hohe Kalium-Werte im Serum sind durch Austritt von Kalium aus den Erythrozyten möglich)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KAL Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Kalium im Urin	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin Tagesmenge angeben
Methode	ISE
Normalwerte	25 – 125 mmol/d
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KAU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Kälteautoantikörper, Kälteagglutinine	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut (Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!) + EDTA Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss das Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein. Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Autoimmunhämolytische Anämie; V.a. Rainaud Syndrom
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KAG Ansatztage: nach Bedarf Untersuchung besteht aus dem direkten und indirekten Coombs-Test

Katecholamine im Plasma°

Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! Bei gleichzeitiger Anforderung von Aldosteron und Renin bitte ein separates Röhrchen einsenden. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Einsendung von Metanephrinen im Plasma
Normalwerte	Adrenalin < 80 - 500 pg/ml Noradrenalin < 420 pg/ml
Indikationen	Hypertonie, V.a. Phäochromozytom, Neuroblastom oder Ganglioneurom
Anmerkungen	° Fremdleistung Abnahme: peripher nach 20 Min. liegend

Katecholamine im Urin°

Probenmaterial	1 ml Urin oder 1 ml 24h-Sammelurin 24-h-Sammelurin, gesammelt über 5-10ml Eisessig; Kinder bis 18 Jahre: Spontanurin ohne Zusätze (frisch oder gekühlt). Mit Borsäure stabilisierter Urin ist für diese Analyse nicht geeignet. Stabilität 14 tage bei -18°C
Methode	HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
Indikationen	Therap. Drug Monitoring + Stoffwechsel
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: KATE_U Untersuchungsfrequenz: 2 x pro Woche Bei Anforderung der Katecholamine werden Adrenalin und Noradrenalin bestimmt, Dopamin ist separat anzufordern.

Katheterspitzen	
Probenmaterial	Katheterspitze in einem sterilen Röhrchen einsenden (nicht in ein Röhrchen mit Transportmedium einbringen)
Indikationen	Katheterinfektion/-sepsis
Anmerkungen	Entnahme / Lagerung Nach alkoholischer Desinfektion der Haut den Katheter aus der Eintrittsstelle ziehen, mit steriler Pinzette und Schere die vorderen ca. 3 cm der Spitze abschneiden und in ein steriles Transportgefäß <i>ohne</i> Transportmedium geben. Für die Diagnose einer katheterassoziierten Infektion bei schon gezogenem Katheter müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 1) Klinische Infektionszeichen wie Fieber, Schüttelfrost und/oder Blutdruckabfall sowie 2) Positive Blutkultur aus einer peripheren Vene abgenommen mit Nachweis des gleichen Erregers wie bei der Katheterspitze (Identität bzgl. Spezies und Antibiotogramm) Lagerung der Probe bis zu 24 Std. bei 2-8°C.
Kawasaki-Syndrom	
Probenmaterial	1 ml Serum
Kiwi IgE°	
Probenmaterial	Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Kleines Blutbild	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA Blut gut mischen, Lagerung bei Raumtemperatur Thromboexakt-Röhrchen sind nicht geeignet!
Methode	Durchflussszytometrie
Normalwerte	Kindernormwerte altersabhängig: siehe Befund Erwachsenenwerte, geschlechts- und altersabhängig: siehe Befund
Indikationen	V.a. Anämie, Polyglobulie, Hämolyse, Infektionen, Entzündungen, Intoxikationen, myeloproliferative Erkrankung, Leukämien, maligne Tumore, Knochenmarkdepression (Bestrahlung, Chemotherapie, Immunsuppression)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KLBB Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Kokain°	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang) Cocain ° Fremdleistung
Kokain im Urin	
Probenmaterial	50 ml Urin
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	< 300 ng/ml
Indikationen	V.a. bestimmte Substanzgruppen bitte mitteilen! Kreatinin wird zur Kontrolle des Urins mitbestimmt; ggf. Bestätigungstest einer immunologisch positiven Messung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KOKU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Cocain
Kokain, Cocain/Benzoyllecgonin	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Anmerkungen	Cocain
Kokain-Metabolite	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	KIMS
Normalwerte	Schwellenwert < 200 ng/m
Indikationen	V.a. Drogenmissbrauch bei Bedarf Bestätigungsverfahren anfordern
Anmerkungen	Cocain
Kollagenosen serologische Diagnostik	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ANA
Anmerkungen	falls ANA positiv, weitere Untersuchungen empfohlen: dsDNA-Ak falls dsDNA-Ak negativ: Histon-Ak, La-Ak, Ro/SSA-Ak, Scl-70-Ak, Zentromeren-Ak, Jo-1-Ak, U1RNP-Ak falls dsDNA-Ak positiv: RNP/Sm-Ak,ss-DNA-Ak, Ro/SSA-Ak, La-Ak, Histon-Ak, Sm-Ak

Komplement-Gesamtaktivität (CH50) [°]	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Methode	Photometrie
Normalwerte	32 - 58 U/ml
Indikationen	• V.a. erworbenen oder angeborenen Immundefekt bei rezidivierenden Infektionen • V.a. Autoimmunkrankheit mit Komplexbildung (SLE, Glomerulonephritis, Vaskulitis)
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: CH50 Ansatzzeit: Do. Interpretation: • Komplementproteine sind akute-Phase-Proteine und können bei Infektionen/Entzündungen falsch hoch sein • Nur Erniedrigungen spielen eine klinische Rolle

komplexiertes PSA°	
Probenmaterial	Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	< 3,30 ng/ml
Indikationen	Wenn die Konzentration des freien PSA (fPSA) gewünscht ist, bieten wir die direkte Messung des fPSA sowie des gesamten PSA (tPSA) an und berechnen den fPSA/tPSA-Quotienten, der eine vergleichbare Sensitivität und Spezifität für die Unterscheidung zwischen Prostatakarzinom und benigner Prostatatvergrößerung wie cPSA besitzt. Die Blutentnahme wird nach folgenden Zeiträumen empfohlen: • frühestens 48 h nach einer Ejakulation • vor oder frühestens 1 Woche nach: - digital-rektaler Untersuchung, Prostata-Massage, einem transrektalen Ultraschall, einer Blasenspiegelung, intensivem Fahrradfahren • frühestens 6 Wochen nach: - einer Prostata-Biopsie, einer TUR der Prostata
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: CPS Ansatztag: täglich, Mo. - Fr. PSA dient der Früherkennung, Therapie-Kontrolle und Nachsorge des Prostata-Karzinoms. Gemäß Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie ist die Untersuchung indiziert: bei jedem Mann ab einem Alter von 45 Jahren, bei Männern mit Miktions-Beschwerden nach Ausschluss eines Harnwegs-Infektes, nach operativer Entfernung eines Prostata-Karzinoms im Rahmen der Rezidiv-Prophylaxe
Kreatin im Serum°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	6 - 50 µmol/l
Indikationen	Muskeldystrophien mit Muskelzerfall
Anmerkungen	° Fremdleistung

Kreatin im Urin°		
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin Tagesmenge angeben	
Methode	Photometrie	
Normalwerte	Frauen 19 - 270 mg/d Männer 15 - 189 mg/d	
Indikationen	Muskeldystrophien mit Muskelzerfall	
Anmerkungen	° Fremdleistung	
Kreatinin°		
Probenmaterial	Serum	
Methode	enzymatischer Test	
Normalwerte	Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert
	Männer	0,67 - 1,17 mg/dL
	Frauen	0,51 - 0,95 mg/dL
	Kinder:	
	Frühgeborene	0,33 - 0,98 mg/dL
	Reifgeborene	0,31 - 0,88 mg/dL
	2 - 12 Monate	0,16 - 0,39 mg/dL
	1 - < 3 Jahre	0,18 - 0,35 mg/dL
	3 < 5 Jahre	0,26 - 0,42 mg/dL
	5 - < 7 Jahre	0,29 - 0,47 mg/dL
	7 - < 9 Jahre	0,34 - 0,53 mg/dL
	9 - < 11 Jahre	0,33 - 0,64 mg/dL
	11 < 13 Jahre	0,44 - 0,68 mg/dL
	13 < 15 Jahre	0,46 - 0,77 mg/dL
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: KRN2/KRNE Ansatz tage: täglich Mo. - Sa. die Berechnung der GFR erfolgt mittels der verkürzten MDRDCKD-EPI-Formel. Stabilität: Serum 3 Tage bei Raumtemperatur, 6 Tage bei 2-8 °C, 3 Wochen bei -20 °C	

Kreatinin-Clearance	
Probenmaterial	1 ml Serum und 10 ml vom 24.-Std.-Urin Angabe von Tagesmenge Größe und Gewicht des Patienten
Normalwerte	90 – 160 ml/Min/1.73 m ² Körperoberfläche Kinder altersabhängig
Indikationen	quantitative Beurteilung der glomerulären Filtration (GFR); in höherem Alter niedrigere Werte Alternativ GFR-Berechnung (z.B. mit MDRD -Formel oder mit Cystatin C-Bestimmung)
Kreatinin im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	Kinder altersabhängig Frauen: 0.50 - 0.90 mg/dl Männer: 0.70 - 1.20 mg/dl
Indikationen	V.a. Einschränkung der Nierenfunktion GFR Berechnung (z.B. mit CKD-EPI-Formel), Stoffwechselstörungen, Hypertonie, Schwangerschaft
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KREA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Kreatinin im Urin	
Probenmaterial	10 ml vom 24.-Std.-Urin Tagesmenge angeben
Methode	Photometrie
Normalwerte	Frauen: 0,29 – 2,26 g/d Männer: 0,40 – 2,78 g/d
Indikationen	V.a. Einschränkung der Nierenfunktion GFR Berechnung (z.B. mit CKD-EPI-Formel) Stoffwechselstörungen Hypertonie Schwangerschaft
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KRU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Kreuzprobe Blutgruppenverträglichkeit	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut (Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!), 2x 9ml EDTA-Blut Zur eindeutigen Zuordnung des Probenmaterials muss das Röhrchen mit Vor-, Nachname und Geburtsdatum des Patienten beschriftet sein Für blutgruppenserologische Untersuchungen ist eine nur für diesen Zweck bestimmte und geeignete Blutprobe erforderlich.
Methode	Agglutination
Normalwerte	negativ
Indikationen	Hb-Abfall (Anämie, Operation, Dialyse, Polytraume)
Anmerkungen	Anforderung nur nach telefonischer Rücksprache
Kryoglobuline	
Probenmaterial	7,5 ml Vollblut bei 37°C abgenommen und eingesendet
Methode	Präzipitation
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Raynaud Syndrom; SLE Sjögren-Syndrom; Sicca-Syndrom autoimmun-hämolytische Anämie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: KRY Ansatztage: nach Bedarf Präanalytik: Anleitung für die Entnahme bitte anfordern! Blut warm versenden (Bote) oder Abnahme im Labor veranlassen! Einsendung zu Wochenbeginn, 3 Tage Bearbeitungsdauer Außerhalb der Akkreditierung!
Kupfer im EDTA-Blut	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	AAS
Normalwerte	10,3 - 18,4 µmol/l
Kupfer im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	AAS
Normalwerte	65 – 165 µg/dl 20 – 45 µg/dl Frühgeb. 1. Lwo 60 – 70 µg/dl Neugeborene
Indikationen	erniedrigt: Morbus Wilson, Menkes Syndrom, neonataler Kupfermangel, parenterale Ernährung, Malabsorption erhöht: Schwangerschaft, Östrogenmedikation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CUS Ansatztage: Di., Fr.

Kupfer im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin Tagesmenge angeben
Methode	AAS (Atomabsorptionsspektrometrie)
Normalwerte	< 50 µg/d
Indikationen	erhöht: Morbus Wilson (Ausscheidung > 100 µg/d)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Lacosamid	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich: 1-10 µg/ml kritischer Bereich: ab 20 µg/ml
Indikationen	Antiepileptika
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LACO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 10 - 15 Std.
Lactat-Dehydrogenase	
Probenmaterial	1 ml Serum, hämolysefrei nach Gerinnung sofort abtrennen
Methode	LDH-L IFCC (37°C) 2002
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: < 250 U/l
Indikationen	Myokardinfarkt, Lebererkrankungen Lungenembolie, Hämolyse Tumorerkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LDH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Lactat im Blut	
Probenmaterial	Fluoridblut
Methode	turbidimetrischer UV-Test
Normalwerte	0.50 – 2.20 mmol/l
Indikationen	Milchsäure Erkennen von Gewebshypoxien (septischer Schock); metabolische Azidose

Lactat im Liquor	
Probenmaterial	1 ml Liquor, frisch
Methode	Kolometrischer Test
Normalwerte	Kinder 0 - 17 Jahre (weiblich): 0,6 - 2,1 mmol/L Kinder 0 - 17 Jahre (männlich): 0,9 - 2,2 mmol/L Erwachsene: 1,01 - 2,09 mmol/L
Indikationen	Bakterielle Meningitis korreliert mit Ausmaß des zerebralen Ödems und der Bewusstseintrübung beim Hirninfarkt
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FLACL Ansatztage: nach Bedarf
Lactoferrin im Stuhl°	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ: < 3.0 Graubereich: 3.0 - 7.3 Entzündung: > 7.3
Indikationen	Nachweis oder Ausschluss eines akuten entzündlichen Geschehens im Darm s.a. Calprotectin
Anmerkungen	° Fremdleistung
Lactoseintoleranz°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	V.a. Lactoseintoleranz
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. LCT ° Fremdleistung

Lactose-Toleranztest	
Normalwerte	5 Blutzuckerhütchen oder 5 Röhrchen Fluoridblut
Indikationen	Laktoseintoleranz
Anmerkungen	Durchführung nach Anleitung siehe auch humangenetische Untersuchungen
Lamblien Giardia lamblia	
Probenmaterial	1 g Stuhl oder Duodenalsaft
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. Lambliasis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. Antigennachweis Lambliasis: Weltweit eine der häufigsten Parasitenerkrankungen, Übertragung meist durch kontaminiertes Wasser oder Nahrungsmittel Mikroskopischer Nachweis Lamblienzysten: Sind relativ stabil und im gekühlten Stuhl einige Tage haltbar. Vegetative Formen: Zum Nachweis muss die Probe innerhalb 30 min nach Entnahme untersucht werden. Antigennachweis Der Nachweis von Giardia lamblia-Antigen ist auch nach längerer Lagerung möglich, selbst wenn mikroskopisch keine vegetativen Formen mehr nachweisbar sind (Antigen bis zu 3 Tagen bei 2-8°C stabil). Bei Anforderung einer Untersuchung auf Lamblien bzw. Parasiten im Stuhl wird vom Labor immer ein Antigennachweis mittels ELISA durchgeführt.

Lamotrigin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 3-15 µg/ml toxischer Bereich: ab 20 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum z.B. Lamictal® Blutentnahme direkt vor der nächsten Medikamenteneinnahme
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LAMO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 14 - 104 Std. Valproinsäure erhöht die Eliminationshalbwertszeit auf 45 - 75 Std. Carbamazepin, Phenytoin oder Phenobarbital verringern sie auf 9 - 14 Std.
L-Carnitin°, frei	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Indikationen	Muskelschwäche, Myalgie, Myopathie, Kardiomyopathie
Anmerkungen	° Fremdleistung
L-Carnitin im Ejakulat°	
Probenmaterial	1 ml Seminalplasma GEFROREN!
Methode	Photometrie
Normalwerte	> 2,4 mg/dl
Indikationen	Beurteilung der männlichen Fertilität, Funktionsstörung des Nebenhodens
Anmerkungen	° Fremdleistung

LDH-Isoenzyme°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	PAGE
Normalwerte	LDH1 16.1 – 31.5 % LDH2 29.2 – 41.6 % LDH3 17.0 – 26.2 % LDH4 5.9 – 12.3 % LDH5 3.2 – 17.3 %
Indikationen	Organbezogene Diagnostik LDH1+LDH2: Herzmuskel, Erythrozyten, Niere LDH3: Milz, Lunge, Lymphknoten, Thrombozyten LDH4: Skelettmuskel LDH5: Leber
Anmerkungen	° Fremdleistung
LDL-Cholesterin	
Probenmaterial	2 ml Serum, nach 12 h Nahrungskarenz
Methode	Photometrie
Normalwerte	Zielwerte für LDL nach Leitlinie der ESC/EAS-Guidelines zur Diagnostik und Therapie der Dyslipidämien abhängig vom kardiovaskulärem Risiko: Niedrig < 116 mg/dl Moderat < 100 mg/dl Hoch >= 50%ige Reduktion und < 70 mg/dl Sehr hoch >= 50%ige Reduktion und < 55 mg/dl Extrem < 40 mg/dl
Indikationen	Arteriosklerose-Vorsorge Kontrolle einer cholesterinsenkenden Therapie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LDL Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

LE ANA IFT	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Indirekte Immunfluoreszenz-Mikroskopie)
Normalwerte	< 1 : 100 qualitativ: negativ, positiv quantitativ: 1 : 100 bis >1 : 10000
Indikationen	Verdacht auf Autoimmunerkrankungen, systemischen Lupus erythematodes(SLE), Sjögren Syndrom, Rheumatoide Arthritis und andere Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LET/LETQ Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Probenlagerung: bei 2-8°C für 14 Tage stabil Nachforderbarkeit innerhalb von 7 Tagen Internationale ANA-Nomenklatur, Klassifikation (AC= ANA-Cell Patterns), mögliche Zielantigene und mögliche Krankheitsassoziationen siehe " www.anapatterns.org "
Lebermembran-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IIF
Normalwerte	< 1 : 100
Indikationen	autoimmune, chronisch aggressive Hepatitis
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: LMAAK Ansatztage: 1 x Wöchentlich Testdauer: 24 Std.
Leflunomid als Metabolit	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	6 - 100 µg/ml
Legionella-Antigen°	
Probenmaterial	2 ml Urin
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 9 U/ml grenzwertig 9 – 11 U/ml
Indikationen	L. pneumophila Serotyp I
Anmerkungen	Bei V.a. frische Infektion ist der Erregernachweis die Methode der Wahl ° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Legionella-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 50 U/ml grenzwertig 50 – 70 U/ml positiv >70 U/ml
Indikationen	DD: atypische Pneumonie, V. a. Legionellen-Infektion (Legionärskrankheit)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LEGG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Legionella-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 120 U/ml grenzwertig 120 – 140 U/ml positiv > 140 U/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LEGM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Legionella spp.°	
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	°Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Legionellen PCR°	
Probenmaterial	Sputum, Trachealsekret, Bronchialsekret/-lavage
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Leichtketten κ λ	
Probenmaterial	2 ml Serum
Indikationen	Diagnose-, Verlaufs- und Therapiekontrolle sowie Prognosemarker

Leishmanien-Ak°, Indir. Hämagglutination: IHA Titer, IgG-Ak, IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Titer IHA IgG-Ak IFT IgM-Ak IFT (Indirekte Hämagglutination) (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	Titer < 1:32 unverdächtig IgG-Ak: < 1:40 IgM-Ak: < 1:20
Indikationen	Viszerale Leishmaniose (Kalar-Azar)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Leptin°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	4,1 - 25,0 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Leptospiren-IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Leptospiren-IgM-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	° Fremdleistung
Leucin	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 78 - 160 µmol/l

Leukozyten	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene 18 - 65 Jahre: 3900 - 10200 /mm ³ Erwachsene ab 66 Jahren: 3600 - 10500 /mm ³
Indikationen	V.a. Anämie, Polyglobulie, Hämolyse Infektionen, Entzündungen, Intoxikationen myeloproliferative Erkrankung, Leukämien maligne Tumore Knochenmarkdepression (Bestrahlung, Chemotherapie, Immunsuppression)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LEU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. gut mischen, Lagerung bei Raumtemperatur siehe auch kleines Blutbild
Leukozyten im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Indikatorstreifenmessung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LEUKU Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bei Befundfreigabe eines kulturellen Urinbefundes (nach ca. 2-3 Tagen)
Levetiracetam	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 10-40 µg/ml toxischer Bereich: ab 50 µg/ml
Indikationen	Antiepileptika
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LEVE Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 6 - 8 Std. Die Clearance nimmt mit zunehmenden Alter deutlich ab, so dass eine um 30 bis 50 % geringere Dosis erforderlich ist. altersabhängiger Anstieg der HWZ.

Levodopa	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0,3 - 2,0 µg/ml

LH Luteinisierendes Hormon

Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	weiblich: von 0 - 4 Monate < 8,2 mIU/ml von 5 Monate - 9 Jahre < 1,3 mIU/ml von 10 Jahre - 12 Jahre < 10,0 mIU/ml von 13 Jahre - 18 Jahre 0,4 - 25,0 mIU/ml Follikelphase: 2,4 - 13 mIU/ml Ovulationsphase: 14 - 96 mIU/ml Lutealphase: 1 - 11 mIU/ml von 19 Jahre - 34 Jahre Follikelphase: 2,4 - 13 mIU/ml Ovulationsphase: 14 - 96 mIU/ml Lutealphase: 1 - 11 mIU/ml von 35 Jahre - 120 Jahre* Follikelphase: 2,4 - 13 mIU/ml Ovulationsphase: 14 - 96 mIU/ml Lutealphase: 1 - 11 mIU/ml Postmenopause: 7,7 - 59 mIU/ml männlich: von 0 - 4 Monate < 6,2 mIU/ml von 5 Monate - 9 Jahre < 1,3 mIU/ml von 10 Jahre - 12 Jahre < 2,0 mIU/ml von 13 Jahre - 18 Jahre 1,3 - 8,4 mIU/ml von 19 Jahre - 120 Jahre* 1,7 - 8,6 mIU/ml METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	Frauen: Ovarialinsuffizienz, Ovulationszeitpunkt, Pubertas praecox Männer: Hypogonadismus, Klinefelter Syndrom										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LHS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lagerung:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> <tr> <td>2-8°C</td><td>14 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>5 Tage</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8°C	14 Tage	Raum Temperatur	5 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8°C	14 Tage										
Raum Temperatur	5 Tage										

Lindan (γ-HCH) [°]	
Methode	GC/MS
Anmerkungen	γ -Hexachlorcyclohexan ° Fremdleistung
Lipase	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 60 U/l
Indikationen	V.a. auf akute Pankreatitis, Ausschluss der akuten Pankreatitis bei akutem Oberbauchsyndrom, chronisch rezidivierende Pankreatitis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LIP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Lipidelektrophorese [°]	
Probenmaterial	1 ml Serum, nüchtern nach 12-stündiger Nahrungskarenz
Methode	Agarosegel-Elektrophorese
Normalwerte	Auf dem Befund erfolgt eine Einteilung nach Fredrickson.
Indikationen	Diagnostik und Differenzierung der Hyperlipidämien Klassifikation nach Frederickson
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: LELF Ansatztage: bei Bedarf Beinhaltet folgende Untersuchungen: Cholesterin, gesamt (Serum (S)) Triglyceride (Serum (S)) Blutentnahme nüchtern, nach 12-stündiger Nahrungskarenz! Bitte nur ungefrorenes Serum, gefrorenes Serum ist ungeeignet.
Lipidperoxide [°]	
Probenmaterial	Serum, GEFROREN!
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 300 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: LIPOX Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Lipopolysaccharide bind. Protein°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	5,0 - 8,0 µg/ml
Anmerkungen	LBP wird bei Endotoxin abhängigen, bakteriellen Infektionen freigesetzt und eignet sich zur Abgrenzung nicht bakterieller Erkrankungen. Im Gegensatz zum Procalcitonin zeigt LBP auch lokale bakterielle Infektionen an. Besonders starke Erhöhungen bei septischen Erkrankungen zu erwarten. ° Fremdleistung
Lipoprotein (a) 2.Gen	
Probenmaterial	1 ml Serum, nüchtern nach 12-stündiger Nahrungskarenz
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	< 75.0 nmol/l
Indikationen	Abschätzung des Arteriosklerosisrisikos insbesondere bei erhöhten LDL-Cholesterinwerten
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LPA_RS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Liquordiagnostik, Liquorstatus			
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen		
Indikationen	Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse		
Anmerkungen	Zellzahl < 4 Zellen/ μ l	kammerzählung Mikroskopie	
	Eiweiß < 45 mg/dl	Biuret-Reaktion	
	Glucose 50 – 75 mg/dl	enzymatisch	
	Chlorid 119 – 129 mmol/l	mercurimetrisch	
	IgG < 4.0 mg/dl	Nephelometrie	
	IgM < 0.1 mg/dl	Nephelometrie	
	IgA < 0.6 mg/dl	Nephelometrie	
	Erregerspezifischer Antikörperindex		
	negativ 0.7 – 1.5 AI	Serum und Liquor vom selben Tag erforderlich	z. B. für FSME°, HIV°, VZV°, HSV°, Röteln°, Masern° ° Fremdleistung
	positiv > 1.5 AI		
	Reiber-Schema Bestimmung von Albumin, IgG, IgA, IgM, Oligoklonalen Banden (Isoelektrische Fokussierung)	je 1 ml Serum und Liquor	
	Albumin im Serum 3500 – 5500 mg/dl	1 ml Serum Nephelometrie	Blut/ Hirnschrankenfunktion
	Albumin im Liquor < 35 mg/dl	1 ml Lumballiquor Turbidimetrie	Alb. Quotient
	Albumin-Quotient < 7	je 1 ml Serum und Liquor vom selben Tag	

Liquordiagnostik, Liquorstatus

Gesamtprotein des Liquors als Schrankenparameter:
Permeabilitätsstörungen durch akute Meningitis/Enzephalitis,
chron. entzündl. Prozesse, entzündl. Polymeningitiden, Meningeal
Blastomatosen, atroph. degen. Prozesse.

Albumin-IgG- Quotient	5 ml Liquor und	
Delpech Blau Quotient	2 ml Serum	
0.38 – 0.7		
Liquorproteine	5 ml Liquor und	Albumin-Quotient
Oligoklonales IgG	2 ml Serum	Isoelektrische Fokussierung
Albumin-IgG- Quotient	ohne Serum ist keine Auswertung der Liquordaten bezüglich intrathekalen Synthese und Schrankenstörung möglich	
negativ		

Liquorproteine

Probenmaterial	5 ml Liquor und 2 ml Serum
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	ohne Serum ist keine Auswertung der Liquordaten bezüglich intrathekalen Synthese und Schrankenstörung möglich

Lithium (Medikamentenspiegel)

Probenmaterial	1 ml Serum Präanalytik: Blutabnahme als Talspiegel vor der nächsten Einnahme und 7 - 8 Tage nach Therapiebeginn bzw. Dosisänderung.
Methode	Flammenphotometrie
Normalwerte	therap. Bereich 0,6 – 1,2 mmol/l Toxisch: > 1,5 mmol/l Potentiell tödlich: > 4,0 mmol/l
Indikationen	Therapiekontrolle, V.a. Intoxikation Auftreten von toxischen Nebenwirkungen ab 1.5 mmol/l Eliminationshalbwertszeit 24 Std.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LIT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Lithium (Spurenelement)°		
Probenmaterial	Serum oder EDTA-Blut	
Methode	ICP-MS	
Normalwerte	Serum	
	Nachweisgrenze:	0,2 µg/l
	Referenzwert:	0,3 - 2,2 µg/l
	EDTA-Blut	
	Nachweisgrenze:	0,2 µg/l
	Referenzwert:	0,6 - 4,4 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: LITS Ansatztage: 1 x die Woche	
	Stabilität: 1 Tag bei Raumtemperatur, 7 Tage bei 2 - 8 °C, 6 Monate bei -20 °C	
LK Liver-Kidney-Mikrosomen (LKM) Ak		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Indikationen	Autoimmunhepatitis, medikamenteninduzierte Hepatitiden	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LKM1 Ansatztage: 2 x / Woche	
Lorazepam°		
Probenmaterial	2 ml Serum	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	therapeutischer Bereich 30 - 100 ng/ml kritischer Bereich: ab 300 ng/ml	
Indikationen	Benzodiazepin	
Anmerkungen	° Fremdleistung	
löslicher Interleukin-2-Rezeptor sILR°		
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!	
Methode	LIA (Lumineszenz-Immuno-Assay)	
Normalwerte	158 - 623 U/ml	
Indikationen	AIDS, Transplantatabstoßung, Lymphome, Leukämie, Sarkoidose	
Anmerkungen	° Fremdleistung	

LSD°	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/ GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Anmerkungen	° Fremdleistung
LUC	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Mikroskopie der Ausstriche
Normalwerte	< 5 %
Anmerkungen	Analyt Kürzel: large unstained cells Analyt Kürzel: LUC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Lupus Antikoagulanzen°	
Probenmaterial	3 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Turbidimetrie
Indikationen	Die Lupus-Antikoagulanzen gehören neben den Anti-Cardiolipin-Antikörpern (ACA) zu der heterogenen Gruppe der Antiphospholipid-Antikörper (APA). Es empfiehlt sich neben den LA auch jeweils die ACA und Beta-2-Glykoprotein-Ak anzufordern. • Thrombose-Neigung ungeklärter Ursache • aPTT-Verlängerung unklarer Ursache • Abort-Neigung unklarer Ursache • Autoimmun-Erkrankungen, insbesondere systemischer Lupus Erythematodes • Thrombozytopenie unklarer Ursache
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: LUAK Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. Präanalytik/Hinweise: Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Sofort zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. Bei zusätzlicher Anforderung von Gerinnungsfaktoren (Faktor II bis XIII) wird zusätzlich mindestens ein weiteres Röhrchen gefrorenes Citratplasma benötigt. Aus jeder Probe wird sowohl mittels DRVVT als auch aPTT (MixConLA) auf Lupus Antikoagulans getestet. Interpretation: Ein positives Ergebnis kann Hinweis auf ein ApS sein (Antiphospholipid-Syndrom); eine Bestätigungs-Analyse nach ca. 12 Wochen wird empfohlen. Bei negativem Test-Ergebnis aber klinisch verdächtiger Symptomatik empfiehlt es sich, die Bestimmung der Phosphatidyl-Serin-Antikörper durchzuführen. Anhand neuerer Kriterien zur Klassifikation eines ApS werden Patienten bezüglich der Anzahl und der Art der ApA in Klassen 1 bis 2 a - c, eingeteilt. Beim Vorhandensein von LA ist das Thrombose-Risiko am höchsten. Nachweisbar bei: • venösen oder arteriellen Thrombosen • Thrombozytopenien

Lupus Antikoagulanz°																														
	• wiederholten Aborten • systemischem Lupus Erythematodes • Einnahme von Medikamenten z. B. Procainamid, Phenytoin und Chlorpromazin • Infektions-Erkrankungen z. B. infektiöser Mononukleose, Varizellen, Hepatitis, Malaria, Tuberkulose, Borrelien und HIV • Malignomen z. B. Bronchial- und Mamma-Karzinom, lymphoproliferativen Erkrankungen und monoklonalen Gammopathien • neurologischen Erkrankungen wie z. B. Guillain-Barré-©- und Morbus Behçet-Syndrom																													
Lymphozyten																														
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut																													
Methode	Durchflusszytometrie																													
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 20 - 44 %																													
Anmerkungen	siehe Differenzialblutbild Analyt Kürzel: LYM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.																													
Lymphozyten absolut																														
Probenmaterial	EDTA-Blut																													
Normalwerte	<table><tr><th>Alter</th><th>Werte in x 1000/µl</th></tr><tr><td>0 - 3 Tage</td><td>1,80 - 11,20</td></tr><tr><td>4 - 7 Tage</td><td>2,00 - 12,60</td></tr><tr><td>8 - 29 Tage</td><td>2,20 - 13,60</td></tr><tr><td>1 - 3 Monate</td><td>2,70 - 12,60</td></tr><tr><td>4 - 6 Monate</td><td>3,00 - 12,20</td></tr><tr><td>7 - 11 Monate</td><td>3,20 - 11,20</td></tr><tr><td>1 - 2 Jahre</td><td>3,00 - 10,0</td></tr><tr><td>3 - 4 Jahre</td><td>2,20 - 8,50</td></tr><tr><td>5 - 6 Jahre</td><td>1,80 - 7,00</td></tr><tr><td>7 - 12 Jahre</td><td>1,50 - 6,00</td></tr><tr><td>13 - 18 Jahre</td><td>1,20 - 5,00</td></tr><tr><td>19 - 65 Jahre</td><td>1,10 - 4,50</td></tr><tr><td>ab 66 Jahre</td><td>1,10 - 4,00</td></tr></table>		Alter	Werte in x 1000/µl	0 - 3 Tage	1,80 - 11,20	4 - 7 Tage	2,00 - 12,60	8 - 29 Tage	2,20 - 13,60	1 - 3 Monate	2,70 - 12,60	4 - 6 Monate	3,00 - 12,20	7 - 11 Monate	3,20 - 11,20	1 - 2 Jahre	3,00 - 10,0	3 - 4 Jahre	2,20 - 8,50	5 - 6 Jahre	1,80 - 7,00	7 - 12 Jahre	1,50 - 6,00	13 - 18 Jahre	1,20 - 5,00	19 - 65 Jahre	1,10 - 4,50	ab 66 Jahre	1,10 - 4,00
Alter	Werte in x 1000/µl																													
0 - 3 Tage	1,80 - 11,20																													
4 - 7 Tage	2,00 - 12,60																													
8 - 29 Tage	2,20 - 13,60																													
1 - 3 Monate	2,70 - 12,60																													
4 - 6 Monate	3,00 - 12,20																													
7 - 11 Monate	3,20 - 11,20																													
1 - 2 Jahre	3,00 - 10,0																													
3 - 4 Jahre	2,20 - 8,50																													
5 - 6 Jahre	1,80 - 7,00																													
7 - 12 Jahre	1,50 - 6,00																													
13 - 18 Jahre	1,20 - 5,00																													
19 - 65 Jahre	1,10 - 4,50																													
ab 66 Jahre	1,10 - 4,00																													
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LYMsabs Ansatztage: täglich Mo. - Fr.																													

Lymphozyten-Differenzierung, T-Lymphozyten (=CD3/CD45), T-Helferzellen (=CD3/CD4/CD45), T-Suppressorzellen (=CD3/CD8/CD45), T4/T8-Quotient (=CD4/CD8-Quotient), Aktive T-Lymphozyten (=CD3/HLA-DR/CD45), B-Lymphozyten (=CD3/CD19/CD45), Natürliche Killerzellen (NK) (=CD16+CD56/CD45)	
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie FACS
Normalwerte	Normalwerte s. Befund
Indikationen	primäre und erworbene zelluläre Immundefizite Immunmangelerkrankungen Autoimmunerkrankungen Immunstatus von Organempfängern Therapiekontrolle bei HIV-Infektion Neigung zu Pilzinfektion Parasitosen
Anmerkungen	Versand in roter Versandtüte! Untersuchung bitte zum Wochenbeginn anfordern (Analysentage von Mo bis Do)
Lymphozyten-Transformations-Test	
Probenmaterial	CPDA-Blut
Methode	LTT
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: LTT Ansatztage: Einsendung am Wochenanfang, Mi. - Sa. Testdauer: 5 Tage Mene je nach Anforderung. Bitte Spezialröhrchen anfordern. Einsendung am Wochenanfang. Probentransport bei RT innerhalb von 2 - 3 Tagen.
Lysin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 111 - 248 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Lysozym°	
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN! 0.5 ml Liquor 1 ml Urin
Methode	RID
Normalwerte	Serum 4 – 17 mg/l Liquor < 1 mg/l Urin < 1.5 mg/l
Indikationen	Erkennung und Verlaufsbeurteilung von Transplantatabstoßungsreaktionen, Diagnostik tubulärer Nierenschädigung TurbidimetrieDifferenzierung von Leukämien Kinder: Harnwegsinfekte DD bakterieller und abakterieller Meningitis
Anmerkungen	° Fremdleistung
M2-PK im Stuhl° Tumor M2-Pyruvatkinase	
Probenmaterial	1 g frischer Stuhl nicht älter als 24 h
Methode	EIA nach Extraktion (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 4 U/ml
Indikationen	Screeningmarker für kolorektale Tumorerkrankungen
Anmerkungen	Adenome und chronisch entzündliche Darmerkrankungen können auch zu erhöhten Werten führen ° Fremdleistung
M. Addison	
Probenmaterial	1 ml Serum
Anmerkungen	siehe auch Cortisol
Magnesium im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie (Farbtest mit Enpunkt Methode)
Normalwerte	Serum 1.4 – 2.1 mval/l
Indikationen	V.a. Magnesiummangel Therapie mit Diuretika Alkoholabusus parenterale Ernährung Niereninsuffizienz
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MAG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Magnesium im Urin	
Probenmaterial	hämolysefrei 10 ml vom 24-Std.-Urin Tagesmenge angeben
Methode	Flammen-Atomabsorption
Normalwerte	6 - 10 mval/d
Indikationen	V.a. Magnesiummangel Therapie mit Diuretika Alkoholabusus parenterale Ernährung Niereninsuffizienz
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MGU

Malabsorptionssyndrom	
Methode	Eisen, Ferritin, 25-Hydroxy-Vitamin D, LH, FSH, SHBG
Malaria-Antikörper°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Mikroskopischer Nachweis (IFT)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Bestätigung Retrospektive einer Malaria Infektion
Anmerkungen	° Fremdleistung, Universitätsklinikum Bonn (IMMIP) Analyt Kürzel: MAL Ansatztage: täglich Mo. - Fr. (Meldepflicht IfSG) Die Antikörperbestimmung ist nicht zur Diagnostik bei V.a. akute Malaria geeignet. Hier ist der direkte Erregernachweis mittels dickem Tropfen und Blutausstrich vorrangig!
Malaria-Blutausstrich	
Probenmaterial	frisches EDTA-Blut, Blutausstrich
Methode	mikroskopisch
Indikationen	Suchtest bei V.a. auf akute Malaria
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MALA Ansatztage: nach Bedarf (Meldepflicht IfSG) Ein negatives Ergebnis schließt das Vorliegen einer Malaria nicht sicher aus. Bei anhaltendem Verdacht sind kurzfristige Kontrolluntersuchungen (alle 24 - 48 h) ratsam.
Malaria-Dicker Tropfen	
Probenmaterial	frisches EDTA-Blut Blutausstrich
Methode	mikroskopisch
Normalwerte	Plasmodien nicht nachweisbar
Indikationen	Suchtest bei V.a. auf akute Malaria
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MALA Ansatztage: nach Bedarf (Meldepflicht IfSG) Schnelltest bei unsicheren Fällen einsetzbar. Ein negatives Ergebnis schließt das Vorliegen einer Malaria nicht sicher aus. Bei anhaltendem Verdacht sind kurzfristige Kontrolluntersuchungen (alle 24 - 48 h) ratsam.

Malondialdehyd, frei°	
Probenmaterial	1 ml EDTA-Plasma
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 2 µmol/l
Indikationen	Antioxidativer Status, Nachweis von freien Sauerstoffradikalen
Anmerkungen	° Fremdleistung
Mangan°	
Probenmaterial	Serum
Methode	ICP-MS
Normalwerte	0,3-0,9 µg/L Nachweisgrenze: > 0,2 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: MNS Ansatztage: 1 - 2 x je Woche Testdauer: 24 Std. Stabilität bei 4°C > 4 Wochen und bei -20°C 6 Monate (konzentrationsabhängig) Hämolysefrei. Neutralmonovetten ohne jegliche Zusätze verwenden !
Maprotilin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Ber.: 75-130 ng/ml Kritisch ab: 220 ng/ml
Indikationen	Trizyklische Antidepressiva
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MAPR Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 20 - 58 Std. aktiver Metabolit N-Desmethylmaprotilin

Masern-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 150 mIU/ml grenzwertig 150 – 200 mIU/ml positiv > 200 mIU/ml
Indikationen	Z.n. Infektion, Impfschutzkontrolle
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MAEG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Masern-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	akute Infektion, V.a. Reinfektion (zusammen mit IgG-Ak)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MAEM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Masern im Liquor IgG, IgM°	
Probenmaterial	Liquor
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0,7 - 1,5 AI positiv > 1,5 AI
Anmerkungen	siehe Liquordiagnostik, für Indexbestimmung taggleiches Serum erforderlich. ° Fremdleistung
Masern RNA-PCR°	
Probenmaterial	EDTA-Blut, Rachenabstrich, Urin
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Materialien aus dem Augenbereich	
Probenmaterial	Konjunktivalabstrich (Abstrich in Transportmedium) Kammerspülwasser Glaskörperpunktat
Indikationen	Konjunktivitis, Endophthalmitis
Anmerkungen	Hinweis Antimikrobielle Augentropfen/-salben 2-3 Tage vorher absetzen. Vor der Abstrichentnahme möglichst keine Lokalanästhetika verwenden, da diese antibakterielle Zusätze enthalten können. Konjunktivalabstrich Nach Abheben des Unterlides Konjunktiva mit Tupfer abstreichen, Berührung mit dem Lidrand vermeiden. Bei Ulcera Abstrich vom Geschwürrand entnehmen. Der Abstrichtupfer kann ggf. mit steriler 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet werden. Punktate Material in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen einsenden. Chlamydien-/Gonokokken-PCR (Untersuchung außerhalb der Akkreditierung) Nach Wegziehen bzw. Umlappen von Unter-/Oberlid Konjunktiva mehrfach mit Tupfer abstreichen. Tupfer in Röhrchen mit Spezialmedium überführen und darin belassen. Lagerung/Transport: 12 Monate (2-30°C)

Materialien aus dem Gastrointestinaltrakt (Stuhl, Magenbiopsien)	
Indikationen	Diarrhoe durch bakterielle Erreger: z.B. Salmonellen, Shigellen, Yersinien, Campylobacter, enteropathogene E. coli (EPEC), enterohämorrhagische E. coli (EHEC) Diarrhoe durch virale Erreger: Noro-, Adeno-, Rotaviren Antibiotikaassoziierte Diarrhoe (AAD): Clostridium difficile Personaluntersuchung auf Salmonellen/Shigellen Parasiteninfektion: z.B. Amöben, Lamblien, Würmer/Wurmeier Kokzidien/Mikrosporidien (HIV, Immunsuppression) Pilze Multiresistente Keime z.B. MRGN, VRE Insbesondere bei folgenden Indikationen empfiehlt sich ein erweitertes Untersuchungsspektrum: Weitere Hinweise siehe auch Bakteriologische Untersuchung
Anmerkungen	Antibiotikaassoziierte Diarrhoe (AAD): Cl. difficile Nach Auslandsaufenthalt: pathogene Keime, Würmer/Wurmeier/Parasiten, ggf. Aeromonas spp./Vibrio spp. Blutige Diarrhoe: pathogene Keime, Cl. difficile, EHEC, Adeno-/Noro-/Rotaviren; nach Auslandsaufenthalt zusätzlich Würmer/Wurmeier/Parasiten, ggf. Aeromonas spp./Vibrio spp. Immunsupprimierte Patienten: pathogene Keime, Cl. difficile, EPEC, EHEC, Aeromonas spp., fakultativ enteropathogene Bakterien (z.B. Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp., Enterobacteriaceae, Staph. aureus), Mykobakterien, Pilze, Würmer/Wurmeier/Parasiten, Kokzidien (Isospora, Cryptosporidium^o Fremdleistung, Cyclospora), Mikrosporidien, Rota-/Adeno-/Noroviren, CMV (PCR aus Colon-Biopsie oder Stuhl)

Materialien aus dem Genitaltrakt

Probenmaterial	Servix- oder Vaginalabstrich Unter Verwendung eines sterilen Vaginalspekulum Abstrich entnehmen und in Transportmedium überführen. Urethralabstrich Die letzte Miktion sollte 2-3 Std. zurückliegen. Harnröhrenöffnung reinigen. Vor der Abstrichentnahme beim Mann empfiehlt es sich, Sekret aus den hinteren Harnröhrenabschnitten durch Ausstreifen nach vorne zu befördern. Mittels dünnem Abstrichtupfer das Sekret aus einer Tiefe von 2 cm unter leichtem Drehen entnehmen und ins Transportmedium überführen. Ejakulat oder Prostataexprimat Vor der Materialgewinnung den Bereich um die Harnröhrenöffnung reinigen. Probe nativ in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen einsenden.
Indikationen	Urethritis Balanitis Vaginitis, auch bakterielle Vaginose (<i>Gardnerella vaginalis</i>) Zervizitis Adnexitis Prostatitis Epididymitis Mutterschaftsvorsorge (z.B. Chlamydien, B-Streptokokken)
Anmerkungen	Bei V.a. Infektion mit Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen, Ureaplasmen, Trichomonaden, Pilzen und Aktinomyzeten müssen diese als Zielaufträge angefordert werden. Der Untersuchungsauftrag auf „pathogene Keime“ schließt diese Erreger nicht mit ein. Zudem bitte für die Untersuchung auf Chlamydien- und Gonokokken-PCR spezielles Abstrichset (cobas PCR Media Abstrichset) verwenden, siehe STD (sexual transmitted disease) Für den kulturellen Gonokokken-Nachweis sind ebenfalls spezielle Abstrichbestecke zu verwenden (Transportmedium mit Kohlepartikel, schwarzes Gel), siehe STD (sexual transmitted disease).

Nasenabstrich

Sterilen Tupfer ca. 2 cm in ein Nasenloch einführen, Nasenschleimhaut rotierend abstreichen. Je nach Fragestellung mit dem selben Tupfer (MRSA) oder neuem Tupfer auch Abstrich vom 2. Nasengang entnehmen. Probenentnahme bei Sinusitis siehe unten.

Rachen- /Tonsillenabstrich

Möglichst nicht direkt nach dem Essen. Nach Mundspülung mit desinfizierenden Substanzen mind. 6 Std. Zeitabstand lassen. Mund mehrmals mit Leitungswasser ausspülen. Zunge mit Spatel herunterdrücken. Tonsillen und/oder Rachenhinterwand abstreichen ohne dabei Lippen, Mundschleimhaut oder Uvula zu berühren.

Angina Plaut-Vincent

Mit einem Tupfer Material auf einen Objektträger ausstreichen und luftgetrocknet einsenden.

Diphtherie°

Bei Krankheitsverdacht muss für die gezielte Erregersuche das Labor unbedingt **vorab telefonisch** informiert werden. Geeignet sind Nasopharyngeal- und Rachenabstriche, die unter laryngoskopischer Kontrolle unterhalb des abgehobenen pseudomembranösen Belags entnommen oder mit einer Zange abgezipft werden (Vorsicht: Gefahr der Verlegung der Atemwege). Bereits der V.a. Diphtherie ist meldepflichtig und stellt eine Indikation für die sofortige Antitoxingabe und Antibiotikatherapie dar.

(Bei V.a. eine kutane Infektion mit *C. diphtheriae* sind neben Haut- auch Nasopharyngeal- und Rachenabstriche zu gewinnen.)

° Fremdleistung

Keuchhusten (B. pertussis/parapertussis)

PCR°: Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden)

Rachen- und Nasenabstriche sowie andere Proben aus den Atemwegen sind nicht bzw. nur sehr eingeschränkt geeignet.

° Fremdleistung

Die sterile flexible Abstrichbürste darf vor der Abstrichentnahme nicht in das Transportröhrchen eingetaucht d.h. nicht befeuchtet werden. Abstrichbürste in beide Nasenlöcher tief einführen und unter Drehbewegungen entnehmen. Nach der Probengewinnung Tupfer in das flüssige Transportmedium (0,9%ige NaCl-Lsg.)

überführen und den Tupferstiel an der dafür vorgesehenen Einkerbung durch Abbrechen über der Röhrchenkante kürzen, damit der Deckel dicht verschlossen werden kann.

Das Material sollte noch am selben Tag ins Labor transportiert werden, andernfalls ist die Probe bei 2-8°C zu lagern.

Die B. pertussis/parapertussis-PCR kann bis zu 2 Wochen nach Symptombeginn erfolgversprechend eingesetzt werden, bei Kleinkindern bis zu 3 Wochen.

Antikörnernachweis: 1 ml Serum für B. pertussis/parapertussis°-Serologie
Nachweis eines signifikanten Antikörperanstiegs (Frühphase und ca. 3-4 Wochen später) bzw. Nachweis eines hohen Antikörpertiters im Serum.

Otitis externa

Ohrmuschel desinfizieren, ggf. Krusten entfernen. Mit einem Tupfer den Gehörgang rotierend abstreichen. Bei trockenen Läsionen kann der Abstrichtupfer mit steriler 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet werden.

Otitis media

Intaktes Trommelfell: Die Entnahme eines Gehörgangabstriches bei V.a. Otitis media ist nicht sinnvoll.

Rupturiertes Trommelfell: Spekulum in Gehörgang einführen, Abstrich entnehmen, Kontakt mit Gehörgangswand vermeiden.

Geschlossenes Trommelfell: Gehörgang mit einem Tupfer, der mit 0,9%iger NaCl-Lösung angefeuchtet wurde, säubern. Punktion oder Inzision des Trommelfells mit Aspiration von Mittelohrflüssigkeit. Flüssigkeit in der luftfrei verschlossenen Spritze ins Labor transportieren.

Die Tympanozentese nur für diagnostische Zwecke ist allerdings nicht indiziert, Ausnahmen müssen im Einzelfall entschieden werden.

Sinusitis

Nasenabstriche sind wegen der dortigen Standortflora nicht für die Diagnostik einer Sinusitis geeignet. Das Material der Wahl ist Nasennebenhöhlen-Punktat bzw. -Spülflüssigkeit; dieses in der

Materialien aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich	
	luftfrei verschlossenen Entnahmespritze oder bei größerer Probenmenge in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen ins Labor transportieren.
Indikationen	Angina Diphtherie Keuchhusten Pharyngitis Otitis externa/media Rhinitis Sinusitis MRSA-Screening
Anmerkungen	Hinweis Diagnostik auf Influenza A/B-Viren, SARS-CoV-2 (Corona-Viren), Respiratory-Syncytial-Virus (RSV), Chlamydophila pneumoniae/psittaci siehe Hinweise zu einzelnen Erregern

Materialien aus dem unteren Respirationstrakt

Probenmaterial	Sputum Tracheal-/Bronchialsekret bronchoalveoläre Lavage (BAL) Pleurapunktat Blutkulturen
Indikationen	Bronchitis ambulant bzw. nosokomial erworbene Pneumonie atypische Pneumonie Influenza A/B, SARS-CoV-2 (Corona-Viren) Mykobakteriose/Tuberkulose
Anmerkungen	Probenlagerung Bei 2-8°C lagern; Probe schnellstmöglich einsenden. Hinweis Die Anforderung auf „pathogene Keime“ beinhaltet keinen Nachweis von Legionellen, Mykoplasmen, Chlamydien, Mykobakterien, Pilze, Pneumocystis jirovecii, Bordetella pertussis oder Viren. Diese müssen gesondert angefordert werden. Sputum Am besten geeignet ist Morgensputum (vor dem Frühstück). Den Patienten auf eine korrekte Probengewinnung (Unterschied Sputum/Speichel) hinweisen. Nur aus der Tiefe abgehustetes Material ist Sputum. Möglichst eitriges Sputum einsenden (Ausnahme: Immunsuppression, V.a. Legionellen, Pilz-Pneumonie bzw. Tuberkulose). Bei V.a. Tuberkulose oder Pilz-Pneumonie sollte die Untersuchung an mehreren Tagen - vorzugsweise morgens gewonnener - Sputumproben (mind. 3) durchgeführt werden. Der Befund gibt neben den nachgewiesenen Bakterien/Pilzen auch die in der Probe enthaltenen Zellen an; dabei spricht das Vorhandensein von reichlich Leukozyten bei Fehlen von Plattenepithelien für eine korrekte Sputumgewinnung. Patientenanleitung zur Sputumgewinnung (Mykobakterien-/Tuberkulosedagnostik siehe auch 3.10) Sputum ist das Sekret der Atemwege, das beim Husten in den Rachen gelangt und i.d.R. eitrig aussieht. Speichel aus dem

Mundbereich ist für diese Untersuchung ungeeignet. Vorzugsweise morgens gewonnenes Sputum einsenden.

- 1-2 Std. vor der Sputumgewinnung keine Nahrung aufnehmen.
- Wenn Sie morgens spontan husten müssen, versuchen Sie den dabei entstehenden Auswurf in dem Sputumbehälter aufzufangen. Bitte das Auffanggefäß nur von außen anfassen.
- Können Sie nicht spontan Auswurf abhusten, versuchen Sie tief ein- und auszuatmen. Nach jedem Einatmen den Atem für ca. 3-5 Sek. anhalten. Diesen Vorgang möglichst wiederholen. Durch die Atemarbeit wird die Lunge gut entfaltet und die Produktion von Sputum angeregt.
- Erneut tief Luft holen und versuchen, Sputum abzuhusten.
- Tuberkulosedagnostik: Das Abhusten 2- bis 3-mal wiederholen (möglichst große Probenmenge, 2-5 ml).
- Sputumbehälter sofort beim Personal abgeben, damit die Probe rasch ins Labor transportiert werden kann.
- Sollten Sie kein Sputum aus der Tiefe der Lunge abhusten können, informieren Sie den behandelnden Arzt.

Trachealsekret

Bei beatmeten Patienten mit sterilem Katheter das Sekret so weit wie möglich aus den tiefen Abschnitten des Bronchial-baums aspirieren und in ein steriles Schraubverschlussröhrchen geben (mind. 2 ml). Lagerung bei 2-8°C.

Bronchialsekret

Gewinnung über Bronchoskop, ggf. muss vor der Aspiration eine geringe Menge 0,9%iger NaCl-Lösung ohne anti-bakterielle Zusätze instilliert werden. Unter Sicht gewonnenes eitriges Material aus dem Infektionsherd besitzt eine hohe diagnostische Aussagekraft. Einsendung in sterilem Schraubverschlussröhrchen; Lagerung bei 2-8°C.

Bronchoalveoläre Lavage (BAL)

Die mikrobiologische Diagnostik aus der BAL weist im Vergleich zu der aus Trachealsekret eine höhere Sensitivität und Spezifität auf und kann eher zwischen Kolonisation und Infektion unterscheiden.

Im Mund-Nasen-Rachenraum und der Trachea befindliche Sekretansammlungen vor Einführen des Bronchoskops abgesaugen. Vor Gewinnung der Proben keinen Sog anwenden, da sonst die Kontaminationsgefahr erheblich zunimmt. Anästhesierende Gele können antimikrobiell wirken.

Zur bronchoalveolären Lavage die Spitze des Bronchoskops in das Bronchuslumen einführen und dieses mit der Spitze abdichten. Nach

Materialien aus dem unteren Respirationstrakt

Instillation von bis zu 160 ml 0,9%iger NaCl-Lösung in das Lumen wird die Flüssigkeit portioniert, soweit möglich wieder aspiriert, wobei mind. 50 ml Flüssigkeit wiedergewonnen werden sollten. Das 1. Aspirat wird verworfen (Ausnahme: Suche nach obligat pathogenen Erregern bei abwehrgeschwächten Patienten), das 2. und ggf. folgende Asparate entstammen eher der Lungenperipherie.

In der Pädiatrie werden zur Gewinnung der BAL 3-4 x 1 ml/kg KG (bis max. 50 ml/Portion) vorgewärmte 0,9%ige NaCl-Lösung verwendet. Die zurückgewonnene Flüssigkeit wird zusammengeführt. Davon werden Aliquots zur Erreger-diagnostik und zur zytologischen Diagnostik verwendet.

Einsendung von 20-30 ml in sterilem Schraubverschlussröhrchen; Lagerung bei 2-8°C. Bitte dem Labor die bei der BAL instillierten und zurückgewonnenen Flüssigkeitsmengen auf dem Anforderungsschein mitteilen.

Blutkulturen

Bei schweren Pneumonien Blutkulturen (s. 3.1) zusätzlich zu den Proben aus dem unteren Respirationstrakt einsenden.

Pleurapunktat: siehe Punktate 3.13

Allgemeiner Hinweis (unterer Respirationstrakt)

Materialien aus dem Respirationstrakt (Sputum, Trachealsekret) sind häufig mit Keimen der physiologischen Flora kontaminiert wie z.B. alpha-hämolysierende (vergrünende) Streptokokken, Neisserien und Korynebakterien. Von diesen Keimen wird daher i.d.R. keine Resistenztestung durchgeführt. Bei Nachweis von Enterokokken wird ein Antibiotogramm erstellt (auch um vancomycinresistente Enterokokken zu identifizieren). Bei Nachweis potentiell pathogener Keime wie z.B. *Pseudomonas* spp., Enterobacterales (z.B. *E. coli*, *Klebsiella*) und *Staphylococcus aureus* kann es sich um eine Kolonisation ohne vorliegende Infektion handeln. Bei Vorhandensein einer entsprechenden klinischen Symptomatik und Disposition sollen diese Keime jedoch in eine Antibiose mit eingeschlossen werden.

Materialien aus dem Zentralnervensystem (ZNS)	
Probenmaterial	Liquor, Abszessmaterial, Biopsate Shuntliquor Bei V.a. Shuntinfektion wird unter aseptischen Bedingungen Liquor aus ventrikuloperitonealem, ventrikuloatrialem Shunt bzw. aus externer Ableitung durch Shuntpunktion gewonnen. Abszessmaterial Abszessaspirat in einer luftfrei verschlossenen Spritze innerhalb kürzester Zeit einsenden, da in vielen Fällen Anaerobier eine ätiologische Rolle spielen. Abstriche sind für die Diagnostik von Hirnabszessen nur bedingt geeignet. Steht nur wenig Eitermaterial zur Verfügung und können deshalb nur Abstriche gewonnen werden, ist der Abstrichtupfer in einem Transport-medium einzusenden.
Indikationen	Meningitis, Enzephalitis, Meningoenzephalitis, Hirnabszess
Anmerkungen	Hinweis zur Entnahme Zusätzlich zu einer Liquorpunktion sollten vor Beginn der Antibiotikatherapie Blutkulturen entnommen werden, siehe 3.1. Die Liquorpunktion muss unter streng aseptischen Bedingungen erfolgen. Anzahl der zur Diagnostik benötigten Liquorproben: Probe (mind. 2 ml) - Bakteriologie Probe (mind. 1-3 ml) - Bakterien-/Viren-PCR (Probenmenge je nach Anforderungsumfang) Nativen Liquor für die bakteriologische Untersuchung bei Raumtemperatur und NICHT im Kühlschrank lagern. Schnellstmöglicher Probentransport ins Labor.
M. Basedow	
Probenmaterial	1 ml Serum
Medikamenten-induzierter systemischer LE	
Probenmaterial	1 ml Serum
Melisse	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	siehe Befund

Melperon im Serum°

Probenmaterial	Serum ohne Gel
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	30 - 100 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: MELP Ansatztage: Di., Do. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden.

Metamizol°

Probenmaterial	Serum						
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)						
Normalwerte	Therapeutischer Bereich: 1,6 - 2,7 mg/l						
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: METAMI Ansatztage: Mo., Mi., Fr. <table><tr><td>Analysengruppen</td><td>Analgetika (nicht opioide Analgetika), Pyrazolonderivate</td></tr><tr><td>Bemerkungen</td><td>Als 4-Aminoantipyrin. HWZ 2,4 -5 Std. Serum: Bei oraler Gabe von 1g Metamizol-Natrium nach 3-7 Std. Siehe 4-Methylaminopyrin.</td></tr><tr><td>Präanalytik</td><td>Stabilität: 3 Wochen bei 2 - 8 °C</td></tr></table>	Analysengruppen	Analgetika (nicht opioide Analgetika), Pyrazolonderivate	Bemerkungen	Als 4-Aminoantipyrin. HWZ 2,4 -5 Std. Serum: Bei oraler Gabe von 1g Metamizol-Natrium nach 3-7 Std. Siehe 4-Methylaminopyrin.	Präanalytik	Stabilität: 3 Wochen bei 2 - 8 °C
Analysengruppen	Analgetika (nicht opioide Analgetika), Pyrazolonderivate						
Bemerkungen	Als 4-Aminoantipyrin. HWZ 2,4 -5 Std. Serum: Bei oraler Gabe von 1g Metamizol-Natrium nach 3-7 Std. Siehe 4-Methylaminopyrin.						
Präanalytik	Stabilität: 3 Wochen bei 2 - 8 °C						

Metanephrin															
Probenmaterial	EDTA-Plasma GEFROREN! Bei gleichzeitiger Anforderung von Aldosteron und Renin bitte ein separates Röhrchen einsenden. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Einsendung von Katecholaminen im Plasma														
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)														
Normalwerte	Für Kinder bis 4 Jahren liegen uns keine validierten Cut-Offs vor. Orientierend kann die Entscheidungsgrenze für Kinder und Jugendliche von <0,333 nmol/l herangezogen werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Referenzbereich (nmol/l)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 - 17 Jahre</td><td>< 0,333</td></tr> <tr> <td>18 bis 29 Jahre</td><td>< 0,264</td></tr> <tr> <td>30 bis 39 Jahre</td><td>< 0,304</td></tr> <tr> <td>40 bis 49 Jahre</td><td>< 0,324</td></tr> <tr> <td>50 bis 59 Jahre</td><td>< 0,375</td></tr> <tr> <td>> 60 Jahre</td><td>< 0,358</td></tr> </tbody> </table> Für ältere Patienten mit Niereninsuffizienz (mindestens Stage 3) bzw. Hämodialyse kann gemäß Pamporaki et al.* ein Cut-Off von <0,417 nmol/l herangezogen werden.		Referenzbereich (nmol/l)	5 - 17 Jahre	< 0,333	18 bis 29 Jahre	< 0,264	30 bis 39 Jahre	< 0,304	40 bis 49 Jahre	< 0,324	50 bis 59 Jahre	< 0,375	> 60 Jahre	< 0,358
	Referenzbereich (nmol/l)														
5 - 17 Jahre	< 0,333														
18 bis 29 Jahre	< 0,264														
30 bis 39 Jahre	< 0,304														
40 bis 49 Jahre	< 0,324														
50 bis 59 Jahre	< 0,375														
> 60 Jahre	< 0,358														
Indikationen	Phäochromozytom- und Neuroblastom-Diagnostik														
Anmerkungen	Analyt Kürzel: METAP2 Ansatztage: 1 x / Woche Mo. Am Tag vor Blutentnahme bitte auf Alkohol, Kaffee und Nikotin sowie Verzehr von Käse, Früchten und Nüssen verzichten. Hinweis: Der Abbau der Katecholamine in die entsprechenden Metanephrine erfolgt in moderatem Umfang auch in der entnommenen Probe, sodass in Plasma, welches bei Raumtemperatur bzw. gekühlt eingesandt wird, gehäuft grenzwertig erhöhte Metanephrine gemessen werden. Nach der Blutentnahme sollte die Probe umgehend zentrifugiert und das Plasma separiert und tiefgefroren werden. Bitte beachten Sie, dass die Körperlage einen merklichen Einfluss auf die Wertelage haben kann. Der Entnahme sollte eine Ruhephase von 20 bis 30 Minuten liegend vorausgehen. Es empfiehlt sich, die Kanüle bereits vorab zu legen, um eine stressfreie Blutentnahme zu gewährleisten. Viele Arzneistoffe beeinflussen die Ausschüttung von Katecholaminen und damit ihrer Metaboliten, den Metanephrinen.														

Metanephrin	
	Hierzu zählen vor allem Psychopharmaka und Antihypertensiva wie trizyklische Antidepressiva, MAO-Inhibitoren, DOPA-Derivate, α -Blocker, β -Blocker, Diuretika (hochdosiert), ACE-Hemmer und Clonidin sowie abschwellende Nasentropfen und Theophyllin. Sofern klinisch vertretbar ist eine mindestens 14-tägige Medikamentenpause vor der Blutentnahme zu empfehlen.
Metanephrin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin gesammelt über 10 ml HCl
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Kinder altersabhängig < 341 $\mu\text{g/d}$
Indikationen	Katecholaminmetabolit s. auch VMS keine Dopaminpräparate
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: META Ansatzzeit: 1 - 2 x je Woche Aus 24-Std.-Menge, gesammelt über 5-10 mL Eisessig. Mind. 4 Std. vor der Blutentnahme keine coffeinhaltigen Nahrungs- oder Genußmittel, keinen Tee, Alkohol oder Nicotin, bzw. keine stärkere körperliche Betätigung.
Methadon° im Haar	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang)
Methadon° im Serum	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	FPIA (Floureszenz-Polarisations-Immunoassay)/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich DL-Methadon 50 – 1000 ng/ml DL-Methadon toxisch ab ca. 1000 ng/ml therap. Bereich L-Methadon 80 – 200 ng/ml L-Methadon toxisch ab ca. 500 ng/ml
Indikationen	Drogenanalytik; Substitutionstherapie Einnahmekontrolle. Halbwertszeit bis 60 h
Anmerkungen	Methadon wird als Substitutionsdroge bei Heroin/Morphinsüchtigen eingesetzt ° Fremdleistung

Methadon° im Urin	
Probenmaterial	5 ml Urin
Methode	GC-MS (Gaschromatographie-Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 1 – 50 mg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Methadon° im Urin und Serum	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/ GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Methämoglobin°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 1 % des Ges. Hb
Indikationen	Toxische Methämoglobinämie Hereditäre Methämoglobinämie
Anmerkungen	° Fremdleistung
Methionin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, GEFROREN!
Normalwerte	12 - 32 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Methotrexat (MTX)°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	bei hochdosierter Therapie < 10 µmol/l nach 24 h bei hochdosierter Therapie < 1 µmol/l nach 48 h bei hochdosierter Therapie < 0.1 µmol/l nach 72 h bei niedrigdosierter Therapie 0.2 – 0.9 µmol/l nach 2 h bei niedrigdosierter Therapie 0.1 – 0.4 µmol/l nach 4 h bei niedrigdosierter Therapie ca. 0.1 µmol/l nach 24 h
Indikationen	Zytostatikum Medikamentenspiegel
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden! ° Fremdleistung

Methsuximid als N-Desmethyl-Methsuximid	
Probenmaterial	2 ml Serum BE morgens vor Einnahme
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich: 10 – 40 µg/ml toxisch > 45 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum z.B. Petinutin® max. Spiegel: 1 h nach letzter Dosis
Methylen-Tetrahydrofolat°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	Molekulargenetische Untersuchung
Indikationen	Hyperhomocysteinämie (atherogenes Risiko) Risikofaktor für arterielle und venöse Gefäß-Reduktase-Mangel verschlüsse
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. ° Fremdleistung
Methylhippursäuren gesamt (ortho-, meta-, para)°	
Probenmaterial	Urin
Methode	GC (Gaschromatographie)
Normalwerte	Nachweisgrenze 0,01 g/l
Indikationen	Xylol-Belastung
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: MHIPO; MHIPM; MHIPP Ansatz tage: 1 x je Woche Urin vom Expositions- bzw. Schichtende Stabilität bei 2-8 °C 3-4 Wochen

Methylhistamin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin aus 24-Std-Menge gesammelt über 10 ml Eisessig
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	siehe Bericht
Indikationen	Metabolit von Histamin, erhöht nach kurzfristiger Histaminfreisetzung
Anmerkungen	Anaphylaktische Reaktionen, Mastozytom, Systemische Mastozytose, CML, Polycythämia vera. Manche endokrine Tumoren bilden in großen Mengen Histamin (Karzinome des Magens und Dünndarms). Vor der Probenentnahme müssen Nahrungsmittel mit hohem Histamingehalt wie z.B. Käse, Rotwein und Sauerkraut vermieden werden. ° Fremdleistung
Methylmalonsäure°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	8,6 - 32 µg/ml
Indikationen	Abklärung grenzwertig verminderter Vitamin B12-Befunde (latenter Vitamin B12-Mangel). Kinder: Verdacht auf Methylmalonazidurie, bei Trinkschwäche, Gedeihstörung, Erbrechen, Krampfanfällen im Neugeborenen-Alter.
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: MMAL Ansatztage: bei Bedarf Die Bestimmung der Methylmalonsäure dient dem Nachweis von intrazellulärem Mangel an Vitamin B12 bei grenzwertigen B12-Werten. Bei intrazellulärem Mangel an Vitamin B12 kommt es zur Konzentrationserhöhung von Methylmalonsäure im Blut bzw. einer erhöhten Ausscheidung im Urin. Diese Erhöhung ist bereits messbar, wenn die Vitamin B12-Konzentration u. U. noch in einem Graubereich liegt. Erhöhte MMS-Werte im Serum finden sich auch bei • Nieren-Insuffizienz/chronischen Nieren-Erkrankungen • Methylmalonazidurie Weiterführende Analysen: Vitamin B12 und Holotranscobalamin

Methylphenidat° (Ritalin®)	
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Kinder und Jugendliche: 6-26 ng/ml Toxisch ab 50 ng/ml Erwachsene: 12-79 ng/ml Toxisch ab 50 ng/ml
Indikationen	Medikamentenspiegel
Anmerkungen	Abnahme ca. 2-3 Std. nach oraler Gabe biol. Halbwertszeit nur 2 h Die therapeutischen Bereiche gelten bei Blutentnahme zwei Stunden nach Einnahme von 20 mg einer schnellfreisetzenden bzw. vier bis sechs Stunden nach 40 mg einer retardierten Formulierung (Spitzenspiegel). Analyt instabil; Proben stets gefroren versenden. ° Fremdleistung
Metoclopramidtest-Prolaktin-Stimulationstest	
Probenmaterial	Blutentnahmen: 1. Basalwert, im Bolus i.v. Gabe von 10 mg Metoclopramid, Prolaktin danach, weitere Blutentnahmen nach 30, 45 und 60 Minuten
Normalwerte	2 - 5 fache Steigerung gilt als physiologisch
Indikationen	Bei V.a. Hypophyseninsuffizienz, Test sollte wegen zirkadianer Rhythmik zw. 8 - 10 h durchgeführt werden. Bester Zykluszeitpunkt ist die Lutealphase.
MI-2-Autoantikörper°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	< 7 U/ml grenzwertig 7 – 10 U/ml
Indikationen	Polymyositis, Dermatomyositis Zusatztest bei pos. ANA (granuläres Muster)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Mianserin°	
Probenmaterial	2 ml Serum keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	15 – 70 ng/ml toxisch ab ca. 140 ng/ml
Indikationen	Antidepressivum
Anmerkungen	° Fremdleistung

Midazolam°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Behandlung von Krampfanfällen, bei Anwendung über Mundhöhle je nach Dosis folgende mittlere maximalen Serumspiegel: Dosis 2,5 mg (3 Mon-1 Jahr): 104 ng/ml Dosis 5,0 mg (1-5 Jahre): 148 ng/ml Dosis 7,5 mg (5-10 Jahre): 140 ng/ml Dosis 10 mg (10-18 Jahre): 87 ng/ml Anwendung als Narkotikum/Langzeitsedierung: Sedation: 50-100 ng/ml Amnesie: ca. 100 ng/ml zuverlässige Bewusstlosigkeit: 400-500 ng/ml
Indikationen	Medikamentenspiegel
Anmerkungen	Auswahl Medikamente: BUCCOLAM®, Dormicum® Halbwertszeit (HWZ): 1 Std. ° Fremdleistung
Mikroalbumin im Urin	
Probenmaterial	24 h- Sammelurin
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	< 20 mg/l
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ALBM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Mikrozytäre Erythrozyten	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 5 %
Indikationen	Vitamin B12 oder Folsäure Mangel
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ERYM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
mikrozytär/hypochrom-Quotient	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	Normal 0.7-0.9 Eisenmangel < 0.9 Thalassämie > 0.9
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MHQ Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Milnacipran	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	100 - 150 µg/l toxisch > 300 µg/l
Indikationen	Die biologische Halbwertszeit von Milnacipran beträgt 5-8 h. Der Referenzbereich bezieht sich auf eine empfohlene Tagesdosis von 100 mg Milnacipran.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MILN Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 5 - 8 Std.

Mirtazapin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 30-80 ng/ml toxischer Bereich: ab 160 ng/ml Präanalytik: Der therapeutische Bereich bezieht sich auf den Talspiegel (Blutentnahme unmittelbar vor Verabreichung der nächsten Dosis). Abnahme im Steady State empfohlen.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MIRT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnehmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikerische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Die Maximale Plasmakonzentration findet sich nach ca. 2 h. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.(1-2 Wochen nach Therapiebeginn); Biologische Halbwertszeit 20 - 40 Std. Der Metabolit Nor-Mirtazapin ist pharmakologisch nicht aktiv.

Mischallergene	
Probenmaterial	1 bis 5 ml Serum
Methode	(CAPs beladen mit jeweils 4-6 Allergenen)
Anmerkungen	die Mischallergen-Cups sprechen auf 4-6 rel. häufige Einzelallergene an, bei positivem Ergebnis empfiehlt sich die Untersuchung auf Einzelallergene. Der Allergieanforderungsbogen beinhaltet eine Vielzahl von Einzelallergenen in verschiedenen Gruppen: Mikroorganismen und rekombinante Allergene (Mikroorganismen) Nahrungsmittel und rekombinante Allergene von Nahrungsmitteln: Cerealien, Nüsse, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Gewürze, Milch und Milchprodukte, Hühnerei, Fleischsorten, Fische, Muscheln, Schalentiere, rekombinante Allergene (Nahrungsmittel), sonstige Nahrungsmittel Pflanzliche Allergene Gräser- und Getreidepollen, Kräuterpollen, Baumpollen und rekombinante (pflanzliche) Allergene Sonderallergene: weitere Allergene auf Anfrage Allergenspezifische IgG-Antikörper: Therapieverlaufsbeobachtungen (z. B. SIT - spezielle Immuntherapie), Exogen-allergische-Alveolitis, Nahrungsmittelintoleranz. Erfasst werden sensibilisierende und blockierende Ak sowie Ak bei Typ III Reaktion.

mittleres Thrombozytenvolumen	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Thrombozytenzahlen und MPV (mean platelet volume) von Hunden der Rasse Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), gruppiert anhand der An- oder Abwesenheit der Mutation im β 1-Tubulin: • genotypisch gesund: Thrombozytenzahl: 366 x 1000/μl (+/-148); MPV: 12 fl +/- 2,2 • genotypisch heterozygoter Defekt: Thrombozytenzahl: 196 x 1000/μl (+/- 64); MPV: 16,5 fl +/-3,2 • genotypisch homozygoter Defekt: Thrombozytenzahl: 74 x 1000/μl (+/- 36); MPV: 28 fl +/- 5,7 (Davis et al. J Vet Intern Med 2008;22:540-545)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MTV Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Das mittlere Thrombozytenvolumen (MPV) bezeichnet das durchschnittliche Volumen des einzelnen Thrombozyten gemessen in Femtolitern (fl). Ein erhöhter MPV kann auf eine gesteigerte Thrombopoese hinweisen. Erhöhte Werte sind auch beschrieben bei Lagerung in EDTA, Knochenmarksneoplasien und FeLV-Infektionen. Klassisch sind hohe mittlere Thrombozytenvolumina zudem bei der kongenitalen Makrothrombozytopenie des Cavalier King Charles Spaniels, wobei die Anzahl der Thrombozyten in Kombination mit dem MPV gewisse Rückschlüsse auf einen heterozygoten oder homozygoten Trägerstatus zulassen. Der Parameter ist Bestandteil des Blutbildes, die Befundung erfolgt ggf. gezielt im Einzelfall.

Mittleres zelluläres Hämoglobin

Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in pg
	0 - 3 Tage	31,5 - 39,5 pg
	4 - 14 Tage	30,0 - 39,0 pg
	15 - 29 Tage	27,5 - 36,5 pg
	30 - 59 Tage	2,0 - 35,0 pg
	2 - 3 Monate	26,0 - 33,0 pg
	4 - 6 Monate	24,5 - 33,0 pg
	7 - 11 Monate	23,0 - 31,5 pg
	12 - 24 Monate	23,5 - 31,0 pg
	2 - 4 Jahre	24,0 - 31,0 pg
	5 - 6 Jahre	24,5 - 31,0 pg
	7 - 11 Jahre	25,0 - 31,5 pg
	12 - 15 Jahre	26,0 - 32,5 pg
	16 - 17 Jahre	26,5 - 33,0 pg
	18 - 65 Jahre	27,0 - 33,5 pg
	ab 66 Jahre	27,0 - 34,0 pg
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MCH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Mittleres Zellvolumen		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in %
	0 - 3 Tage	96 - 124 %
	4 - 14 Tage	91 - 124 %
	15 - 29 Tage	86 - 118 %
	30 - 59 Tage	80 - 111 %
	2 - 3 Monate	80 - 103 %
	4 - 6 Monate	76 - 103 %
	7 - 24 Monate	72 - 93 %
	2 - 4 Jahre	73 - 91 %
	5 - 6 Jahre	74 - 89 %
	7 - 11 Jahre	76 - 91 %
	12 - 15 Jahre	78 - 93 %
	16 - 17 Jahre	79 - 96 %
	18 - 65 Jahre	80 - 99 %
	ab 66 Jahre	80 - 101 %
Anmerkungen	siehe: kleines Blutbild	
	Analyt Kürzel: MCV Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Mittlere zelluläre Hämoglobinkonzentration

Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in g/dl
	0 - 3 Tage	29,5 - 36,0 g/dl
	4 - 14 Tage	29,0 - 35,5 g/dl
	15 - 29 Tage	29,0 - 35,5 g/dl
	1 - 3 Monate	29,0 - 35,5 g/dl
	4 - 6 Monate	29,5 - 35,0 g/dl
	7 - 24 Monate	30,0 - 35,0 g/dl
	2 - 4 Jahre	30,0 - 35,5 g/dl
	5 - 6 Jahre	31,0 - 36,0 g/dl
	7 - 17 Jahre	31,5 - 36,0 g/dl
	ab 18 Jahre	31,5 - 36,0 g/dl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MCHC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Moclobemid

Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Ber.: 300-1000 ng/ml kritisch ab: 2000 ng/ml
Indikationen	Diskrepanz Medikamentendosierung und Serumspiegel, fehlende Medikamentenwirkung, unerwartete Nebenwirkungen (UAW), Dosisanpassungen
Anmerkungen	Halbwertszeit (HWZ): 1 - 7 h, Auswahl Medikamente: Aurorix®

Modifizierte Ratio bei Niereninsuffizienz

Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	0.37 - 3.1

Molekulargenetische Analyse des GCDH-Gens Glutaryl-CoA-Dehydrogenase°	
Probenmaterial	EDTA Blut
Methode	Next-Generation Sequencing, NGS
Normalwerte	Kein Hinweis auf eine potentiell Pathogene, klinisch relevante Veränderung
Indikationen	V.a. Glutarazidurie Typ 1
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: G6A Ansatztage: nach Bedarf Interpretation: Der Glutaryl-CoA-Dehydrogenase (GCDH)-Mangel (Glutarazidurie Typ1, GA1) ist eine autosomalrezessiv erbliche neurometabolische Störung und klinisch gekennzeichnet durch enzephalopathische Krisen mit Striatum-Läsionen und schwerer dystonisch-dyskinetischer Bewegungsstörung. Entsprechend dem Gendiagnostikgesetz (GenDG) soll bzw. muss der untersuchten Person bei der Ergebnismitteilung der genetischen Diagnostik eine genetische Beratung angeboten werden (§ 10 Abs.1 GenDG).
Mononukleose-Schnelltest	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	AGG
Normalwerte	negativ
Indikationen	Nachweis heterophiler Ak bei 80% der prim. EBV-Infektion
Anmerkungen	bei positivem Nachweis sollte als Bestätigung die Bestimmung der erregerspezifischen Ak erfolgen; bei Kleinkindern häufig negativ Epstein-Barr-Virus Humane Herpes-Viren (HHV Typ 4) Inkubationszeit: 30 - 50 Tage. Fieberhafter Infekt mit zervikaler Lymphknotenschwellung, Tonsillitis, Pharyngitis, Hepatosplenomegalie. Nach Infektion persistiert das Virus lebenslang in ruhenden B-Zellen, Reaktivierung möglich. Assoziation mit Nasopharyngealkarzinom, Burkitt-Lymphom sowie andere Tumore möglich (z.B. NHL - Non Hodgkin Lymphom, Morbus Hodgkin). Schwerwiegende Komplikationen (z.B. Meningoenzephalitis, Myokarditis, Pneumonie) sind selten.

Monozyten		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in %
	1 - 2 Tage	3,0 - 15,0 %
	3 - 13 Tage	3,5 - 17,5 %
	14 - 29 Tage	2,5 - 17,0 %
	1 - 2 Monate	2,5 - 15,0 %
	3 - 5 Monate	2,0 - 13,5 %
	6 - 12 Monate	2,0 - 12,0 %
	1 - 2 Jahre	1,5 - 10,5 %
	3 - 4 Jahre	1,5 - 9,0 %
	5 - 14 Jahre	1,5 - 8,5 %
	15 - 17 Jahre	2,0 - 9,0 %
	ab 18 Jahre	2,0 - 9,5 %
Anmerkungen	siehe: Differential Blutbild	
	Analyt Kürzel: MONO Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Monozyten absolut		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in x 1000/µl
	0 - 14 Tage	0,20 - 2,50
	15 - 29 Tage	0,20 - 2,30
	1 - 3 Monate	0,25 - 1,90
	4 - 6 Monate	0,25 - 1,70
	7 - 11 Monate	0,20 - 1,45
	1 - 2 Jahre	0,15 - 1,20
	3 - 4 Jahre	0,10 - 1,10
	5 - 6 Jahre	0,10 - 1,00
	7 - 15 Jahre	0,10 - 0,95
	ab 16 Jahre	0,10 - 0,90
	Anmerkungen	Analyt Kürzel: MONOA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Morphin	
Probenmaterial	5 ml Urin 2 ml Serum
Methode	immunologisch/HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)/GC (Gaschromatographie)/MS (Massenspektrometrie)
Normalwerte	Nachweisgrenze s. Bericht
Morphin	
Probenmaterial	fingerdickes Haarbüschel
Methode	GC/MS
Normalwerte	Nachweisgrenze 0.1 ng/mg
Anmerkungen	ggf. Schnittstelle am Büschel markieren (Anfang)
M. pneumoniae-PCR°	
Probenmaterial	Tiefer Nasopharyngealabstrich mit Spezialabstrichbesteck, Sputum, Trachealsekret, Bronchialsekret /-lavage
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	V.a. akute Infektion
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage
MPO-AK (Myeloperoxidase-Autoantikörper)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 3,5 U/ml grenzwertig 3,5 - 5,0 U/ml positiv > 5,0 U/ml
Indikationen	Vaskulitis, mikroskopische Polyangitis, Churg-Strauss-Syndrom, Goodpasture-Syndrom
Anmerkungen	Radiologie Analyt Kürzel: MYPEW Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

MTHFR-Genmutation°	
Probenmaterial	EDTA-Blut: 1-2 ml
Methode	PCR und Schmelzpunktanalyse (Lightcycler) der Nukleotide 677 und 1298
Indikationen	Hyperhomocysteinämie als atherogenes Risiko, Risikofaktor für arterielle und venöse Gefäßverschlüsse, Methotrexat-Unverträglichkeit
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: A1298C Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. Methylen-Tetrahydrofolat Reduktase-Mangel (MTHFR)
Mucor spp.	
Methode	Kultureller Nachweis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 2 Wochen
Mumps-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 70 U/ml grenzwertig 70 – 100 U/ml positiv > 100 U/ml
Indikationen	Immunitätsabklärung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MUEG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf

Mumps-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv > 10 U/ml
Indikationen	Diagnose einer akuten Infektion bei Parotitis, Orchitis, Salpingitis, Meningitis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MUEM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Mumps im Liquor IgG, IgM°	
Probenmaterial	Liquor, für Indexbestimmung taggleiches Serum erforderlich
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0.7 - 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Anmerkungen	° Fremdleistung siehe Liquordiagnostik
Mumps-RNA-PCR°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril) separates Röhrchen Rachenabstrich Urin
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	frische Infektion
Anmerkungen	° Fremdleistung
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum	
Methode	Kultureller Nachweis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 7 Tage Erreger des Urogenitaltrakts von Erwachsenen Infektion häufig durch sexuellen Kontakt

Mycoplasma pneumoniae-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	Kinder altersabhängig negativ < 20 U/ml grenzwertig 20 – 30 U/ml positiv > 30 U/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MYKG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Mycoplasma pneumoniae-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 13 U/ml grenzwertig 13 – 17 U/ml positiv > 17 U/ml
Indikationen	V.a. akute Infektion; atypische Pneumonie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MYKM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Mycoplasma pneumoniae PCR°	
Probenmaterial	1. Wahl: Tiefer Nasopharyngealabstrich (spez. dünne, flexible Abstrichbürste kann im Labor angefordert werden), BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage
Myelin Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	idiopathische Polyneuritis (Guillain-Barré)
Anmerkungen	° Fremdleistung
Myeloperoxidase-Index	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	-20 - 20
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MPXI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

Probenmaterial	Untersuchungsmaterial	Menge	Probengewinnung / Transport
	Sputum (steriles 50 ml-Röhrchen)	2-5 ml	Gewinnung: durch Abhusten aus den tiefen Atemwegen; Speichel und 24 Std.-Sammelsputum sind ungeeignet. Es ist lediglich zulässig, Sputum aus mehreren Hustenstößen innerhalb 1 Std. in einem Gefäß aufzufangen. Gewinnung möglichst morgens nüchtern vor dem Zähneputzen oder Gurgeln, um Kontamination mit Nicht-Tuberkulösen Mykobakterien (NTM) aus dem Leitungswasser zu vermeiden. Alternativen, wenn kein Sputum abgehustet werden kann: 1. Erwachsene und Jugendliche: Bronchoskopie 2. Kleine Kinder: Gewinnung von Magennüchternsekret oder -spülwasser 3. Sputuminduktion durch Inhalation von 5-10%iger NaCl-Lsg.; Vorsicht: Infektionsgefahr des Personals durch Aerosolbildung Bei Erwachsenen ist die Bronchoskopie, bei Kindern Magennüchternsekret oder -spülwasser der Sputuminduktion vorzuziehen.
	Bronchialsekret (steriles 50 ml-Röhrchen)	2-5 ml	Bronchoskopische Gewinnung; Trachealsekret

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

			von intubierten Patienten oder Patienten mit Trachealtubus ist weniger sinnvoll.
	Bronchoalveoläre Lavage (BAL) (steriles 50 ml-Röhrchen)	20-30 ml	Gezielt in der Nähe verdächtiger Herde
	Geschützte Bürste bzw. bronchoskopisch gewonnene Biopsien (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)		Wegen der Gefahr der Austrocknung ca. 1 ml sterile 0,9%ige NaCl-Lsg. zusetzen.
	Pleurapunktat (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	Entnahme einer möglichst großen Probenmenge, da in diesen Proben Mykobakterien oft nur in sehr geringen Mengen vorkommen. Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulanzen erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulanzen richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
	Magennüchternsekret Magenspülwasser (steriles 50 ml-Röhrchen mit vorgelegtem Phosphatpuffer zur Neutralisierung der Magensäure)	2-5 ml 20-30 ml	Bei kleinen Kindern Magennüchternsekret/-spülwasser entnehmen; bei Jugendlichen und Erwachsenen Sputum oder bronchoskopisch gewonnene Proben vorziehen; Transportröhrchen mit vorgelegtem Phosphatpuffer verwenden.

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

			Gewinnung: Morgens nüchtern vor dem Zähneputzen oder Gurgeln, um Kontamination mit Nicht-Tuberkulösen Mykobakterien (NTM) aus dem Leitungswasser zu vermeiden.
	Urin (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	Morgenurin nach Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr am Vorabend; kein 24 Std.-Sammelurin, nicht aus Urinauffangbeuteln, bei Säuglingen können Einmalklebebeutel verwendet werden
	Menstrualblut (wenig sensitiv!) (steriles 50 ml-Röhrchen) Ausschabungsmaterial (viel aussagekräftiger!) (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)	2 ml	Gynäkologisch gewonnenes Menstrualblut etwa zu gleichen Teilen mit sterilem Aqua dest. versetzen. So viel Untersuchungsgut wie möglich. Immer mikroskopisch, kulturell, molekularbiologisch sowie histologisch untersuchen!
	Untersuchungsmaterial	Menge	Probengewinnung / Transport
	Sperma, Prostatasekret (steriles 30 ml-Röhrchen)	2 ml	In sterilen Probengefäßen auffangen, ohne Zusatz versenden.
	Liquor (steriles 30 ml-Röhrchen)	3-5 ml	Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

			Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
	Sonstige Körperflüssigkeiten aus primär sterilen Kompartimenten Punktat / Aspirat / Exsudat (steriles 50 ml-Röhrchen)	30-50 ml	Entnahme einer möglichst großen Probenmenge, da in diesen Proben Mykobakterien oft nur in sehr geringen Mengen vorkommen. Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
	Knochenmark Biopsat / Aspirat (steriles 50ml-Röhrchen)		Blutige Proben können evtl. den Zusatz von Citrat als Antikoagulans erforderlich machen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
	Gewebe, Biopsat (steriles Schraubverschluss-Röhrchen)		So viel Untersuchungsgut wie möglich (möglichst mehrere steril entnommene Gewebeproben) gewinnen. Bei V.a. auf Mykobakteriose der Haut: Wund-/Ulkusbereich sowie angrenzende

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

			Hautareale gründlich desinfizieren. Vom Wundrand 1 cm lange Gewebespindel oder mind. 4 mm Stanzbiopsie, die jeweils bis in die Subkutis reichen, entnehmen. Zur Vermeidung einer Kontamination mit Hautflora ist der unmittelbare Übergang zu nicht betroffener Haut von der Probenentnahme auszuschließen. In einer adäquaten Menge steriler 0,9%iger NaCl-Lsg. transportieren. Nicht mit Formalin fixieren! Gewebe/Biopsate sollten immer mikroskopisch, kulturell, molekularbiologisch sowie histologisch untersucht werden.
	Blut	5-10 ml	Nur sinnvoll bei Patienten mit schwerem zellulären Immundefekt z.B. Organ-/ Knochenmarkstransplantierte, HIV-Patienten mit V.a. M. avium-Sepsis Abnahme in Citrat-Röhrchen; nicht in Blutkulturflasche einspritzen. Zusatz von Antikoagulanzen: Die Auswahl des Antikoagulans richtet sich nach der gewünschten Diagnostik. Heparin hemmt die PCR, EDTA wirkt bakterizid (nicht geeignet für Kultur), Citrat ist universell einsetzbar.
	Stuhl (Stuhlröhrchen)		Stuhlproben sind zum Nachweis von Mykobakterien

Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik°

		(auch MOTT) nicht optimal geeignet. Alternative Probenentnahme: Darmbiopsie - Nur sinnvoll bei Patienten mit zellulärem Immundefekt z.B. HIVPatienten mit V.a. Nicht-Tuberkulöse Mykobakterien (NTM) - Bei V.a. Darmtuberkulose sind Biopsien möglichst aus Darmgeschwüren einschmelzender Peyer-Plaques zu entnehmen.
	Abstrichtupfer	Abstrichtupfer sind zum Nachweis von Mykobakterien im Regelfall nicht geeignet. Alternative Probenentnahmen: Aspiration, Punktion, Biopsie, Geschabsel (so viel Untersuchungsgut wie möglich).
Indikationen	Pulmonale/extrapulmonale Tuberkulose, Infektion durch Nicht-Tuberkulöse Mykobakterien (NTM)	
Anmerkungen	Im Rahmen der Mykobakterien-/Tuberkulose-Diagnostik werden der mikroskopische Nachweis von säurefesten Stäbchen, der kulturelle Nachweis von Mykobakterien sowie die Mycobacterium-tuberculosis-Komplex-PCR angeboten. Diagnosestellung: Je nach Material mind. 3 Proben von 3 verschiedenen Tagen (optimal: 3x Kultur + PCR von 1. Probe; falls PCR negativ PCR auch von den anderen beiden Proben) ° Fremdleistung Bioscientia Ingelheim	

Mykoplasmen / Ureaplasmen

Methode	Kultur
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 7 Tage Der Nachweis von Mykoplasmen und Ureaplasmen erfordert einen gesonderten Zielauftrag, da die Anzucht nur auf speziellen Nährmedien möglich ist. Weitere Informationen unter Materialien aus dem Genitaltrakt.

Mykoplasmen / Ureaplasmen STD (sexual transmitted disease)

Probenmaterial	Untersuchungsmaterial Frau Urethralabstrich bzw. morgendlicher Erststrahlurin (V.a. Urethritis), Mittelstrahlurin (V.a. Pyelonephritis), Zervikalabstrich, Douglaspunktat, Fruchtwasser, Tuben- und Endometriumabstrich. Vaginalabstriche sind ungeeignet. Untersuchungsmaterial Mann Urethralabstrich bzw. morgendlicher Erststrahlurin (V.a. Urethritis), Mittelstrahlurin (V.a. Pyelonephritis), Ejakulat, Prostataexprimat.
Methode	Kultur
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 7 Tage Da Mykoplasmen/Ureaplasmen eine deutliche Zytoadhärenz zeigen, sind zellreiche Abstriche wichtig. Es sind Abstrichtupfer mit Amies-Transportmedium zu verwenden. Da es sich um den Nachweis empfindlicher Erreger handelt, sollte die Probe spätestens innerhalb von 24 Std. ins Labor gebracht werden.

Myoglobin

Probenmaterial	1 ml Serum				
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)				
Normalwerte	Frauen < 58 ng/ml Männer < 72 ng/ml				
Indikationen	Herzinfarkt Skelettmuskelerkrankungen Marker in der Sportmedizin				
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MYOG Ansatz tage: täglich Mo. - Fr.				
	Material	Lagerung/Stabilität			Probenmenge
		-20 °C	2 - 8 °C	RT	
	Serum(MYOG)	12 Monate	14 Tage	8 Tage	100µl

Myoglobin im Urin°	
Probenmaterial	Urin
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 21 µg/l
Indikationen	Marker für prärenale Proteinurie
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: MYOU Ansatztage: täglich Mo. - Sa. Urin: Myoglobinbestimmung bei einem pH-Wert < 6,5 nicht sinnvoll.
Myositis°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: MYSG Ansatztage: täglich, Mo. - Fr.
Nachweis von Würmern und Protozoen im Stuhl	
Methode	Mikroskopie/ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage
Nagelspäne/Hautgeschabsel - Dermatophyten°	
Methode	Mikroskopie, Kulturanlage, Keimidentifizierung, Dermatophyten-PCR
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: DERM Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Probengewinnung: Nägel und Haut mit 70% Ethanol desinfizieren. Lockere Borken entfernen. Haut: mit sterilem Skalpell oder scharfem Löffel vom Läsionsrand der Haut 20-30 Schüppchen lösen. Nagel: mit sterilem Skalpell, scharfem Löffel oder Fräse Material aus den befallenen Arealen der Nagelplatte (Rand der Läsion) ablösen, ggf. unter Einbeziehung der tieferen Nagelpartien nahe dem Nagelbett und der subunguealen Hyperkeratosen. Material im Dermapak-Entnahmeset Best.-Nr. PMK201#DER auffangen. Ungeeignet sind mit der Schere abgetrennte Nagelteile wie bei der normalen Maniküre. Probenlagerung bis zum Transport/Versand: Raumtemperatur

Nahrungsmittelscreen fx5	
Probenmaterial	1 bis 5 ml Serum
Anmerkungen	falls IgE positiv und SX1 und fx5 negativ: Abklärung mit Allergenmischungen bzw. Einzelallergenen nach Anamnese
Naproxen°	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich: 25,0 - 75,0 mg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: NAPR Ansatztage: nach Bedarf Analgetika (nicht opioide Analgetika) Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe, HWZ ca 14 Std.
Natrium im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum Langes stauen vermeiden. Zur Vermeidung einer Hämolyse sollte das Serum bei längeren Probentransporten abzentrifugiert werden.
Methode	ISE
Normalwerte	135 – 145 mmol/l
Indikationen	Elektrolytbilanz Säure-Base-Haushalt Niereninsuffizienz (z.B. renale tubuläre Azidose) Polyurisch polydiptische Syndrome Störungen des Durstgefühls Hypertonie endokrine Erkrankungen z.B. Hypothyreose Mineralcorticoidexzess und Mineral Corticoidmangel-Syndrome
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NAT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Natrium im Urin	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin
Methode	ISE
Normalwerte	40 – 220 mmol/d
Indikationen	Störungen des Säure-Basen-Haushalts s. a. Kalium, Chlorid in Serum und Urin
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NAU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Nebennierenrinden-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:10 Titer
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: NNRA Ansatztage: bei Bedarf
Neisseria gonorrhoeae-DNA-PCR	
Probenmaterial	Abstriche, Urin, Ejakulat ° Fremdleistung, Punktate
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	V.a. frische Infektion Arthritis Epididymitis Prostatitis Urethritis Salpingitis unklare Fertilitätsstörungen
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.
Neisseria gonorrhoeae, Gonokokken	
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.
Neisseria meningitidis, Meningokokken	
Methode	kultureller Nachweis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach Abschluss der Bebrütungszeit des jeweiligen Materials
Neopterin°	
Probenmaterial	1 ml Serum lichtgeschützt
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 2.5 ng/ml
Indikationen	Indikator der Aktivierung der zellulären Immunabwehr
Anmerkungen	weitere Untersuchung T-, B-Lymphozyten Subpopulation mit aktivierten T-Zellen ° Fremdleistung

Neutrophile absolut		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Normalwerte	Alter	Werte in x 1000/µl
	0 - 3 Tage	3,30 - 15,50
	4 - 7 Tage	2,10 - 10,70
	8 - 14 Tage	1,50 - 8,90
	15 - 29 Tage	1,30 - 8,30
	1 - 3 Monate	1,30 - 7,90
	4 - 6 Monate	1,30 - 8,30
	7 - 11 Monate	1,50 - 8,70
	1 - 2 Jahre	1,50 - 8,70
	3 - 4 Jahre	1,50 - 8,50
	5 - 6 Jahre	1,70 - 8,50
	7 - 12 Jahre	1,70 - 8,10
	13 + 18 Jahre	1,70 - 7,90
	ab 19 Jahre	1,50 - 7,70
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NEUA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Neutrophile/Segmentkernige		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Wert in %
	1 - 2 Tage	27 - 66 %
	3 - 6 Tage	24 - 61 %
	7 - 13 Tage	19 - 55 %
	14 - 29 Tage	17 - 55 %
	1- 12 Monate	17 - 53 %
	1 - 2 Jahre	20 - 56 %
	3 - 4 Jahre	23 - 59 %
	5 - 6 Jahre	26 - 64 %
	7 - 11 Jahre	31 - 67 %
	12 - 15 Jahre	34 - 70 %
	15 - 18 Jahre	37 - 70 %
	ab 19 Jahre	40 - 70 %
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SEG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Nickel im Serum°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	AAS (Atomabsorptionsspektrometrie)
Normalwerte	< 2.8 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Nickel im Urin°	
Probenmaterial	10 ml Urin
Normalwerte	< 3 µg/l
Indikationen	Krebserzeugender Arbeitsstoff Nickel-Exposition chronische Intoxikation
Anmerkungen	am Schichtende gesammelt ° Fremdleistung
Nitrazepam°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich 40 – 180 ng/ml toxisch > 200 ng/ml
Indikationen	Benzodiazepin z.B. Mogadan® Medikamentenspiegel
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden! ° Fremdleistung
Nitrit im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Combur-Test
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NIT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Noradrenalin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml 24h Sammelurin 24-h-Sammelurin, gesammelt über 5-10ml Eisessig; Kinder bis 18 Jahre: Spontanurin ohne Zusätze (frisch oder gekühlt). Mit Borsäure stabilisierter Urin ist für diese Analyse nicht geeignet.
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Indikationen	Therap. Drug Monitoring + Stoffwechsel
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: NOR_UL Häufigkeit: 1 pro Woche

Norcocain im Haar (GCMS)°	
Probenmaterial	Haare
Methode	GCMS
Normalwerte	< 0,02 ng/mg
Anmerkungen	° Fremdleistung

Normetanephrin															
Probenmaterial	EDTA-Plasma GEFROREN!														
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)														
Normalwerte	Für Kinder bis 4 Jahren liegen uns keine validierten Cut-Offs vor. Orientierend kann die Entscheidungsgrenze für Kinder und Jugendliche von <0,470 nmol/l herangezogen werden. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Referenzbereich (nmol/l)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 bis 17 Jahre</td><td><0,470</td></tr> <tr> <td>18 bis 29 Jahre</td><td><0,588</td></tr> <tr> <td>30 bis 39 Jahre</td><td><0,618</td></tr> <tr> <td>40 bis 49 Jahre</td><td><0,687</td></tr> <tr> <td>50 bis 59 Jahre</td><td><0,747</td></tr> <tr> <td>>60 Jahre</td><td><1,047</td></tr> </tbody> </table> Für ältere Patienten mit Niereninsuffizienz können gemäß Pamporaki et al.* folgende Cut-Offs herangezogen werden: CKD Stage 3: <1,158 nmol/l CKD Stage 4 bzw. Hämodialyse: <1,535 nmol/l <i>*Pamporaki et al. Optimized Reference Intervals for Plasma Free Metanephrines in Patients With CKD. AJKD Vol 72, Iss 6, Dec. 2018.</i>		Referenzbereich (nmol/l)	5 bis 17 Jahre	<0,470	18 bis 29 Jahre	<0,588	30 bis 39 Jahre	<0,618	40 bis 49 Jahre	<0,687	50 bis 59 Jahre	<0,747	>60 Jahre	<1,047
	Referenzbereich (nmol/l)														
5 bis 17 Jahre	<0,470														
18 bis 29 Jahre	<0,588														
30 bis 39 Jahre	<0,618														
40 bis 49 Jahre	<0,687														
50 bis 59 Jahre	<0,747														
>60 Jahre	<1,047														
Indikationen	Phäochromozytom- und Neuroblastom-Diagnostik														
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NORMP2 Ansatztage: 1 x / Woche Mo. Hinweis: Der Abbau der Katecholamine in die entsprechenden Metanephrine erfolgt in moderatem Umfang auch in der entnommenen Probe, sodass in Plasma, welches bei Raumtemperatur bzw. gekühlt eingesandt wird, gehäuft grenzwertig erhöhte Metanephrine gemessen werden. Nach der Blutentnahme sollte die Probe umgehend zentrifugiert und das Plasma separiert und tiefgefroren werden. Viele Arzneistoffe beeinflussen die Ausschüttung von Katecholaminen und damit ihrer Metaboliten, den Metanephrinen. Hierzu zählen vor allem Psychopharmaka und Antihypertensiva wie trizyklische Antidepressiva, MAO-Inhibitoren, DOPA-Derivate, α-Blocker, β-Blocker, Diuretika (hochdosiert), ACE-Hemmer und Clonidin sowie abschwellende Nasentropfen und Theophyllin. Sofern klinisch vertretbar ist eine mindestens 14-tägige Medikamentenpause vor der Blutentnahme zu empfehlen.														

Normetanephrin im Urin°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std. Urin, gesammelt über 5 - 10 ml HCl
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 40 Jahre < 550 µg/d >40 Jahre < 632 µg/d
Indikationen	Katecholaminmetabolit s. auch VMS keine Dopaminpräparate
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: NORM Ansatztage: 2 x je Woche
Noroviren Antigen	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Gastroenteritis
Anmerkungen	(Meldepflicht siehe IfGS) Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.
Nortilidin in Urin	
Probenmaterial	Urin
Normalwerte	< 50 ng/ml
Nortrimipramin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Ber.: 150-300 ng/ml Kritisch ab: 600 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NTRIM Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden!

Nortriptylin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich 80 - 200 ng/ml kritischer Bereich > 300 ng/ml
Indikationen	Trizyklisches Antidepressivum: Laroxyl®, Saroten®, Tryptizol®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NORT Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 10 - 44 Std.
NSE° Neuronspezifische Enolase	
Probenmaterial	2 ml Serum, hämolysefrei
Methode	IRMA (Immunradiometrischer Assay)
Normalwerte	<13 ng/ml
Indikationen	Präferenz: kleinzelliges Lungen-Ca (CEA, SCC)
Anmerkungen	Serum möglichst rasch abtrennen Falsch erhöhte Werte durch NSE aus Erythrozyten und Thrombozyten möglich ° Fremdleistung

o-Desmethylvenlafaxin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Venlafaxin und Desmethylvenlafaxin: therapeutischer Bereich: 100-400 ng/ml toxischer Bereich: ab 800 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DEVE Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Aktiver Metabolit Trevilor® Antidepressivum Medikamentenspiegel Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 10 - 20 Std. o-Desthylvenlafaxin ist der aktive Metabolit von Venlafaxin
Olanzapin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	20 - 80 ng/ml therap. Bereich tox. Bereich ab 100 ng/ml
Indikationen	Dopaminantagonist, Dosis verringern bei Nieren-/Leber-Insuffizienz
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OLAN Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden!

Oligoklonale Banden (Liquor (L))°	
Probenmaterial	2 ml Serum + 2 ml Liquor (L)
Indikationen	V. a. intrathekalen entzündlichen Prozess
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. Interpretation: • Der Nachweis oligoklonaler IgG-Banden ist Hinweis auf einen entzündlichen ZNS-Prozess • sensitiver als die Berechnung der intrathekalen IgG-Synthese mittels Reiberschema Beinhaltet folgende Untersuchungen: Immunglobulin G (IgG/Serum) (Serum (S)) Analyt Kürzel: ISOS Immunglobulin G (IgG) (Liquor (L)) Analyt Kürzel: ISOF Allgemeine Hinweise zur Gewinnung und Versand von Liquorproben: • Polypropylen-Röhrchen (PP) verwenden. Kein Glas- oder Polystyrol-Röhrchen (PS). Probendeckel fest verschließen und mit Parafilm abdichten. • Bei multiplen Untersuchungen aus Liquor, ausreichend Liquor als mehrere Einzelproben (mind. 3 x á 3ml) einsenden, da Messungen u.a. in weiteren Fremdlaboren erfolgen. • Um wiederholtes Auftauen zu vermeiden, kann aus gefrorenen Liquor nur ein Analyt bestimmt werden. Daher für mehrere Untersuchungen aus gefrorenen Liquor, zusätzliche gefrorene Einzelproben einsenden. • Für Reiber-Diagramme Serum und Liquor gleichzeitig (<1h Abstand) abnehmen und taggleich einsenden. • Falls dringliche Analyte priorisiert werden sollen, bitte diese auf Anforderung vermerken. Serum UND Liquor erforderlich. Probenentnahme muss taggleich erfolgen! Serum UND Liquor immer zusammen einsenden. Vergleichender qualitativer Nachweis von oligoklonalem IgG in Liquor und Serum mittels isoelektrischer Fokussierung und Immunfixation.

Oligoklonale Immunglobuline	
Probenmaterial	je 1 ml Serum und Liquor vom selben Tag
Methode	isoelektrische Fokussierung
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	s. Liquorproteine, isoelektrische Fokussierung, Albumin-Quotient, Albumin-IgG-Quotient
Omega-3 Fettsäuren	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	GC-MS
Normalwerte	Siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OMEGA3 Präanalytik: Stabilität: 14 Tage bei 2-8°C Erfasst werden: 18:3, 20:5, 22:6. Siehe Omega-3-Index
Omega-3-Index	
Probenmaterial	5 ml EDTA-Blut
Methode	GC-MS
Normalwerte	Kardioprotektiver Zielwert > 8 %
Anmerkungen	Analyt Kürzel: EPAA Bestimmt wird das Verhältnis von EPA + DHA zu Gesamtfettsäuren in den Lipiden der Erythrozytenmembranen. Werte unter 4% werden mit einem 10-fach erhöhten Risiko für plötzlichen Herztod assoziiert.
Omega-6 Fettsäuren	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	GC-MS
Normalwerte	Siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OMEGA6 Erfaßt werden: 18:2, 18:3, 20:3, 20:4. Präanalytik Stabilität: 14 Tage bei 2-8°C
Opiate im Urin	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	< 300 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürze: OPIU Ansatztage: Mi. - Fr.

Opipramol®	
Probenmaterial	3 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	100 – 500 ng/ml
Indikationen	Antidepressivum z.B. Insidon®
Anmerkungen	keine Gel-Röhrchen verwenden! ° Fremdleistung
oraler Glucosetoleranztest oGTT 50g (Schwangere)	
Probenmaterial	Glucoset-Röhrchen Best. Nr.: 05.1074.001 Gründlich durchmischen (kippen, nicht schütteln). Laut Leitlinie ist die Verwendung von Glucoset-Röhrchen obligatorisch
Methode	Spektrometrie, UV-/VIS-Photometrie
Normalwerte	Bei Gestationsdiabetes (50g Suchtest) erhöhte Werte: Nüchternzucker ≥ 92 mg/dl BZP 1h-Wert ≥ 135 mg/dl
Indikationen	Schwangerschaftsdiabetes, Screeningtest auf Gestationsdiabetes zwischen SSW 24+0 und 27+6
Anmerkungen	Screening Analyt Kürzel: OGTS50 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Durchführung: • Patientin muss nicht nüchtern sein • Trinken von 50 g wasserfreier Glucose in 200 ml Wasser innerhalb von 3 - 5 min • nach 60 min ohne größere körperliche Anstrengung venöse Blutabnahme von 1 ml NaF-Citrat-Blut für die Glucose-Bestimmung

oraler Glucosetoleranztest oGTT 75g (nicht schwangere)				
Probenmaterial	Glucoexact-Röhrchen Best. Nr.: 05.1074.001 Gründlich durchmischen (kippen, nicht schütteln). 1ml NaF-Blut Best.-Nr. 05.1073 oder 20µl Kapillarblut (end to end): in Hämolysathütchen, kräftig schütteln! Best. Nr.: 05.1074.001			
Methode	Spektrometrie, UV-/VIS-Photometrie - NaF Blut, Glucoexact-Röhrchen Elektrochemische Untersuchung, Amperometrie - Kapillarblut			
Normalwerte	Glucose nüchtern (BZN75)	kein Diabetes:	< 100 mg/dl	
		Graubereich:	100 - 125 mg/dl	
		Diabetes:	≥ 126 mg/dl	
	Glucose 2 (BZP75)	kein Diabetes:	< 140 mg/dl	
		Graubereich:	140 - 199 mg/dl	
		Diabetes:	≥ 200 mg/dl	
Indikationen	Screening/Diagnose des Diabetes mellitus, Postprandiale Hyperglykämien, Akromegalie			
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OGTT75 enthält BZN75 + BZP75 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. 1. BZN Nüchternblutentnahme dann Trinken von 75 g Glukose in 250-300 ml Wasser innerhalb von 5 Min. Kinder 1,75 g/kg KG 2. BZ-Blutentnahme nach 120 Min nach mind. 3-tägiger kohlehydratreicher Kost (> 150 g KH pro Tag) im Sitzen oder Liegen, keine Anstrengung, Rauchverbot vor und beim Test. Kontraindikation: interkurrente Erkrankungen Nüchternglukose > 126 mg/dl bekannte Glucosewerte > 200mg/dl			

oraler Glucosetoleranztest oGTT 75g (Schwangere)

Probenmaterial	Glucosact-Röhrchen Best. Nr.: 05.1074.001 Gründlich durchmischen (kippen, nicht schütteln). Laut Leitlinie ist die Verwendung von Glucosact-Röhrchen obligatorisch
Methode	Photometrie
Normalwerte	auffällig bei: nüchtern ≥ 92 mg/dl nach 1 Std. ≥ 180 mg/dl nach 2 Std. ≥ 153 mg/dl
Indikationen	Schwangerschaftsdiabetes, Screeningtest auf Gestationsdiabetes zwischen SSW 24+0 und 27+6
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OGTS Ansatzzeit: täglich Mo. - Fr.

Organische Lösungsmittel°, Kohlenwasserstoffe, Chlorkohlenwasserstoffe, Benzol, Ethylbenzol, Toluol, Xylol, Styrol

Probenmaterial	2 mal 2 ml Blut Spezialröhrchen bitte anfordern: Rollrandröhrchen
Anmerkungen	bitte anfordern: Rollrandröhrchen benutztes Desinfektionsmittel bitte angeben ° Fremdleistung

Ornithin°

Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 27 - 98 $\mu\text{mol/l}$
Anmerkungen	° Fremdleistung

Osmolalität° in mosmol/kg H₂O	
Probenmaterial	1 ml Serum 1 ml Urin
Methode	Gefrierpunktmessung
Normalwerte	Serum 280 – 300 Urin 50 – 1600 im Durst (Urin) > 800
Indikationen	Störungen des Wasserhaushaltes osmotische Lücke (z. B. Intoxication mit Methanol, Glycol) Diabetes insipidus
Anmerkungen	° Fremdleistung

Ostase im Serum°

Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	RIA (Radioimmunoassay)		
Normalwerte	Kinder		
	Alter	Mädchen	
	0 - 35 Monate	41,9 - 107,0 ug/l	
	3 - 4 Jahre	29,5 - 108,5 ug/l	
	5 - 6 Jahre	21,9 - 115,4 ug/l	
	7 - 8 Jahre	37,1 - 147,9 ug/l	
	9 - 10 Jahre	42,0 - 107,6 ug/l	
	11 - 12 Jahre	38,6 - 111,2 ug/l	
	13 - 14 Jahre	13,7 - 109,8 ug/l	
	15 - 16 Jahre	10,2 - 72,6 ug/l	
	17 - 18 Jahre	5,9 - 20,0 ug/l	
	Alter	Jungen	
	0 - 35 Monate	43,4 - 104,8 ug/l	
	3 - 4 Jahre	29,7 - 84,8 ug/l	
	5 - 6 Jahre	48,8 - 109,0 ug/l	
	7 - 8 Jahre	52,6 - 123,0 ug/l	
	9 - 10 Jahre	52,3 - 105,4 ug/l	
	11 - 12 Jahre	55,7 - 152,3 ug/l	
	13 - 14 Jahre	15,5 - 134,0 ug/l	
	15 - 16 Jahre	16,6 - 127,9 ug/l	
	17 - 18 Jahre	11,0 - 77,6	
	Erwachsene		
	ab 19 Jahren	Frauen	
	prämenopausal	4,9 - 26,6 ug/l	
	postmenopausal	5,2 - 24,4 ug/l	
	ab 19 Jahren	Männer	
		5,5 - 22,9 ug/l	
Indikationen	direkter immunologischer Nachweis		
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: OSTA erhöht: Osteoporose bei postmenopausalen Frauen		

Osteocalcin°	
Probenmaterial	1 ml Serum 8 – 9 Uhr nüchtern
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	Frauen prämenopausal 8.3 – 34 ng/ml Frauen postmenopausal 12.8 – 55 ng/ml Männer ab 16 J. 9.6 ng/ml Kinder altersabhängig
Indikationen	Hyperparathyreoidismus Osteomalazie Knochenmetastasen
Anmerkungen	° Fremdleistung

Östradiol	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	weiblich: von 1 Tag - 9 Jahre < 27 pg/ml von 10 Jahre - 16 Jahre Follikelphase: 12 - 233 pg/ml [45 - 854 pmol/l] Mittzykl. Gipfel: 41 - 398 pg/ml [151 - 1461 pmol/l] Lutealphase: 22 - 341 pg/ml [82 - 1251 pmol/l] Schwangerschaft 1.Trim.: 154 - 3240 pg/ml [563 - 11902 pmol/l] von 17 Jahre - 39 Jahre Follikelphase: 12 - 233 pg/ml [45 - 854 pmol/l] Mittzykl. Gipfel: 41 - 398 pg/ml [151 - 1461 pmol/l] Lutealphase: 22 - 341 pg/ml [82 - 1251 pmol/l] Schwangerschaft 1.Trim.: 154 - 3240 pg/ml [563 - 11900 pmol/l] von 40 Jahre - 49 Jahre Follikelphase: 12 - 233 pg/ml [45 - 854 pmol/l] Mittzykl. Gipfel: 41 - 398 pg/ml [151 - 1461 pmol/l] Lutealphase: 22 - 341 pg/ml [82 - 1251 pmol/l] Schwangerschaft 1.Trim.: 154 - 3240 pg/ml [563 - 11900 pmol/l] Postmenopause: < 138 pg/ml [< 505 pmol/l] Die Gabe von Fulvestrant führt zur fälschlichen Erhöhung des Östradiol-Wertes (Kreuzreaktivität). von 50 Jahre - 120 Jahre* Follikelphase: 12 - 233 pg/ml [45 - 854 pmol/l] Mittzykl. Gipfel: 41 - 398 pg/ml [151 - 1461 pmol/l] Lutealphase: 22 - 341 pg/ml [82 - 1251 pmol/l] Postmenopause: < 138 pg/ml [< 505 pmol/l] Die Gabe von Fulvestrant führt zur fälschlichen Erhöhung des Östradiol-Wertes (Kreuzreaktivität). Schwangerschaft 1.Trim: 154 - 3243 pg/ml [563 - 11902 pmol/l] 2.Trimester.: 1561 - 21280 pg/ml [5729 - 78098 pmol/l] 3.Trimester: 8525 - > 30000 pg/ml [31287 - > 110100 pmol/l] männlich: von 1 Tag - 9 Jahre < 20 pg/ml von 10 Jahre - 120 Jahre* 11 - 43 pg/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!

Östradiol											
Indikationen	Frauen: Beurteilung der Ovarialfunktion, Verlaufskontrolle bei Ovulationsauslösung, Ovarialinsuffizienz Östrogen-produzierende Tumore Männer: metabolische Störungen, Gynäkomastie										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OED Ansatztage: täglich Mo. - Fr. bei Schwangerschaft: deutlich höhere Werte <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lagerung:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> <tr> <td>2-8 °C</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>1 Tag</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8 °C	2 Tage	Raum Temperatur	1 Tag
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8 °C	2 Tage										
Raum Temperatur	1 Tag										
Östron E1°											
Probenmaterial	2 ml Serum										
Methode	RIA (Radioimmunoassay)										
Normalwerte	Frauen Follik. Phase: 39 - 132 pg/ml Frauen Luteale Phase: 54 - 179 pg/ml Frauen Menopause : 36 - 97 pg/ml Männer: 39 - 102 pg/ml										
Indikationen	bei hyperandrogenämischer Ovarialinsuffizienz bevorzugt Östron-Erhöhung										
Anmerkungen	Östron ist das wesentliche Östrogen der postmenopausalen Frau ° Fremdleistung										
Oxalsäure°											
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin mit 10 ml konz. HCl (pH < 2)										
Methode	enzymatisch										
Normalwerte	< 40 mg/d										
Indikationen	Oxalatsteinträger, Therapie- und Verlaufskontrolle bei Nierensteinbildung										
Anmerkungen	Tagesmenge angeben ° Fremdleistung										

Oxcarbazepin	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Oxcarbazepin und 10-OH-Carbamazepin: therapeutischer Bereich: 10-35 µg/ml toxischer Bereich: ab 40 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum, Medikamentennachweis HWZ 1.3-2.3 h
Anmerkungen	Analyt Kürzel: OXCA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 5 Std. Der Metabolit 10-OH-Carbazepin ist die aktive Verbindung in vivo.
Oxidative Belastung°	
Probenmaterial	EDTA-Plasma Serum
Normalwerte	Serum: < 180 keine erhöhte ox. Belastung 180 bis 310 mäßige oxidative Belastung > 310 starke oxidative Belastung EDTA-Plasma: < 200 keine erhöhte ox. Belastung 200 bis 350 mäßige oxidative Belastung > 350 starke oxidative Be
Anmerkungen	° Fremdleistung

Oxyuren (Enterobius vermicularis)	
Probenmaterial	Analabklatschpräparat („durchsichtiger Tesafilm“ auf Objektträger)
Methode	Mikroskopie
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Oxyureneier sind nur selten im Stuhl zu finden. Daher sollte kein Stuhl, sondern ein Analabklatschpräparat („durchsichtiger Tesafilm“ auf Objektträger) eingesandt werden. Analabklatschpräparat Es darf keine vorhergehende Reinigung der Perianalregion erfolgen. Morgens vor dem Stuhlgang ein ca. 10 x 2 cm großes Stück durchsichtige Klebefolie unter Spreizen der Gesäßbacken mehrmals mit der Klebeseite gegen die Analregion drücken. Anschließend den Streifen luftblasenfrei mit der Klebeseite auf einen Objektträger aufkleben und beschriften.
Paliperidon	
Anmerkungen	siehe Risperidon keine Gel-Röhrchen verwenden!
p-ANCA Anti-Neutrophilen Cytoplasmatische Antikörper	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	Fluoreszenzmikroskop < 1:10
Indikationen	Vaskulitis, mikroskopische Polyangitis, Churg-Strauss-Syndrom, Goodpasture-Syndrom,
Anmerkungen	Serologie Analyt Kürzel: p-ANCA qualitativ: ANCP ANCPQ Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Pankreas (Azinuszellen) Ak°	
Probenmaterial	Serum, EDTA, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	siehe Befundbericht
Indikationen	akute Pankreatitis
Anmerkungen	° Fremdleistung, Labor Stöcker Analyt Kürzel: PAAC Ansatztage: täglich Mo. - Fr. enthält: Pankreas-Azini IgA und Pankreas-Azini IgG

Pankreas-Elastase	
Probenmaterial	1 g Stuhl g 1 ml Serum°
Methode	EIA/ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	Stuhl > 200 µg/g Serum < 3.5 ng/ml
Indikationen	V.a. exokrine Pankreasinsuffizienz V.a. akute Pankreatitis
Anmerkungen	siehe Elastase
Paracetamol-Phenacetin	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 2,5 – 25 µg/ml toxischer Bereich > 150 µg/ml
Anmerkungen	Analgetika, Antipyretika, Antirheumatika z.B. Anaflon®, Benuron®, Enelfa®
Parainfluenza 1-3 IgA-Ak°	
Probenmaterial	1 Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 8.5 U/ml
Indikationen	Klinik: Bronchitis, Pneumonie, Krupp Symptomatik
Anmerkungen	° Fremdleistung Parainfluenza Virus° Die häufigsten Parainfluenza Typen (Typ 1 – 3) gehören zur Familie der Paramyxoviridae und werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Sie verursachen virale Infektionen des Respirationstraktes insbesondere bei Kleinkindern und Kindern (Hauptursache des viralen Pseudokrups). Risikopersonen sind auch ältere Patienten, vor allem Immungeschwächte. Inkubationszeit: 2-4 Tage

Parainfluenza 1-3 IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 8.5 U/ml
Indikationen	Klinik: Bronchitis, Pneumonie, Krupp Symptomatik
Anmerkungen	° Fremdleistung Parainfluenza Virus° Die häufigsten Parainfluenza Typen (Typ 1 – 3) gehören zur Familie der Paramyxoviridae und werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Sie verursachen virale Infektionen des Respirationstraktes insbesondere bei Kleinkindern und Kindern (Hauptursache des viralen Pseudokrups). Risikopersonen sind auch ältere Patienten, vor allem Immungeschwächte. Inkubationszeit: 2-4 Tage

Parasitologische Untersuchung

Probenmaterial	Stuhl, möglichst blutige, eitrige oder schleimige Anteile entnehmen.
Methode	Mikroskopischer Nachweis Amöbenzysten: Sind relativ stabil und im gekühlten Stuhl einige Tage haltbar. Vegetative Formen: Bei V.a. akute Amöben-Colitis sollte der Stuhl innerhalb von 30 min ins Labor transportiert werden, um ggf. den Nachweis vegetativer Formen (sog. „Magna-Formen“) führen zu können, die innerhalb von 30 min bis 1 Std. absterben. Antigennachweis Der Antigennachweis von <i>Entamoeba histolytica/dispar</i> im Stuhl ist auch nach längerer Lagerung möglich, selbst wenn mikroskopisch keine vegetativen Formen mehr nachweisbar sind (Antigen bis zu 3 Tagen bei 2-8°C stabil). Bei Anforderung einer Untersuchung auf Amöben bzw. Parasiten im Stuhl, wird vom Labor immer ein Antigennachweis mittels ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay) durch-geführt.
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Aufgrund der intermittierenden Ausscheidung ist die Entnahme von 3 Stuhlproben an drei verschiedenen Tagen erforderlich. Zusätzlich sollte wegen der Ungleichverteilung der Parasiten im Stuhl, die Entnahme jeweils von drei verschiedenen Stellen der Probe erfolgen. Probe bis zum Transport bei 2-8°C lagern.

Parathormon (intakt)											
Probenmaterial	2 ml Serum GEFROREN!										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	17.3-74.1 pg/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	Diagnose von Hypo- und Hyperparathyreoidismus/tumorbedingter Hypercalcämie Beurteilung des Knochenstoffwechsels eindeutige PTH-Erfassung bei Nieren insuffizienz Dialysepatienten schnelle und präzise Funktionsuntersuchung der Nebenschilddrüse										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PAR Ansatztage: täglich Mo. - Fr. nach Gerinnung sofort abtrennen Blutabnahme bis 10 Uhr morgens nüchtern Versand gefroren <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Lagerung Serum:</th></tr> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> <tr> <td>2-8 °C</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>Raum Temperatur</td><td>8 Stunden</td></tr> </table> Aufgrund der Instabilität von PTH in nicht aufgetrenntem Serum, sollten Serumröhrchen sofort zentrifugiert eingefroren werden.	Lagerung Serum:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate	2-8 °C	2 Tage	Raum Temperatur	8 Stunden
Lagerung Serum:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	6 Monate										
2-8 °C	2 Tage										
Raum Temperatur	8 Stunden										
Paratyphus											
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) siehe Mikrobiologie										
Parietalzellen-Ak											
Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)										
Normalwerte	negativ < 7 U/ml grenzwertig 7 - 10 U/ml positiv > 10 U/mlf										
Indikationen	Perniziöse Anämie, chronische atrophische Gastritis, Hashimoto-Thyreoiditis, Vitiligo, autoimmune Endokrinopathien										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PARITA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.										

Paroxetin°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	therap. Bereich 20 – 65 ng/ml Tox. Ber.: 120 ng/ml
Indikationen	Antidepressivum Medikamentenspiegel
Anmerkungen	° Fremdleistung
Partielle Thromboplastinzeit PTT	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Koagulometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 25,1 - 36,5 sec
Indikationen	Suchtest bei Verdacht auf eine Gerinnungsstörung im endogenen System
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PTT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Abnahme im Labor oder Versand gefroren Teststörung durch Heparin Angabe der Abnahmezeit erforderlich
Parvovirus B 19 IgG Ak	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 3 IU/ml grenzwertig 3 - 5 IU/ml positiv > 5 U/ml
Indikationen	Eingrenzung des Infektionszeitpunktes insbesondere in der Schwangerschaft
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PARG, PARWB Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Parvovirus B 19 IgM Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 - 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	V. a. akute Infektion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PARM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf

Parvovirus-DNA-PCR°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	< 600 Genomkopien/ml
Indikationen	Abklärung einer akuten Infektion insbesondere in der Schwangerschaft
Anmerkungen	° Fremdleistung
Pathogene Keime	
Anmerkungen	Der Auftrag auf „pathogene Keime“ beinhaltet eine Untersuchung, die das materialabhängig am häufigsten pathogene Keimspektrum berücksichtigt. Entsprechend den Empfehlungen der Fachkreise (MiQ) wird der Untersuchungsumfang den üblicherweise zu erwartenden Keimen angepasst wie z.B. Anreicherungsmedien für Salmonellen bei der Stuhl Diagnostik oder der Nachweis von anaeroben Keimen bei Wundabstrichen. Dennoch ist der Untersuchungsumfang nicht allumfassend, da viele Keime (z.B. Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen, Listerien, Legionellen) spezielle Anzuchtbedingungen benötigen und nur im Zuge von Zielaufträgen erfasst werden können. Bei pathogenen Keimen werden routinemäßig keimspezifische Antibiogramme erstellt. Werden ausdrücklich keine Antibiogramme gewünscht, so ist dies auf dem Auftrag zu vermerken.
PCB Nr. 138°	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	0 - 11 Jahre: > 0,3 ug/l 12 - 19 Jahre: > 0,4 ug/l 20 - 29 Jahre: > 0,6 ug/l 30 - 39 Jahre: < 0,9 ug/l 40 - 49 Jahre: < 1,4 ug/l 50 - 59 Jahre: < 1,7 ug/l ab 60 Jahren: < 2,2 ug/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

PCB Nr. 153°

Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	0 - 11 Jahre: > 0,4 ug/l 12 - 19 Jahre: > 0,6 ug/l 20 - 29 Jahre: > 0,9 ug/l 30 - 39 Jahre: < 1,6 ug/l 40 - 49 Jahre: < 2,2 ug/l 50 - 59 Jahre: < 2,8 ug/l ab 60 Jahren: < 3,3 ug/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

PCB Nr. 180°

Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	0 - 11 Jahre: > 0,3 ug/l 12 - 19 Jahre: > 0,3 ug/l 20 - 29 Jahre: > 0,6 ug/l 30 - 39 Jahre: < 1,0 ug/l 40 - 49 Jahre: < 1,6 ug/l 50 - 59 Jahre: < 2,1 ug/l ab 60 Jahren: < 2,4 ug/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

PCP Pentachlorphenol°

Probenmaterial	2 ml Serum oder EDTA-Blut
Methode	GC/MS (Gaschromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	< 12 µg/l Biol. Halbwertszeit ca. 17 Tage
Indikationen	krebserzeugender Arbeitsstoff Intoxikation
Anmerkungen	s.a. Lindan, Holzschutzmittel ° Fremdleistung

Pemphigus vulgaris

Probenmaterial	1 ml Serum
----------------	------------

Penicillin G	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 50 pg/ml
Penicillin V	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 40 pg/ml
Penicillium chrysogenum	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 27 mg/l
Pentachlorphenol i. Serum (PCP)	
Methode	GC/MS
Perampanel im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich 180 - 980 µg/l Toxisch > 1000 µg/L
Anmerkungen	Die biologische Halbwertszeit von Perampanel beträgt 48-105 h.
Perazin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	100 - 230 ng/ml Toxischer Bereich: ab 460 ng/ml

Peritonealdialysat

Probenmaterial

Zur optimalen Diagnostik bitte folgende Proben einsenden:

Analyse	Probenmaterial	Lagerung / Transport
Zellzahl-/ differenzierung	5-10 ml Dialysat in EDTA-Röhrchen	Bitte so zügig wie möglich einsenden! Probe sollte spätestens innerhalb 8h im Labor eingehen (bei Einsendung von nativem Dialysat Stabilität 2h) Lagerung bis zur Abholung im Kühlschrank
Gram-Präparat	5-10 ml natives Dialysat (ohne Zusätze)	max. 24 h Lagerung bis zur Abholung im Kühlschrank

Peritonealdialysat			
	Kultur • Fremdleistung	Blutkulturflaschen (aerob + anaerob) beimpft mit je 8-10 ml nativem Dialysat: BD BACTEC Plus Aerob/F-Medium BD BACTEC Lytic Anaerobes Medium <i>Speziell für die Peritonealdialysat-Diagnostik bitte ausdrücklich nur diese Blutkulturflaschen bestellen!</i>	max. 24 h Lagerung bis zur Abholung bei Raumtemperatur
Anmerkungen	Kultur • Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: nach Bedarf		
Perphenazin			
Probenmaterial	Serum		
Normalwerte	0,6 - 2,4 ng/ml		
Phenobarbital			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)		
Normalwerte	therap. Bereich 10 – 40 µg/ml toxisch ab 50 µg/ml		
Indikationen	Metabolismus in der Leber		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PHB Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Blutentnahme während des Dosierungsintervalls Eliminationshalbwertszeit: 50 – 120 h (Erw.) Eliminationshalbwertszeit: 40 – 70 h (Kinder)		

Phenol°	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	GC/MS
Normalwerte	< 15 mg/l
Anmerkungen	Benzol-Metabolit im Harn BAT 300 mg/l ° Fremdleistung
Phenprocoumon	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	1,0 - 3,0 ug/ml

Phenylalanin°		
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN!	
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)	
Normalwerte	0 - 1 Monat	38 - 135 µmol/l
	2 - 23 Monaten	30 - 75 µmol/l
	2 - 17 Jahre	38 - 78 µmol/l
	ab 18 Jahren	35 - 85 µmol/l
Indikationen	Selektives Screening bei V.a. angeborene Stoffwechselerkrankungen, z.B. bei	
	• Entwicklungsverzögerung • Neurologische Störungen • Ketoazidotische Entgleisungen • Hypoglykämie • Hyperammoniämie • Krampfanfälle • Erbechen • Organstörungen Überwachung der Therapie von Stoffwechselerkrankungen	
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia MVZ Ingelheim Analyt Kürzel: PHES Ansatz tage: Mo., Mi., Fr.	
	Geburtsdatum unbedingt erforderlich! Mind. 2 ml EDTA-Plasma (kein Heparin). Sofort einfrieren. Bei dieser Untersuchung verwenden wir als besonders zuverlässige Detektionsmethode die Massenspektrometrie	
	Panel von 44 Aminosäuren, wobei erhöhte oder erniedrigte Konzentrationen einzelner Aminosäuren oder von Kombinationen verschiedener Aminosäuren auf eine Stoffwechselkrankheit hindeuten können.	
	Auf dem Befund finden Sie die entsprechende angepasste ausführliche Interpretation.	
	Wichtig für die Interpretation sind klinische Daten und das Alter des Patienten.	
Phenylalanin im Urin°		
Probenmaterial	0.5 ml vom 24-Std.-Urin gesammelt über 5 – 10 ml Eisessig	
Normalwerte	s. Befund	
Anmerkungen	° Fremdleistung	

Phenytoin			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)		
Normalwerte	therap. Bereich 10 – 20 µg/ml toxisch ab 20 µg/ml		
Indikationen	Antiepileptikum		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: DPH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.		
Phosphat-Clearance			
Probenmaterial	1 ml Serum und 10 ml vom 24-Std.-Urin		
Methode	Photometrie		
Normalwerte	5.4 – 16.2 ml/min		
Indikationen	primäre und sekundäre Störungen der Nebenschilddrüsenfunktion tubuläre Syndrome mit Phosphatverlust zur Beurteilung s. a. Ca, P, Ges. Eiweiß, Cl, Kreatinin, AP, Kreatinin-Clearance Ca im Urin		
Anmerkungen	Tagesmenge angeben		
Phosphat im Serum			
Probenmaterial	1 ml Serum, hämolysefrei nach Gerinnung sofort abseren		
Methode	Photometrie		
Normalwerte	Erwachsene: 0,81 - 1,45 mmol/L (2,5 - 4,5 mg/dL)		
	Kinder:		
	Alter	Männer	Frauen
		mmol/L (mg/dL)	mmol/L (mg/dL)
	1 - 30 Tage	1,25 - 2,25 (3,9 - 6,9)	1,40 - 2,50 (4,3 - 7,7)
	1 - 12 Monate	1,15 - 2,15 (3,5 - 6,6)	1,20 - 2,10 (3,7 - 6,5)
	1 - 3 Jahre	1,00 - 1,95 (3,1 - 6,0)	1,10 - 1,95 (3,4 - 6,0)
	4 - 6 Jahre	1,05 - 1,80 (3,3 - 5,6)	1,05 - 1,80 (3,2 - 5,5)
	7 - 9 Jahre	0,95 - 1,75 (3,0 - 5,4)	1,00 - 1,80 (3,1 - 5,5)
	10 - 12 Jahre	1,05 - 1,85 (3,2 - 5,7)	1,05 - 1,70 (3,3 - 5,3)
Indikationen	Knochenerkrankungen chron. Nierenerkrankungen Kontrolle nach Schilddrüsenoperationen Erkrankungen der Nebenschilddrüsen Nierensteine		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PHOS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.		

Phosphat im Urin	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin nach dem Sammeln mit HCl (pH < 3) ansäuern
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 1.3 g/d
Indikationen	Alkoholabusus Steinmetaphylaxe parenterale Ernährung
Anmerkungen	Tagesmenge angeben Analyt Kürzel: PIU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Phosphoethanolamin	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig: Erwachsene: 0 - 69 µmol/l
Phospholipase-A2-Rez.-Ak (ELISA)°	
Probenmaterial	Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	RE/ml, < 14
Anmerkungen	°Fremdleistung Analyt Kürzel: PHA2R Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Phospholipase-A2-Rez.-Ak (IFT)°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	Titer: < 1:10
Anmerkungen	°Fremdleistung Analyt Kürzel: PHA2RI Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Phosphoserin	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	0 - 1 Monat: 7 - 47 µmol/l 2 - 23 Monate: 2 - 20 µmol/l 2 - 17 Jahre: 2 - 30 µmol/l Erwachsene: < 2 µmol/l
ph-Wert	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Combur-Test
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Phytansäure°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Bis 1 Jahr: < 6,80 µmol/l 1 bis 2 Jahre: < 5,30 µmol/l Ab 2 Jahre: < 11,5 µmol/l
Indikationen	Refsum-Syndrom
Anmerkungen	° Fremdleistung
Picorna-Viren-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	KBR
Normalwerte	Grenzstufe 1:20 Titer-E
Indikationen	Entero-Viren: Polio-, Coxsackie-, Echoviren Erreger von grippalen Infekten, Enteritiden und Meningitiden besonders im Sommer
Anmerkungen	° Fremdleistung
Piracetam	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	20 - 50 ng/ml

Placenta-AP	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Die Untersuchung ist indiziert bei Patienten mit Seminom oder mit Verdacht auf Seminom (präoperative Diagnostik) sowie Patientinnen mit bekanntem oder vermutetem Dysgerminom. Rauchen kann zu erhöhten Werten der PLAP führen. Die Bestimmung der Plazenta-AP ist deshalb nur bei diesen Indikationen eine berechnungsfähige Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Bitte vermerken Sie die Indikation auf dem Überweisungsschein.
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PLAP Abrechnungsziffer (EBM): 32405 Die Plazenta-AP (PLAP) ist bei Patienten mit Seminom und physiologischerweise ab 2. Schwangerschaftswoche erhöht. Bitte beachten: Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Messmethoden und/oder Testherstellern ermittelt wurden, sind nicht miteinander vergleichbar. Bei der Verlaufsbeurteilung von Tumormarkern ist stets der gleiche Test zu verwenden.
Plasminogen°	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!
Normalwerte	80 – 133 %
Indikationen	Beurteilung des fibrinolytischen Potentials Überwachung bei Fibrinolysetherapie und Verbrauchskoagulopathie
Anmerkungen	Versand gefroren Angabe der Abnahmezeit erforderlich ° Fremdleistung

Plasminogen-Aktivator- Inhibitor° PAI	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!
Normalwerte	7 - 43 ng/ml
Indikationen	Beurteilung des fibrinolytischen Potentials Überwachung bei Fibrinolysetherapie und Verbrauchskoagulopathie
Anmerkungen	° Fremdleistung Versand gefroren Angabe der Abnahmezeit erforderlich Der Fibrinolyseinhibitor PAI-1 unterliegt starken Tagesschwankungen, daher sollte die Blutentnahme morgens erfolgen (Konzentration morgens am höchsten). Wegen der geringen Probenstabilität ist eine schnelle Weiterleitung der Probe notwendig (wenn möglich gefrorenes Citratplasma). Bitte beachten Sie, dass die Untersuchung nicht dafür geeignet ist einen PAI-1 Mangel zu diagnostizieren. Bei klinischem Verdacht ist eine molekulargenetische Untersuchung zu empfehlen (1-2 ml EDTA-Blut und die Einverständniserklärung n. GenDG).
Pneumocystis jirovecii°	
Probenmaterial	1. Wahl: BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	vorwiegend bei Immunsuppression
Anmerkungen	° Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Die sterile flexible Abstrichbürste darf vor der Abstrichentnahme nicht in das Transportröhrchen eingetaucht d.h. nicht befeuchtet werden. Abstrichbürste in beide Nasenlöcher tief einführen und unter Drehbewegungen entnehmen. Nach der Probengewinnung Tupfer in das flüssige Transportmedium (0,9%-iger NaCl-Lsg.) überführen und den Tupferstiel an der dafür vorgesehenen Einkerbung durch Abbrechen über der Röhrchenkante kürzen, damit der Deckel dicht verschlossen werden kann. Das Material sollte noch am selben Tag ins Labor transportiert werden, andernfalls ist die Probe bei 2-8°C zu lagern.

Pneumokokken	
Probenmaterial	z.B. Rachenabstrich
Methode	Kultureller Nachweis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach Abschluss der Bebrütungszeit des jeweiligen Materials
Pneumokokken IgG-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 3,3 mg/l
Indikationen	Bestimmung des Impferfolgs nach Pneumokokkenimpfung
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: PNEG Ansatztage: 1x je Woche
Poliomyelitis (Kinderlähmung), Polio-Virus-Ak Typ 1/3	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	NT Neutralisationstest
Normalwerte	negativ
Indikationen	Impfkontrolle, Schutzwert 1:8

Polychlorierte Biphenyle°

Probenmaterial	10 ml EDTA-Blut
Indikationen	lipophile Umweltchemikalien Innenraumbelastung: Dichtungsmassen, Brandschutz berufliche Exposition; Verweildauer im Körper ca. 3 Jahre
Anmerkungen	PCB-Spezialröhrchen anfordern ° Fremdleistung Vorkommen: Polychlorierte Biphenyle (PCBs) finden sich u.a. in Transformatorölen, Kleinkondensatoren von Leuchtstoffröhren, dauerelastischem Dichtungsmaterial und Brandschutzanstrichen. Sie sind ubiquitär verbreitet und reichern sich in bestimmten Nahrungsmitteln an z.B. Fisch, Milch, tierischen Fetten. Inhalative Belastung: Die inhalative PCB-Aufnahme durch Lunge und Haut wird erkennbar über den Nachweis der niedermolekularen PCBs (erhöhte Werte bei PCB 28, 52 und/oder 101). PCB 28 Referenzwert siehe Befund PCB 52 Referenzwert siehe Befund PCB 101 Referenzwert siehe Befund Aufnahme: Die PCB-Aufnahme (PCB 138, 153 und 180) erfolgt im Wesentlichen durch die Nahrung, auch durch Muttermilch. Die Werte für PCB 138, PCB 153 und PCB 180 steigen mit dem Alter (Referenzwert s. Befund). Polychlorierte Biphenyle sind seit 2001 verboten. Klinik: Die chronische Belastung mit PCBs kann Haut, Leber, Lunge, Nerven und Immunsystem schädigen. Ab welcher PCB-Konzentration Symptome auftreten, ist unbekannt. Liegen die PCB-Konzentrationen über den Werten der normalen Hintergrundbelastung, so sollte die Ursache gesucht und die Belastung reduziert werden.
Polyneuropathie	
Probenmaterial	1 ml Serum

Polyoma BK Virus-DNA quant.°	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	• V. a. systemische Virusaktivierung v. a. bei Nierentransplantierten • Virämie-Monitoring bei Nierentransplantierten • BK Virus assoziierte Nephropathie (BKVAN)
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: BKV Ansatztage: täglich Mo. - Sa.
Porphobilinogen° (PBG)	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin kühl gesammelt/Spontanurin
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 1.9 mg/d
Indikationen	Porphyrien Schwermetallintoxikation Leberschädigungen (Alkohol, Arzneimittel schädigung)
Anmerkungen	z.B. im Kühlschränk Tagesmenge angeben s. auch δ-Aminolävulinsäure Phenothiazine stören! ° Fremdleistung
Porphyrine, gesamt	
Probenmaterial	30 ml vom 24-Std.-Urin/Spontanurin
Methode	Spektroskopie
Normalwerte	< 175 µg/d
Indikationen	Suchtest bei Porphyrien Schwermetall intoxication Leberschäden (Alkohol, Arzneimittel),
Anmerkungen	kühl, dunkel gesammelt Kühlschränk (4 - 8° C) Angabe der Tagesmenge s.a. Porphobilinogen und d-Aminolävulinsäure
Porphyrine im Stuhl°	
Probenmaterial	10 g einer gut durchmischten 24-Std.-Stuhlprobe
Normalwerte	< 34 µg/g Stuhl
Anmerkungen	kühl und dunkel gelagert ° Fremdleistung

Porphyrin-Fractionen°	
Probenmaterial	30 ml vom 24-Std.-Urin
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 120 µg/d Kopro- < 5 µg/d Pentacarboxy- < 7 µg/d Hexacarboxy- < 10 µg/d Heptacarboxy < 33 µg/d Uro-Porphyrin
Indikationen	Differenzierung erst ab 100 µg/l Gesamtporphyrin
Anmerkungen	kühl, dunkel gesammelt Kühlschrank (4 - 8° C) Angabe der Tagesmenge s.a. Porphobilinogen und d-Aminolävulinsäure ° Fremdleistung
PR3-AK (Proteinase 3-Autoantikörper)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 2,0 U/ml grenzwertig 2,0 - 3,0 U/m positiv > 3,0
Anmerkungen	Radiologie Analyt Kürzel: PR3ANW Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Pregabalin im Serum	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich: 2-5 µg/ml toxischer Bereich: ab 10 µg/ml
Indikationen	Antiepileptika
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PREGA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme im steady state vor der nächsten Gabe. Die biologische HWZ von Pregabalin beträgt 6 Std.

Pregnantriol°													
Probenmaterial	20 ml vom 24-Std.-Urin über 1 ml Eisessig												
Normalwerte	bis 6 J. < 0.15 mg/d 6-11 J. < 0.40 mg/d 12-14 J. < 1.50 mg/d ab 15 J. < 2.00 mg/d												
Indikationen	Pubertas praecox Chorionepitheliom Therapiekontrolle bei Adrenogenitalem Syndrom (AGS)												
Anmerkungen	Tagesmenge angeben ° Fremdleistung												
Pregnenolon°													
Probenmaterial	3,5 ml Serum, GEFROREN!												
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)												
Normalwerte	<table border="1"> <tr> <td>Männer:</td><td>290 - 1600 ng/L</td></tr> <tr> <td>Frauen:</td><td></td></tr> <tr> <td>< 31 Jahre</td><td>270 - 2580 ng/L</td></tr> <tr> <td>< 41 Jahre</td><td>220 - 3240 ng/L</td></tr> <tr> <td>< 51 Jahre</td><td>390 - 2050 ng/L</td></tr> <tr> <td>> 50 Jahre</td><td>290 - 1360 ng/L</td></tr> </table>	Männer:	290 - 1600 ng/L	Frauen:		< 31 Jahre	270 - 2580 ng/L	< 41 Jahre	220 - 3240 ng/L	< 51 Jahre	390 - 2050 ng/L	> 50 Jahre	290 - 1360 ng/L
Männer:	290 - 1600 ng/L												
Frauen:													
< 31 Jahre	270 - 2580 ng/L												
< 41 Jahre	220 - 3240 ng/L												
< 51 Jahre	390 - 2050 ng/L												
> 50 Jahre	290 - 1360 ng/L												
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: PREGSS Ansatztage: 1 - 2 x je Woche Stabilität 7 Tage bei - 20 °C												
Primidon mit Phenobarbital als Metabolit													
Probenmaterial	1 ml Serum vor nächster Dosis												
Methode	FPIA (Fluoreszenz-Polarisations-Immunoassay)												
Normalwerte	Primidon 5 – 10 µg/ml Phenobarbital 10 – 40 µg/ml												
Indikationen	Primidon: Eliminationshalbwertszeit 6 - 8 Std. maximaler Wert: 2 – 4 Std. nach letzter Dosis												
Anmerkungen	Phenobarbital: Eliminationshalbwertszeit 50 – 120 Std.												

Probe II°: Kupfer-Bestimmung, Quecksilber-Bestimmung

Probenmaterial	Urin II: 10 – 20 ml
Methode	Spontanurin
Indikationen	30 – 45 Min. nach DMPS i.v. oder 2 h nach DMPS oral
Anmerkungen	Quecksilber > 50 µg/g Kreatinin spricht für eine Quecksilberbelastung durch Amalgam. Bei Kupferwerten > 2500 µg/g Kreatinin und Quecksilber < 50 µg/g Kreatinin ist ein erneuter DMPS-Test nach 4 Wochen zu erwägen (wegen des hohen Kupfergehaltes war die Mobilisierung von Quecksilber evtl. zu gering). ° Fremdleistung

proBNB NT-proBNP

Probenmaterial	1 ml Serum													
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)													
Normalwerte	Klinisch cut-off: 125 pg/ml <125 pg/ml Ausschluss chron Herzinsuffizienz (HI) <300 pg/ml Ausschluss akute Herzinsuffizienz (HI) >450 pg/ml bei Pat. <50 J. HI wahrscheinlich. Graubereich: 125-450 pg/ml. >900 pg/ml bei Pat. >50 J. HI wahrscheinlich. Graubereich: 125-900 pg/ml. >1800 pg/ml bei Pat. >75 J. HI wahrscheinlich. Graubereich: 125-1800 pg/ml.													
Indikationen	N-terminales pro B-Typ natriuretisches Peptid Diagnostischer Marker bei Herzinsuffizienz, Schweregrad der Stadien (NYHA I-IV)													
Anmerkungen	Analyt Kürzel: BNPNT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table><tr><th rowspan="2">Material</th><th colspan="3">Lagerung/Stabilität</th><th rowspan="2">Probenmenge</th></tr><tr><th>-20 °C</th><th>2 - 8 °C</th><th>RT</th></tr><tr><td>Serum(BNPNT)</td><td>24 Monate</td><td>6Tage</td><td>3Tage</td><td>100µl</td></tr></table>	Material	Lagerung/Stabilität			Probenmenge	-20 °C	2 - 8 °C	RT	Serum(BNPNT)	24 Monate	6Tage	3Tage	100µl
Material	Lagerung/Stabilität			Probenmenge										
	-20 °C	2 - 8 °C	RT											
Serum(BNPNT)	24 Monate	6Tage	3Tage	100µl										

Procalcitonin					
Probenmaterial	1 ml Serum Stabilität 2-8 °C: 48h (abgesert)				
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)				
Normalwerte	In einer Studie mit dem Elecsys BRAHMS PCT Test unter Verwendung von 492 Proben von augenscheinlich gesunden Männern (245) und Frauen (247) wurden folgende Normalwerte ermittelt: 0.046 ng/mL (95. Perzentil). Klinischer Cutoff-Wert Hinweis: Die nachstehend angegebenen Cutoff-Werte können in Abhängigkeit von der klinischen Situation variieren. Die PCT-Serumkonzentrationen sind bei klinisch relevanten bakteriellen Infektionen erhöht und steigen mit zunehmendem Schweregrad der Erkrankung weiter an. Allerdings kann die gleiche Infektionsquelle je nach individueller Immunantwort und klinischer Situation zu individuell verschiedenen Erhöhungen der PCT-Konzentrationen führen. Aus diesem Grund sollten Ärzte die PCT-Ergebnisse in Verbindung mit weiteren Laborbefunden und klinischen Symptomen des Patienten verwenden und die konkreten Werte im Kontext der klinischen Situation des Patienten interpretieren. Die angegebenen Referenzbereiche dienen daher nur zur Orientierung. Diagnose von systemischen bakteriellen Infektionen/Sepsis*^{17,18,41} *SIRS, Sepsis, schwere Sepsis und septischer Schock wurden gemäß den Kriterien der Konsensuskonferenz des American College of Chest Physicians/ der Society of Critical Care Medicine kategorisiert.⁴² <table><tr><th>ng/mL PCT</th><th>Analyse</th></tr><tr><td>< 0.5</td><td>Lokale bakterielle Infektion ist möglich. Systemische Infektion (Sepsis) ist unwahrscheinlich. Niedriges Risiko für ein Fortschreiten zur schweren systemischen Infektion (schweren Sepsis). WICHTIG: PCT-Konzentrationen < 0.5 ng/mL schließen eine Infektion nicht aus, da lokalisierte Infektionen (ohne systemische Symptome) mit derart niedrigen Konzentrationen verbunden sein können.</td></tr></table>	ng/mL PCT	Analyse	< 0.5	Lokale bakterielle Infektion ist möglich. Systemische Infektion (Sepsis) ist unwahrscheinlich. Niedriges Risiko für ein Fortschreiten zur schweren systemischen Infektion (schweren Sepsis). WICHTIG: PCT-Konzentrationen < 0.5 ng/mL schließen eine Infektion nicht aus, da lokalisierte Infektionen (ohne systemische Symptome) mit derart niedrigen Konzentrationen verbunden sein können.
ng/mL PCT	Analyse				
< 0.5	Lokale bakterielle Infektion ist möglich. Systemische Infektion (Sepsis) ist unwahrscheinlich. Niedriges Risiko für ein Fortschreiten zur schweren systemischen Infektion (schweren Sepsis). WICHTIG: PCT-Konzentrationen < 0.5 ng/mL schließen eine Infektion nicht aus, da lokalisierte Infektionen (ohne systemische Symptome) mit derart niedrigen Konzentrationen verbunden sein können.				

Procalcitonin

	Wenn die PCT-Messung sehr früh nach Beginn der bakteriellen Infektion (< 6 Stunden) erfolgt, können die Werte noch niedrig ausfallen. In diesem Fall sollte PCT nach 6-24 Stunden erneut gemessen werden.
≥ 0.5 bis < 2	Systemische Infektion (Sepsis) ist möglich, aber verschiedene andere Erkrankungen können den PCT-Spiegel ebenfalls erhöhen (siehe unten). Moderates Risiko für ein Fortschreiten zur schweren systemischen Infektion (schweren Sepsis). Der Patient sollte engmaschig überwacht werden, sowohl klinisch als auch durch erneute PCT-Messung innerhalb von 6-24 Stunden.
≥ 2 bis < 10	Systemische Infektion (Sepsis) ist wahrscheinlich, sofern nicht andere Ursachen bekannt sind. Hohes Risiko für ein Fortschreiten zur schweren systemischen Infektion (schweren Sepsis).
≥ 10	Wesentliche systemische Entzündungsantwort, praktisch ausschließlich aufgrund von schwerer bakterieller Sepsis oder septischem Schock. Hohe Wahrscheinlichkeit einer schweren Sepsis oder eines septischen Schocks.

Differenzialdiagnose von Infektionen der unteren Atemwege²¹

ng/mL PCT	Analyse
< 0.1	Deutet auf das Fehlen einer bakteriellen Infektion hin. Von der Gabe von Antibiotika wird stark abgeraten, auch bei Vorliegen einer beeinträchtigten Lungenreserve bei AECOPD.
0.1 bis 0.25	Bakterielle Infektion ist unwahrscheinlich. Von der Gabe von Antibiotika wird abgeraten.
> 0.25 bis 0.5	Bakterielle Infektion ist wahrscheinlich. Antibiotikabehandlung wird empfohlen.
> 0.5	

Procalcitonin		
		Deutet auf das Vorliegen einer bakteriellen Infektion hin. Antibiotikabehandlung wird stark empfohlen.
	Entscheidungshilfe für Antibiotika bei Sepsis ⁴³ und Infektionen der unteren Atemwege ²²	
Indikationen	Entzündungsmarker bei schweren bakteriellen und parasitären und durch Pilze verursachten Infektionen mit systemischer Körperreaktion (Sepsis, SIRS)	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PRCA Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Stabilitäten / Präanalytik: nach Gerinnung sofort abseren Stabilität 2-8 °C: 48h (abgesert) 17 Harbarth S, Holeckova K, Froidevaux C, et al. Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6, and interleukin-8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am J Respir Crit Care Med 2001;164:396-402. 18 Müller B, Becker KL, Schächinger H, et al. Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit. Crit Care Med 2000;28:977-983. 21 Schuetz P, Christ-Crain M, Thomann, et al. Effect of procalcitonin-based guidelines vs standard guidelines on antibiotic use in lower respiratory tract infections: the ProHOSP randomized controlled trial. JAMA 2009;302:1059-1066. 22 Schuetz P, Wirz Y, Sager R, et al. Effect of procalcitonin-guided antibiotic treatment on mortality in acute respiratory infections: a patient level meta-analysis. Lancet Infect Dis 2018;18,95-107. 41 Brunkhorst FM, Wegschneider K, Forycki ZF, et al. Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of SIRS, sepsis, severe sepsis, and septic shock. Intensive Care Med, 2000;26 Suppl 2:148-152. 42 American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992;20:864-874.	

Procalcitonin

43 Schuetz P, Raad I and Amin DN. Using procalcitonin-guided algorithms to improve antimicrobial therapy in ICU patients with respiratory infections and sepsis. *Curr Opin Crit Care*, 2013;19(5):453-460.

Progesteron	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	weiblich: 0 Jahre Für diese Altersgruppe ist noch kein Referenzbereich verfügbar. von 1 Jahr - 9 Jahre < 0,1 ng/ml von 10 Jahre - 14 Jahre < 0,1 ng/ml Follikelphase: < 0,89 ng/ml [<2,83 nmol/l] Ovulationsphase: 0,12 - 12,0 ng/ml [0,38 - 38 nmol/l] Lutealphase: 1,8 - 24 ng/ml [5,7 - 76 nmol/l] Schwangerschaft 1. Trim.: 11 - 44 ng/ml [35 - 141 nmol/l] von 15 Jahre - 34 Jahre Follikelphase: < 0,89 ng/ml [<2,83 nmol/l] Ovulationsphase: 0,12 - 12,0 ng/ml [0,38 - 38 nmol/l] Lutealphase: 1,8 - 24 ng/ml [5,7 - 76 nmol/l] Schwangerschaft 1. Trim.: 11 - 44 ng/ml [35 - 141 nmol/l] von 35 Jahre - 51 Jahre Follikelphase: <0,89 ng/ml [<2,83 nmol/l] Ovulationsphase: 0,12 - 12,0 ng/ml [0,38 - 38 nmol/l] Lutealphase: 1,8 - 24 ng/ml [5,7 - 76 nmol/l] Schwangerschaft 1. Trim.: 11 - 44 ng/ml [35 - 141 nmol/l] Postmenopause: <0,13 ng/ml [<0,4 nmol/l] von 52 Jahre - 120 Jahre* Follikelphase: < 0,89 ng/ml (< 2,83 nmol/l) Ovulationsphase: 0,12 - 12 ng/ml (0,38 - 38 nmol/l) Lutealphase: 1,8 - 24 ng/ml (5,7 - 76 nmol/l) Postmenopause: < 0,13 ng/ml (< 0,4 nmol/l) Schwangerschaft 1. Trim.: 11 - 44 ng/ml [35 - 141 nmol/l] 2. Trimester: 25 - 83 ng/ml [81 - 264 nmol/l] 3. Trimester: 59 - 214 ng/ml [187 - 681 nmol/l] männlich von 1 Jahr - 14 Jahre < 0,1 ng/ml von 15 Jahre - 120 Jahre* < 0,2 ng/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!
Indikationen	Beurteilung der Gelbkörperfunktion Nachweis einer Ovulation Verlaufsbeurteilung der Infertilitätstherapie Schwangerschaftsüberwachung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PRG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Progesteron

	Lagerung:	
	Temperatur	Dauer
	-20°C	6 Monate
	2-8 °C	5 Tage
	Raum Temperatur	1 Tag

proGRP Tumormarker°

Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Normalwerte	<66.3 pg/ml (95. Perzentil) Median: 42.7
Anmerkungen	° Fremdleistung

Proinsulin, intakt°

Probenmaterial	1 ml EDTA Plasma GEFROREN! Abnahme nüchtern
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	< 7 pmol/l
Indikationen	Früher Hinweis auf einen zukünftigen Typ 2-Diabetes (Insulinresistenz, Prädiabetes); Makro- und kardiovaskulärer Risikofaktor
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: PROII Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. EDTA Plasma GEFROREN! Abnahme nüchtern

Prokollagen-III-Peptid° P-III-P

Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IRMA (Immunradiometrischer Assay)
Normalwerte	0.3 – 0.8 E/ml
Indikationen	Wert der aktuellen intrahepatischen Fibrosierungsaktivität z.B. durch aktive Bindegewebsvermehrung: virusbedingte Leberfibrose, Zirrhose
Anmerkungen	° Fremdleistung

Prokollag Typ I N-Propeptid°			
Probenmaterial	Serum GEFROREN!		
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)		
Normalwerte	Kinder		
	Alter	Mädchen/Jungen	
	bis 12 Monate	227 - 4763 ug/l	
	ab 1 Jahr	347 - 1088 ug/l	
	ab 2 Jahre	178 - 646 ug/l	
	ab 3 Jahre	135 - 746 ug/l	
	ab 4 Jahre	85,7 - 902 ug/l	
	ab 5 Jahre	112 - 768 ug/l	
	ab 6 Jahre	188 - 887 ug/l	
	ab 7 Jahre	49,9 - 1200 ug/l	
	ab 8 Jahre	120 - 1021 ug/l	
		Mädchen	
	ab 9 Jahre	42,7 - 952 ug/l	
	ab 10 Jahre	62,5 - 915 ug/l	
	ab 11 Jahre	65,3 - 856 ug/l	
	ab 12 Jahre	47,0 - 985 ug/l	
	ab 13 Jahre	37,1 - 1196 ug/l	
	ab 14 Jahre	58,5 - 451 ug/l	
	ab 15 Jahre	45,6 - 600 ug/l	
	ab 16 Jahre	14,6 - 238 ug/l	
	ab 17 Jahre	36,3 - 144 ug/l	
		Jungen	
	ab 9 Jahre	45,2 - 553 ug/l	
	ab 10 Jahre	48,3 - 770 ug/l	
	ab 11 Jahre	143 - 2502 ug/l	
	ab 12 Jahre	67,2 - 855 ug/l	
	ab 13 Jahre	268 - 1515 ug/l	
	ab 14 Jahre	148 - 1200 ug/l	
	ab 15 Jahre	81,8 - 961 ug/l	
	ab 16 Jahre	77,7 - 430 ug/l	
	ab 17 Jahre	38,7 - 495 ug/l	
	Erwachsene		

Prokollag Typ I N-Propeptid°

		ab 18 Jahren	Frauen
		prämenopausal	15,1 - 58,6 ug/l (Median: 27,8 ug/l)
		postmenopausal mit HRT	14,3 - 58,9 ug/l (Median: 28,5 ug/l)
		postmenopausal ohne HRT	20,3 - 76,3 ug/l (Median: 42,9 ug/l)
		ab 18 Jahren	Männer
			13,9 - 85,5 ug/l
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: PROKN Prokollagen-1-N-terminales Propeptid wird bei der Synthese des Kollagen Typ I freigesetzt. Die Konzentration korreliert mit der Osteoblastenaktivität und stellt somit einen Marker für die Knochenneubildung dar.		

Prolaktin	
Probenmaterial	1 ml Serum, nüchtern BE 8 – 10 Uhr stressfrei
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	weiblich: von 0 - 4 Tage 102,0 - 496,0 µg/l von 5 Tage - 0 Monate 8,1 - 178,0 µg/l von 1 Monat - 11 Monate 5,3 - 63,0 µg/l von 12 Monate - 6 Jahre 1,0 - 17,1 µg/l von 7 Jahre - 7 Jahre 3,0 - 18,4 µg/l von 8 Jahre - 10 Jahre 2,7 - 12,6 µg/l von 11 Jahre - 17 Jahre 2,6 - 16,2 µg/l von 18 Jahre - 34 Jahre 2,0 - 25,0 µg/l Follikelphase: 2 - 18 µg/l [42 - 382 mIU/l] Lutealphase: 4.4 - 25 µg/l [93 - 530 mIU/l] Schwangerschaft: 10 - 419 µg/l [212 - 8883 mIU/l] von 35 Jahre - 120 Jahre* 1,8 - 25,0 µg/l Follikelphase: 2 - 18 µg/l [42 - 382 mIU/l] Lutealphase: 4.4 - 25 µg/l [93 - 530 mIU/l] Schwangerschaft: 10 - 419 µg/l [212 - 8883 mIU/l] Postmenopause: 1.8 - 20 µg/l [38 - 424 mIU/l] Schwangerschaft: 1. Trimester 10 - 101 µg/l [211 - 2141 mIU/l] 2. Trimester 17 - 270 µg/l [360 - 5724 mIU/l] 3. Trimester 68 - 419 µg/l [1435 - 8883 mIU/l] männlich: von 0 - 4 Tage 102,0 - 496,0 µg/l von 5 Tage - 0 Monate 8,1 - 178,0 µg/l von 1 Monat - 11 Monate 5,3 - 63,0 µg/l von 12 Monate - 6 Jahre 0,8 - 16,9 µg/l von 7 Jahre - 17 Jahre 2,4 - 13,7 µg/l von 18 Jahre - 120 Jahre* 4,0 - 15,2 µg/l METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!
Indikationen	Frauen: Amenorrhoe, Zyklusstörungen Anovulation, Corpus-luteum-Insuffizienz, Galaktorrhö, Libidostörungen, Hirsutismus, Akne Männer: Libidostörungen, Potenzstörungen, Hypogonadismus mit Gynäkomastie, Galaktorrhö, stimulierende Wirkung bestimmter Pharmaka
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PRO Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Lagerung:

Prolaktin			
	Temperatur	Dauer	
	-20°C	6 Monate	
	2-8 °C	14 Tage	
	Raum Temperatur	5 Tage	
Prolin°			
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!		
Normalwerte	88 - 290 µmol/l		
Anmerkungen	° Fremdleistung		
Propafenon°			
Probenmaterial	2 ml Serum		
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)		
Normalwerte	0.4 – 1.6 µg/ml		
Indikationen	Antiarrhythmikum z.B. Rytmonorm®		
Anmerkungen	° Fremdleistung		
Protein C			
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!		
	abgetrenntes Plasma bitte ein 2. Mal zentrifugieren und trennen		
Methode	chromogene Messung		
Normalwerte	70 – 140 %		
Indikationen	angeborener Protein C-Mangel DD: rezidivierende Thromboembolien Angabe der Abnahmezeit erforderlich		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PROC Ansatztage: 1 x Woche Mi. oder Do.		
	Versand gefroren siehe Thrombophiliediagnostik		
Protein Z°			
Probenmaterial	Citratplasma gefroren		
Methode	chromogen		
Normalwerte	1000 µg/l - 4000 µg/l		
Indikationen	Abklärung Blutungsneigung, Abortneigung, Thrombophilie.		
Anmerkungen	° Fremdleistung		
	Protein Z ist nicht stabil. Das Blut muss daher schnellstmöglich abzentrifugiert und das Plasma tiefgefroren versendet werden.		
	Abrechnungsziffer (EBM): 32227		

Prothipendyl	
Probenmaterial	Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Als Antipsychotikum: therapeutisch: 30-80 ng/ml toxisch: ab 500 ng/ml Als Schlafmittel: therapeutisch: 5-20 ng/ml (12h nach Einnahme von 40-80 mg) toxisch: ab 500 ng/ml
Prothrombinfragment F1+2°	
Probenmaterial	1 ml Citratplasma gefroren
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	69 - 229 pmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: PROT Ansatztage: bei Bedarf Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitöhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Bitte separates Probenröhrchen für diese Untersuchung mitschicken!

Prothrom.-Polymorphismus°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Indikationen	Thrombose (Embolie)-Abklärung Ausschluss erhöhter Thromboseneigung (Thrombophilie)
Anmerkungen	Humangenetische Untersuchungen° (Genotypisierungen) Patienteneinwilligung erforderlich (GenDG) Seit dem 01.02.2010 gilt das Gendiagnostik-Gesetz (GenDG). Zur Diagnostik erblicher Erkrankungen bitte die erforderliche Patienteneinwilligung beilegen. Bitte beachten: für PCR- Untersuchungen ist unbedingt eine separate EDTA-Probe einzusenden; bei Chromosomenanalysen ist Heparinblut erforderlich. Faktor II-Mutation ° Fremdleistung
Protoporphyrin° erythrocytär	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Blut
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 50 µg/dl
Indikationen	erythropoetische Porphyrrien Schwermetall vergiftungen (z.B. Pb) Anämien (hämolytische, sideroblastische Thalassämie) Neoplasien im Bereich des Knochenmarks
Anmerkungen	° Fremdleistung
Protriptylin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 70 – 170 ng/ml toxisch > 700 ng/ml
Indikationen	z.B. Maximed®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PROTR Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden!

PSA Prostataspezifisches Antigen

Probenmaterial	1 ml Serum										
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)										
Normalwerte	< 4,000 ng/ml Richtwert für radikal prostatektomierte Patienten: < 0,01 ng/ml 0,01 - 0,10 ng/ml: Kontrollbedürftiger Bereich, Graubereich > 0,20 ng/ml: Biochemisches Rezidiv Die biologische Halbwertszeit des PSA beträgt 2 - 3 Tage: Hohe präoperative Werte benötigen daher Wochen bis zur Normalisierung. Erhöht: Prostata-Ca benigne Prostata-Hypertrophie Prostatitis Im erweiterten Graubereich (3 - 10 ng/ml) wird die Bestimmung des freien PSA ergänzt und durch Quotientenbildung eine Interpretationshilfe gegeben (s. Präanalytische Hinweise) METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!										
Indikationen	Tumormarker bei Prostata-Ca; bei benigner Prostatahypertrophie < 10 ng/ml										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PSA Ansatz Tage: täglich Mo. - Fr. Cave: Manipulationen an der Prostata 48 Std. vor der Blutentnahme ergeben falsch hohe Werte <table><tr><td colspan="2">Lagerung:</td></tr><tr><td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr><tr><td>-20°C</td><td>24 Wochen</td></tr><tr><td>2-8°C</td><td>5 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>1 Tag</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	24 Wochen	2-8°C	5 Tage	Raum Temperatur	1 Tag
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	24 Wochen										
2-8°C	5 Tage										
Raum Temperatur	1 Tag										

PTH-related-Peptid°	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma gefroren
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Die Bestimmung des Parathormon-related Protein (PTHrP) dient zur Differentialdiagnose einer Hyperkalzämie bei bekannten oder vermuteten Tumorleiden • Zur Verlaufskontrolle der Tumorhyperkalziämie solider Tumoren unter Therapie, insbesondere Mamma-, Nieren- und kleinzelliges Bronchialkarzinom • prognostischer Faktor für die Entwicklung von Knochenmetastasen, z. B. beim Mamma- und Bronchialkarzinom • unter Therapie mit Bisphosphonaten
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: PTHR Ansatztage: Di., Do. Präanalytik/Hinweise: EDTA-Blut nach der Entnahme zentrifugieren, das überstehende Plasma in neues Röhrchen überführen, entsprechend beschriften, einfrieren und gefroren versenden.
Punktate aus primär sterilen Bereichen	
Probenmaterial	Gelenkpunktat, Pleurapunktat, Perikardpunktat, Aszitespunktat
Methode	Kultur
Indikationen	Arthritis, Pleuritis, Perikarditis, Peritonitis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 14 Tagen Hinweise zur Entnahme / Lagerung Proben möglichst vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie gewinnen. Punktion unter aseptischen Bedingungen. So viel Material wie möglich (10-20 ml) in einem sterilen Schraubverschlussröhrchen schnellstmöglich einsenden. Die Einsendung eines mit Punktat benetzten Abstrichtupfers kann zu einer unnötig niedrigen Keimnachweisrate führen. Keine Flüssigkeiten in Abstrichröhrchen füllen, da diese nicht dicht schließen und somit die Gefahr einer Kontamination bzw. des Auslaufens besteht. Ist nur < 0,5ml Punktat vorhanden, soll das Material mit einem Abstrichtupfer aufgenommen und im Transportmedium eingesandt werden. Probenlagerung Natives Punktat bei 2-8°C lagern.

Puumala-IgG /-IgM-Ak PUUV	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: PUGB, PUMB Ansatztage: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Vorkommen: Mitteleuropa und europäischer Teil Russlands Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS). Dieses Syndrom ist bei den in Deutschland vorkommenden Virustypen (PUUV und DOBV) sehr selten. Puumala-Serotyp: milde Verlaufsform
Pyridinolin°	
Probenmaterial	20 ml Spontanurin aus 2. Morgenurin
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	70 – 250 µg/g Kreatinin
Indikationen	Osteoporosediagnostik
Anmerkungen	Marker für Knochenabbauprozesse ° Fremdleistung
Pyruvat°	
Probenmaterial	1 ml NaF-Plasma BE aus ungestauter Vene
Methode	enzymatisch
Normalwerte	39 – 82 µmol/l
Indikationen	Brenztraubensäure Vit.-B1-Mangel Lebererkrankungen Urämie Schwermetallintoxikation
Anmerkungen	° Fremdleistung

Pyruvatkinase°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut
Methode	Photometrie
Normalwerte	5.3 – 17.3 U/g Hb
Indikationen	V.a. Pyruvatkinase-Mangel, zweithäufigster
Anmerkungen	Erythrozyten-Enzyme° ° Fremdleistung
Q-Fieber IgG AK (<i>Coxiella burnetii</i> - Phase I)°	
Probenmaterial	1 ml Serum, 1 ml Vollblut
Methode	IFT
Normalwerte	<1:16 Titer
Indikationen	Abklärung Chronifizierung
Anmerkungen	° Fremdleistung Q-Fieber (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: QFIG1
Q-Fieber IgG AK (<i>Coxiella burnetii</i> - Phase II)°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	<1:16 Titer
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: QFIGFT Bei Verdacht auf chronische Q-Fieber Infektion ist die Bestimmung der Anti-Phase I-Antikörper empfohlen. bestimmt werden Ak gegen Phase-II-Antigen Auftreten der IgG-Ak ab 2. Monat nach Krankheitsbeginn, Persistenz bis 5 Jahre Q-Fieber (Meldepflicht IfSG) <i>Coxiella burnetii</i> Die Infektion wird durch das gramnegative Bakterium <i>Coxiella burnetii</i> (Familie Rickettsien) verursacht. Übertragung von infizierten Tieren (Schaf, Rind, Ziege) über Kot, Wolle, Häute durch Inhalation (Staub) und Verarbeitung von Fleisch. Eine Übertragung durch Nahrungsmittel ist in seltenen Fällen möglich (Rohkäse, Rohmilch). Im akuten Krankheitsstadium häufig grippeähnliche Symptome mit Entwicklung einer atypischen Pneumonie. Inkubationszeit: 2-4 Wochen.

Q-Fieber IgM AK (Coxiella burnetii - Phase I)°	
Probenmaterial	1 ml Serum, 1 ml Vollblut
Methode	IFT
Normalwerte	<1:16 Titer
Indikationen	Abklärung Chronifizierung
Anmerkungen	° Fremdleistung Q-Fieber (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: QFIM1
Q-Fieber IgM AK (Coxiella burnetii - Phase II)°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Normalwerte	<1:16 Titer
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: QFIMFT Phase II-IgM-Ak zur Früherkennung, Anstieg ca. 2 Wochen post infektionem Bei Verdacht auf chronische Q-Fieber Infektion ist die Bestimmung der Anti-Phase I-Antikörper empfohlen. Q-Fieber (Meldepflicht IfSG) Coxiella burnetii Die Infektion wird durch das gramnegative Bakterium Coxiella burnetii (Familie Rickettsien) verursacht. Übertragung von infizierten Tieren (Schaf, Rind, Ziege) über Kot, Wolle, Häute durch Inhalation (Staub) und Verarbeitung von Fleisch. Eine Übertragung durch Nahrungsmittel ist in seltenen Fällen möglich (Rohkäse, Rohmilch). Im akuten Krankheitsstadium häufig grippeähnliche Symptome mit Entwicklung einer atypischen Pneumonie. Inkubationszeit: 2-4 Wochen.

Quantiferon	
Probenmaterial	Der Quantiferon-TB Gold Plus Test umfasst 4 Blutentnahmeröhrchen. Unbeimpfte Röhrchen bei 4-25°C lagern, vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.
Indikationen	Sowohl auf dem Kassenschein als auch auf dem Fragebogen <i>muss</i> die Indikation vermerkt sein ! <i>Nur bei folgenden Indikationen</i> ist eine Kassenabrechnung möglich (andernfalls Abrechnung als IGEL-Leistung bei ambulanten Patienten): • chron.-entzündliche Erkrankungen vor TNF-α-Blocker Therapie • HIV / AIDS-Patient nur vor Therapieentscheidung einer behandlungsbedürftigen TB • vor Einleitung einer Dialysebehandlung bei chron. Niereninsuffizienz • vor Organtransplantation(Niere, Herz, Lunge, Leber, Pankreas)
Anmerkungen	Ansatztage: nach Bedarf, Probenentnahme/-versand: Montag bis Donnerstag; nicht vor Feiertagen! Der Quantiferon-TB Gold Plus Test umfasst 4 Blutentnahmeröhrchen. Unbeimpfte Röhrchen bei 4-25°C lagern, vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Blutabnahme Jedes der 4 Röhrchen sowie die Originalverpackung mit Patientennamen oder Barcode beschriften. Blutabnahme mit beiliegendem Vacutainer-Blutentnahmesystem. Hierdurch wird jedes Röhrchen langsam mit 1 ml Blut befüllt (seitliche schwarze Markierung kennzeichnet den zulässigen Bereich von 0,8-1,2 ml). Sobald der Blutfluss abgeschlossen ist, Röhrchen noch 2-3 Sek. auf der Nadel belassen, damit der erforderliche Füllstand erreicht wird. Wird die Fülllinie nicht erreicht, empfiehlt es sich, eine neue Probe zu entnehmen. <i>Alternativ:</i> <i>Blut mit Spritze entnehmen und 1 ml in jedes Röhrchen füllen (bis zur schwarzen Markierung).</i> <i>Bei Verwendung einer Butterfly-Nadel ist mit Hilfe eines Leerröhrchens sicherzustellen, dass die Schlauchverbindung gefüllt ist, bevor die Quantiferon-Röhrchen aufgesetzt werden.</i>

Quantiferon	
	Sofort danach Röhrchen 10x schwenken (nicht schütteln/vortexen), sodass Innenwand ganz mit Blut bedeckt ist. Laboranforderung und Fragebogen Röhrchen in Originalverpackung zusammen mit ausgefülltem Fragebogen + Anforderungsschein noch am selben Tag ins Labor (Lagerung/Transport bei Raumtemperatur!).
Quecksilber°	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut 10 ml Urin
Methode	AAS/Hydrid (Atomabsorptionsspektrometrie)
Normalwerte	Blut < 2 µg/l BAT 25 µg/l Urin <1 µg/l BAT 100 µg/l nach DMPS: < 50 µg/g Krea
Indikationen	V.a. akute oder chronische Intoxikation, Amalgamträger
Anmerkungen	s.a. DMPS-Test ° Fremdleistung
Quetiapin	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 100 – 500 ng/ml toxisch > 1000 ng/ml
Indikationen	Antipsychotikum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: QUET Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden!
Quotient (κ/λ) i.S.	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	0.26 – 1.65
Indikationen	M. Waldenström, chronisch lymphatische Leukämie, monoklonale gammopathie

RAST-Haselholz	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	siehe Befund
reaktive Arthritis (REA)	
Anmerkungen	Lyme-Arthritis (Borrelien) Posturethritische REA (Gonokokken, Chlamydia trachomatis) Postenteritische REA (Salmonellen, Shigellen, Campylobakter, Yersinien) genetische Disposition: bei 80% der Patienten HLA-B27 nachweisbar
Reduktase-Mangel	
Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut (steril)
Methode	PCR
Indikationen	Hyperhomocysteinämie (atherogenes Risiko) Risikofaktor für arterielle und venöse Gefäß-Reduktase-Mangel verschlüsse

Reiberschema ohne Oligoklonale Banden°	
Probenmaterial	2 ml Serum + 2 ml Liquor
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	V.a. Blut-Liquor-Schrankenfunktionsstörung, V. a. intrathekale entzündliche Prozesse, Erkennung krankheitstypischer intrathekalen Immunglobulin-Reaktionsmuster
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Ansatztage: täglich, Mo. - Sa. Beinhaltet folgende Untersuchungen: Albumin-Quotient (L/S) Analyt Kürzel: ALBL/ALBS Immunglobulin M (IgM)-Quotient Analyt Kürzel: IGML Immunglobulin G (IgG)- Quotient Analyt Kürzel: IGG/IGGL Immunglobulin A (IgA)-Quotient Analyt Kürzel: IGA/IGAL Interpretation: • Ein erhöhter Albumin-Quotient ist ein Zeichen für eine Blut-Liquor-Schrankenfunktionsstörung (z. B. bei entzündlichen Erkrankungen des ZNS, mechanischer Behinderung des Liquorflusses, Blutungen, Hirninfarkten oder artifizieller Blutbeimengung) • Die Berechnung einer intrathekalen Ig-Synthese gibt Hinweis auf entzündliche Reaktion im ZNS Präanalytik/Hinweise: Allgemeine Hinweise zur Gewinnung und Versand von Liquorproben: • Polypropylen-Röhrchen (PP) verwenden. Kein Glas- oder Polystyrol-Röhrchen (PS). Probendeckel fest verschließen und mit Parafilm abdichten. • Bei multiplen Untersuchungen aus Liquor, ausreichend Liquor als mehrere Einzelproben (mind. 3 x á 3ml) einsenden, da Messungen u.a. in weiteren Fremdlaboren erfolgen. • Um wiederholtes Auftauen zu vermeiden, kann aus gefrorenen Liquor nur ein Analyt bestimmt werden. Daher für mehrere Untersuchungen aus gefrorenen Liquor, zusätzliche gefrorene Einzelproben einsenden. • Für Reiber-Diagramme Serum und Liquor gleichzeitig (<1h Abstand) abnehmen und taggleich einsenden. • Falls dringliche Analyte priorisiert werden sollen, bitte diese auf Anforderung vermerken.

Reiberschema ohne Oligoklonale Banden°

Serum UND Liquor erforderlich. Probenentnahme muss gleichzeitig erfolgen! Serum UND Liquor mit Angabe der Abnahmezeit, immer zusammen taggleich einsenden.

Renin	
Probenmaterial	2 ml EDTA-Plasma GEFROREN! Bei gleichzeitiger Anforderung von Metanephrinen im Plasma bitte ein separates Röhrchen einsenden. Dies gilt auch bei gleichzeitiger Einsendung von Katecholaminen im Plasma
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	Normwerte, bei Abnahme sitzend: 2.6-27.6 ng/l liegend: 1.7-23.9 ng/l Methodenwechsel – bitte geänderte Referenzbereiche beachten.
Indikationen	Differentialdiagnostik von Hochdruckerkrankungen Bartter Syndrom;
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RNI Ansatztage: 1 x / Woche Versand gefroren s. auch Aldosteron Antihypertensiva möglichst vor der Bestimmung absetzen (siehe auch Aldosteron-Renin-Quotient) Präanalytik (Patienten-/Probenvorbereitung) Patientenvorbereitung: Referenzwerte variieren, wenn die Blutentnahme liegend oder aufrecht erfolgt. Die Proben werden zwischen 7 und 10 Uhr morgens nüchtern in aufrechter Position (30 Minuten Stehen und Gehen) oder in Rückenlage (mindestens 30 Minuten Liegen) genommen. Probenvorbereitung: Die Proben sollten nach der Probenentnahme so schnell wie möglich getrennt und bei -20°C bis -25°C gelagert werden. Versand in der Kühlbox gefroren. Praxen die keine Zentrifuge und/oder kein Gefrierschrank zur Verfügung haben, können Patienten entweder zur Blutabnahme direkt ins Labor schicken oder das abgenommene EDTA-Blut innerhalb von 30 Minuten abholen lassen. Die Abholung erfolgt im nahegelegenen Umkreis per Kurierfahrer. Um einer Kryoaktivierung vorzubeugen, müssen die Proben bei Raumtemperatur entnommen, zentrifugiert und gelagert werden Plasma NICHT bei 2-8 °C lagern, da es ansonsten zu einer Kryoaktivierung kommen könnte. Beurteilung der Proben nach den Kriterien ikterisch, hämolytisch, lipämisch mit anschließender

Renin	
	Dokumentation in der Labor-EDV. Proben, die Präzipitate enthalten, müssen vor dem Test zentrifugiert werden.
Respiratory-Syncytial Virus (RSV) RT-PCR	
Probenmaterial	1. Wahl: Tiefer Nasopharyngealabstrich mit dünner, flexible Abstrichbürste "cobas PCR Media-Abstrichset", BAL 2. Wahl: Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret
Methode	RT-PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std. Abstrichbürste in beide Nasenlöcher tief einführen und unter Drehbewegungen entnehmen. Nach der Probengewinnung Tupfer in das flüssige Transportmedium überführen und den Tupferstiel an der dafür vorgesehenen Einkerbung durch Abbrechen über der Röhrchenkante kürzen, damit der Deckel dicht verschlossen werden kann. Das Material sollte noch am selben Tag ins Labor transportiert werden, andernfalls ist die Probe bei 2-8°C zu lagern. Antikörpernachweis: 1 ml Serum für RSV-Serologie Verfügt im Akutstadium über keine Aussagekraft. Dauer bis zur Antikörperbildung: 8-10 Tage
Retikulozyten	
Probenmaterial	1 ml EDTA-Blut
Methode	Durchflusszytometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 5 – 20 0/00 der Erythrozyten
Indikationen	Prüfung der effektiven erythropoetischen Knochenmarksaktivität Differenzierung der Anämien in hypo-, normo- und hyperregenerative Formen Kontrolle des Therapieansprechens bei Mangelanämien (Eisen-, Folat-, Vit. B12-Mangel)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RETI Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Retikulozyten Produktions-Index (RPI) bei Anämie: adäquate Regeneration RPI > 2 bei Anämie: inadäquate Regeneration RPI < 2

Retikulozyten-Hb (CHR)					
Probenmaterial	3 ml frisches EDTA-Blut				
Methode	Mikroskopie der Ausstriche				
Normalwerte	> 26 pg (Hb je Retikulozyt)				
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RETH Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.				
	Eisenstoffwechsel, EPO-Therapie, Erythropoese der letzten 3-4 Tage				
Retikulozyten-Produktions-Index					
Probenmaterial	EDTA-Blut				
Normalwerte	Bei Anämie: adäquate Regeneration RPI >2 Bei Anämie: inadäquate Regeneration RPI <2				
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RPI Ansatzstage: täglich Mo. - Fr.				
Retinolbindendes Protein°					
Probenmaterial	Serum				
Methode	Turbidimetrie				
Normalwerte	3,10 - 7,23 mg/dl				
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: RETINS Ansatzstage: 1 x wöchentlich Testdauer: 24 Std.				
	<table><tr><td>Präanalytik</td><td>Stabilität: Serum: bis zu 8 h bei RT, 3 Tage bei 2-8 °C, 4 Wochen bei -20 °C</td></tr><tr><td></td><td>Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Keine hämolytischen, lipämischen oder mikrobiell bzw. mit partikeln verunreinigte Proben einsenden.</td></tr></table>	Präanalytik	Stabilität: Serum: bis zu 8 h bei RT, 3 Tage bei 2-8 °C, 4 Wochen bei -20 °C		Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Keine hämolytischen, lipämischen oder mikrobiell bzw. mit partikeln verunreinigte Proben einsenden.
	Präanalytik	Stabilität: Serum: bis zu 8 h bei RT, 3 Tage bei 2-8 °C, 4 Wochen bei -20 °C			
	Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden. Keine hämolytischen, lipämischen oder mikrobiell bzw. mit partikeln verunreinigte Proben einsenden.				
Reverse T3°					
Probenmaterial	Serum GEFROREN!				
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)				
Normalwerte	0,12 - 0,35 ng/ml				
Indikationen	Abklärung unklarer fT4- oder fT3-Erniedrigungen				
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: RT3 Ansatzstage: bei Bedarf				

Rheumafaktor RF, quantitativ	
Probenmaterial	1 ml Serum Gelenk-, Pleura-, Perikardpunktat
Normalwerte	< 14 IU/ml (negativ)
Indikationen	V.a. rheumatoide Arthritis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RF, RFLG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. IgM-Antikörper, die gegen das Fc-Teil am IgG Molekül gerichtet sind
Rheumatoide Arthritis	
Probenmaterial	je 1 ml Serum Gelenk-, Pleura-, Perikardpunktat
Indikationen	V.a. rheumatoide Arthritis
Anmerkungen	Rheumatoide Arthritis (RA); chronische Polyarthritis In Schüben verlaufende entzündliche Systemerkrankung mit einer Autoimmunpathogenese, die sich vorwiegend durch symmetrische, erodierende Gelenksynovitis manifestiert. Prävalenz 1-3% Diagnostik: RF, CCP-Ak, CRP, ANA, ENA, Gammaglobuline, Kryoglobuline, ASL
Ri-ANNA-Typ2-Ak°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT
Normalwerte	< 1 : 1000
Anmerkungen	° Fremdleistung
Ri-Anna-Typ2- Ak im Liquor°	
Probenmaterial	Liquor
Normalwerte	< 1 : 1000
Anmerkungen	° Fremdleistung
Ribonukleinsäure (RNA)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	SLE, Kollagenosen
Ribosomen Ak	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 1:100 Titer-E.

Rickettsia typhi IgG-Ak IFT°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 1:64 Titer-E
Anmerkungen	° Fremdleistung
Rickettsien-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	IgG/IgM-Ak < 1:64
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Rickettsien sind Erreger der Fleckfiebererkrankung; Läuse, Zecken und Milben dienen als Überträger. Inkubationszeit 7-21 Tage, höchste Titer ca. 15 Tage nach Ausbruch der Krankheit ° Fremdleistung
Rifampicin im Serum	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	0,1 - 15 µg/ml
Anmerkungen	Hinweis: Wegen der kurzen Halbwertszeit sollte die Blutabnahme nicht später als etwa 1 bis max. 2 Stunden nach Medikamentengabe erfolgen.
Risperidon	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	2 - 30 ng/l
Indikationen	Neuroepileptikum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: RISP Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden!

Ritalinsäure im Serum°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	siehe Bericht
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: RTS Für die pharmakologisch inaktive Ritalinsäure sind keine therapeutischen Bereiche definiert. Der Serumspiegel der Ritalinsäure findet sich normalerweise etwa um den Faktor 10 bis 50 höher als die Muttersubstanz Methylphenidat. Auf diese Weise dient die Bestimmung der Ritalinsäure als informativer Parameter der ergänzenden Einschätzung des Methylphenidatspiegels hinsichtlich Compliance, Metabolisierung und als Plausibilitätskontrolle unter Einnahme von Methylphenidat, da das Methylphenidat selbst infolge der sehr kurzen Halbwertszeit je nach Zeitpunkt der Blutentnahme ggf. schon nicht mehr nachweisbar ist.
Rotavirus-Direktnachweis	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Antigennachweis
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 24 Std.
Röteln-Avidität	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Abklärung des Infektionszeitpunktes insbesondere in der Schwangerschaft; Angabe der SSW wird erbeten
Röteln-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 IU/ml grenzwertig 10 - 20 IU/ml positiv > 20 IU/ml, Immunität anzunehmen
Indikationen	Immunstatus (insbesondere bei Gravidität)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ROEG, ROEGMU Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf

Röteln-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 2.5 U/ml grenzwertig 2.5 - 3.5 U/ml positiv > 3.5 U/ml
Indikationen	V.a. frische Infektion bei fraglicher/keiner Immunität, Abklärung einer Frühphase der Infektion
Röteln im Liquor IgG, IgM°	
Probenmaterial	Liquor für Indexbestimmung taggleiches Serum erforderlich
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0.7 - 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Anmerkungen	siehe Liquordiagnostik ° Fremdleistung
Rotigotin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	therap. Berereich: 0.10 - 0.70 µg/l toxischer Bereich: >2.00 µg/l
RSV-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	KBR
Normalwerte	Grenzstufe 1:40 Kinder 1:10
Indikationen	Bronchiolitis Tracheobronchitis Pneumonie akute Otitis media
Anmerkungen	° Fremdleistung

Rufinamid°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	5,0 - 30,0 mg/l
Indikationen	Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: RUFI Ansatzzeit: Di. - Sa. Blutentnahme unmittelbar vor nächster Gabe. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden. Blutentnahme unmittelbar vor der nächsten Medikamentengabe.
S100 - Tumormarker°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA
Normalwerte	< 0.11 µg/l
Indikationen	• Tumormarker beim malignen Melanom zur Differenzialdiagnose, Abschätzung der Prognose, zum Therapiemonitoring und zur Nachsorge • Neurologische Indikationen z. B. als Destruktions-Parameter zur Bewertung von organischen Hirnschäden z. B. Hypoxie, nach Reanimation, Contusio cerebri, Schlaganfall, neurodegenerative Erkrankungen.
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: PS100S Ansatzzeit Mo - Fr Bitte beachten: Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Messmethoden und/oder Testherstellern ermittelt wurden, sind nicht miteinander vergleichbar. Bei der Verlaufsbeurteilung von Tumormarkern ist stets der gleiche Test zu verwenden. Bei Patienten unter Therapie mit hohen Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag) sollte die Probenentnahme mindestens 8 h nach der Applikation erfolgen, da hohe Biotin-Gaben die Protein S100-Bestimmung stören können.

Saccharomyces cerevisiae-Ak (IgA) Serum°	
Probenmaterial	Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	< 20 RE/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia Labor Ingelheim Analyt Kürzel: SACCA Ansatztage: bei Bedarf
Saccharomyces cerevisiae-Ak (IgG) Serum°	
Probenmaterial	Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	< 20 RE/ml
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia Labor Ingelheim Analyt Kürzel: SACCG Ansatztage: bei Bedarf
Salicylsäure°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	als Analgetikum < 50 µg/m als Antirheumatikum < 250 µg/ml
Indikationen	Medikamentennachweis z.B. Aspirin V. a. Überdosierung: Schwindel, Ohrensausen, Erbrechen, Leberschäden
Anmerkungen	° Fremdleistung
Salmonellen-Ak°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Indikationen	Nachweis von Antikörpern gegen Salmonellenspezifische Antigene Durchfallerkrankungen Reaktive Arthritis
Anmerkungen	außerhalb der Akkreditierung
Salmonellen Nachweis im Stuhl	
Probenmaterial	Stuhl
Methode	Kultur
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage.
Sandfliegenfieber Virus-Ak, Serotyp Toskana	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Anmerkungen	Erreger des Sandfliegenfiebers sind Bunyaviren. Übertragung durch Sandfliegen Verbreitung im Mittelmeergebiet Inkubationszeit 2-4 Tage

Sandfliegen-IgG /-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: SANG, SANM Ansatztage: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Vorkommen: Mitteleuropa und europäischer Teil Russlands Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS). Dieses Syndrom ist bei den in Deutschland vorkommenden Virustypen (PUUV und DOBV) sehr selten.
Sarcosin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	0 - 9 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
SARS-CoV-2-RNA PCR	
Probenmaterial	Nasopharyngealabstrich (tief), Nasen-/Rachenabstrich, Rachenspülwasser
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Corona Virus Disease
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Ergebnisabruf von SARS CoV 2 PCR-Ergebnissen unter https://corona.labor-hermann.de/patient/input.html Corona Virus (Covid 19)

SARS-CoV-2 S (Spike) IgG/IgM AK (ECLIA, Roche)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	negativ < 0.80 U/ml positiv ≥ 0.80 U/ml
Indikationen	Z.n. Infektion; Impfstatus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: COVID Ansatztage: 1x Woche, Fr. - Bei erhöhtem Aufkommen / Eilig nach Bedarf Meldepflicht IfSG Corona Virus (Covid 19)
Saure Phosphatase	
Probenmaterial	1 ml Serum 8 – 9 Uhr nüchtern, hämolysefrei
Methode	Photometrie
Normalwerte	< 6.6 U/l
Indikationen	Verdacht auf Metastasen bei malignen Tumoren
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Saure Prostataphosphatase	
Probenmaterial	Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	< 3,5 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: PP_R Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
SCC - Tumormarker°, Squamous cell carcinoma antigen	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 2.7 ng/ml
Indikationen	Plattenepithelkarzinome Cervix-Ca Lungen-Ca Kopf-Hals-Tumoren
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: SCC
Schilddrüsen-Ak, Thyreoglobulin-Ak, TPO-Ak (Anti-Thyreoidale Peroxidase), T3-Ak, T4-Ak, TSH-Rezeptoren-Ak (TRAK)	
Probenmaterial	2 ml Serum
Indikationen	chron. autoimmune Thyreoiditis (Hashimoto) chron. autoimmune Thyreoiditis (Hashimoto) M. Basedow Hashimoto-Thyreoiditis M. Basedow
Anmerkungen	s. a. Autotoantikörper

Schwangerschaftsnachweis im Urin (β Beta -HCG im Urin)	
Probenmaterial	5 ml frischer Morgenurin
Methode	Immunoassay
Normalwerte	Nachweisgrenze 25 mU/ml HCG
Anmerkungen	Nachweisgrenze 25 mU/ml HCG Nachweis ab ca. 14. Gestationstag
Scl-70 Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 7 U/ml
Indikationen	EliA Scl-70 stellt eine Hilfe bei der klinischen Diagnose der systemischen Sklerose (diffuse Form) dar
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SCL70S Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Selen im Serum	
Probenmaterial	5 ml Serum
Methode	AAS
Normalwerte	50 – 120 µg/l
Indikationen	Selen-Mangel; Therapiekontrolle bei Substitution
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SE Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Symptome eines Selenmangels: Muskelschwäche Kardiomyopathie, Immundefekte
Selen im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	AAS
Normalwerte	2 – 31 µg/l
Indikationen	berufsbedingte Intoxikation (Glas-, Porzellan-, Elektroindustrie)

Seoul-IgG /-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	BeeBlot
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: SEGB, SEMB Analyt Kürzel: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Vorkommen: weltweit Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS). Dieses Syndrom ist bei den in Deutschland vorkommenden Virustypen (PUUV und DOBV) sehr selten.
Serin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	68 - 160 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
Serotonin im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum, nach 30 min. zentrifugieren
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	40 - 200 ng/ml
Indikationen	V.a. Karzinoid (Tumore des APUD-Systems)
Anmerkungen	2 Tage vor der Blutentnahme Serotonin-haltige Nahrung absetzen

Sertralin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Indikationen	10 - 150 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SERT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnahmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 22 - 36 Std.
sFlt-1/PIGF-Quotient°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	< 38
Anmerkungen	° Fremdleistung

SHBG Sexualhormonbindendes Globulin	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	weiblich: von 0 - 6 Tage 7,5 - 35,0 nmol/l von 7 Tage - 13 Tage 10,0 - 51,0 nmol/l von 14 Tage - 3 Jahre 13,0 - 97,0 nmol/l von 4 Jahre - 6 Jahre 42,0 - 131,0 nmol/l von 7 Jahre - 7 Jahre 48,0 - 172,0 nmol/l von 8 Jahre - 8 Jahre 43,0 - 152,0 nmol/l von 9 Jahre - 9 Jahre 43,0 - 148,0 nmol/l von 10 Jahre - 10 Jahre 30,0 - 143,0 nmol/l von 11 Jahre - 11 Jahre 29,0 - 127,0 nmol/l von 12 Jahre - 12 Jahre 13,0 - 110,0 nmol/l von 13 Jahre - 13 Jahre 18,0 - 87,0 nmol/l von 14 Jahre - 14 Jahre 24,0 - 128,0 nmol/l von 15 Jahre - 15 Jahre 26,0 - 147,0 nmol/l von 16 Jahre - 16 Jahre 30,0 - 177,0 nmol/l von 17 Jahre - 17 Jahre 47,0 - 120,0 nmol/l von 18 Jahre - 19 Jahre 26,0 - 103,0 nmol/l von 20 Jahre - 49 Jahre 32,0 - 128,0 nmol/l von 50 Jahre - 120 Jahre* 27,0 - 128,0 nmol/l männlich: von 0 - 6 Tage 8,8 - 51,0 nmol/l von 7 Tage - 13 Tage 13,0 - 69,0 nmol/l von 14 Tage - 3 Jahre 20,0 - 114,0 nmol/l von 4 Jahre - 6 Jahre 34,0 - 141,0 nmol/l von 7 Jahre - 7 Jahre 67,0 - 188,0 nmol/l von 8 Jahre - 8 Jahre 57,0 - 168,0 nmol/l von 9 Jahre - 9 Jahre 53,0 - 181,0 nmol/l von 10 Jahre - 10 Jahre 40,0 - 164,0 nmol/l von 11 Jahre - 11 Jahre 30,0 - 149,0 nmol/l von 12 Jahre - 12 Jahre 33,0 - 141,0 nmol/l von 13 Jahre - 13 Jahre 21,0 - 124,0 nmol/l von 14 Jahre - 14 Jahre 18,0 - 70,0 nmol/l von 15 Jahre - 15 Jahre 18,0 - 64,0 nmol/l von 16 Jahre - 16 Jahre 18,0 - 62,0 nmol/l von 17 Jahre - 17 Jahre 19,0 - 42,0 nmol/l von 18 Jahre - 19 Jahre 20,0 - 60,0 nmol/l von 20 Jahre - 49 Jahre 18,0 - 54,0 nmol/l von 50 Jahre - 120 Jahre* 20,0 - 77,0 nmol/l METHODENWECHSEL! Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!

SHBG Sexualhormonbindendes Globulin

Indikationen	erniedrigt: bei Hyperandrogenismus, Cushing, polyzystischen Ovarien, Adipositas, Myxödem, Hypothyreose erhöht: bei Thyreotoxikose, nach Östrogengaben, bei Leberzirrhose, Hypogonadismus, Gynäkomastie auch bei V.a. Verschiebung des Gleichwichts zwischen freiem und protein-gebundendem Testosteron										
Anmerkungen	Analyst Kürzel: SHBG Ansatztage: täglich Mo. - Fr. <table><tr><th colspan="2">Lagerung:</th></tr><tr><th>Temperatur</th><th>Dauer</th></tr><tr><td>-20°C</td><td>12 Monate</td></tr><tr><td>2-8 °C</td><td>7 Tage</td></tr><tr><td>Raum Temperatur</td><td>5 Tage</td></tr></table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	12 Monate	2-8 °C	7 Tage	Raum Temperatur	5 Tage
Lagerung:											
Temperatur	Dauer										
-20°C	12 Monate										
2-8 °C	7 Tage										
Raum Temperatur	5 Tage										
Shigellen spp.											
Probenmaterial	1 g Stuhl										
Methode	Kultureller Nachweis										
Indikationen	Durchfallerkrankungen, Shigellen-Ruhr										
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage 4 Serotypen: Shigella boydii/sonnei/flexneri/dysenteriae. Shigellen werden fäkal-oral übertragen und verursachen akute, schleimige und häufig blutige Durchfälle. Infektionen häufig nach Auslandsreisen durch kontaminiertes Wasser oder Speisen. Inkubationszeit 1-7 Tage										

Silicium°			
Probenmaterial	Analyt Kürzel	Material	
	SILE	EDTA-Blut	
	SILS	Serum	
	SILU	Urin	
Methode	Analyt Kürzel	Methode	
	SILE	AAS (Atomabsorptionsspektrometrie)	
	SILS	AAS (Atomabsorptionsspektrometrie)	
	SILU	ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)	
Normalwerte	Analyt Kürzel	Normalwerte	Nachweisgrenze
	SILE	190 - 470 µg/L	20 µg/l
	SILS	132 - 421 µg/L (Bis 3000 µg/L bei alimentärer Belastung)	20 µg/l
	SILU	2900 - 12100 µg/L	20 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: SILE / SILS / SILU Ansatztage: 1 - 2 x je Woche Neutral-Monovetten/-Vacuette ohne jegliche Zusätze verwenden. Kein Gel. Keine Kügelchen. Keine Glasrohre.		
Sin Nombre-IgG /-IgM-Ak			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	BeeBlot		
Anmerkungen	Hantaviren (Meldepflicht IfSG) Analyt Kürzel: SIGB, SIMB Ansatztage: nach Bedarf Familie der Bunyaviridae, Inkubationszeit 10 - 30 Tage (Ausnahme nur 5 oder bis 60 Tage) Bei allen Hantaviren in der Regel milde Verlaufsformen (grippeähnliche Symptome), Nierenbeteiligung möglich. Asiatische und europäische Hantavirusstämme können Auslöser des hämorrhagischen Fiebers mit renalen Syndrom sein (HFRS).		

Sirolimus Rapamycin	
Probenmaterial	1 ml EDTA-Blut BE morgens vor nächster Dosis
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Bereich 4 – 15 ng/ml Einzeltherapie 12 – 20 ng/ml Toxisch > 20 ng/ml
Indikationen	Immunsuppression bei Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantation
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SIRO Ansatztage: 3 x / Woche Di., Do., Fr.
Skelettmuskel-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Myastenia gravis Thymom
Anmerkungen	° Fremdleistung
SLA Leber-Pankreas Ag - Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Autoimmunhepatitis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SLA Ansatztage: 2 x / Woche
Somatomedin C / IGF-1	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	altersabhängige Normwerte s. Befund
Indikationen	Insulin-like-growth-faktor-1 erhöht: hypophysärer Großwuchs bei Kindern, Akromegalie erniedrigt: Minderwuchs
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SOMC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Speicheldrüsendangepithel Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Sjögren-Syndrom
Anmerkungen	° Fremdleistung
Spermatozoen-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Vasektomierte Männer ungeklärte Infertilität

Spermien-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum/Plasma
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 60 U/ml
Indikationen	Infertilität ungeklärter Ursache immunologisch bedingte Subfertilität
Anmerkungen	° Fremdleistung
Spezifisches Gewicht	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	pyknometrisch
Normalwerte	1010 – 1040 g/l
SS-A / Ro Antikörper	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 7 U/ml
Indikationen	Sjögren-Syndrom, (SLE)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SSA_RO Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
SS-B /La Antikörper	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	0,4 - 320 U/ml
Indikationen	Elia La stellt eine Hilfe bei der klinischen Diagnose des Sjögren-Syndroms und des Systemischen Lupus erythematodes (SLE) dar
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SSB_LA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Stachelzelldesmosomen Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT (Immunfluoreszenz-Test)
Normalwerte	< 1:10 Titer
Indikationen	Pemphigus
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: STAK/STAK2 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Staphylokokken	
Methode	Kultureller Nachweis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach Abschluss der Bebrütungszeit des jeweiligen Materials

Steinanalyse°	
Probenmaterial	Steinmaterial
Methode	Röntgendiffraktion
Indikationen	Harnsteine, Nierensteine, Gallensteine
Anmerkungen	im verschlossenem Gefäß bzw. Röhrchen versenden ° Fremdleistung
Sterilitätskontrolle	
Probenmaterial	Sporenpäckchen
Indikationen	Inaktivierung eines biologischen Indikators
Anmerkungen	Funktionsprüfung Heißluft- und Dampfsterilisatoren (Autoklaven) Sporenpäckchen im Labor anfordern (außerhalb der Akkreditierung)
STH-Somatotropes Hormon Wachstumshormon/HGH	
Probenmaterial	1 ml Serum, nüchtern
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)
Normalwerte	Tageswerte: 0 – 13 J. < 6 ng/ml Tageswerte: ab 14 J. < 3.5 ng/ml
Indikationen	ausgeprägte Wach-Schlaf-Rhythmik
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HGH Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Weiterführende Untersuchungen: IGF-1, IGFBP-3, Funktionstests
Stiripentol	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC/MS (Liquid Chromatographie Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 1,0 - 10,0 mg/l toxisch. Bereich > 15 Die biologische Halbwertszeit von Stiripentol beträgt 4 - 13 h.
Streptokokken	
Methode	Kultureller Nachweis
Indikationen	(Tonsillitis – nur aus Rachenabstrich)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach Abschluss der Bebrütungszeit des jeweiligen Materials
Streptokokken-Ak	
Probenmaterial	Serum
Anmerkungen	Nachweis bei Folgeerkrankung

Styrol®	
Probenmaterial	am Schichtende: 5 ml Blut 30 ml Urin
Normalwerte	Blut < 1.0 g/l Urin 2.5 g/l
Indikationen	Lösungsmittel, V.a. Intoxikation
Anmerkungen	Bitte Röhrchen für organische Lösungsmittel anfordern! als Metabolite Mandelsäure/Phenylglyoxylsäure ° Fremdleistung
Sulfasalazin als Sulfapyridin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	5 - 50 µg/ml
Sulpirid	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap. Ber.: 200-1000 ng/ml Kritisch ab: 1000 ng/ml
Sultiam	
Probenmaterial	2 ml Serum BE morgens vor Einnahme, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 2 - 8 µg/ml toxischer Bereich: ab 12 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum z.B. Ospolot®
Anmerkungen	Analyt Kürzel: SULT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 3 - 30 Std.

symmetrisches Dimethylarginin°	
Probenmaterial	Serum GEFROREN!
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	80 - 140 µg/L
Indikationen	inaktives Isomer von Asymmetrisches Dimethylarginin (ADMA).
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: SDMA Ansatztage: 1 x je Woche Tiefgefroren. Serum möglichst rasch (innerhalb von 1 Stunde) nach Blutentnahme von anderen Blutbestandteilen abtrennen und tieffrieren. Stabilität bei -20°C 14 Tage
T3-Ak, T4-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	unklare Schilddrüsenhormonkonstellation Diskrepanzen zwischen Klinik und Schilddrüsenwerten
Anmerkungen	° Fremdleistung
T3 Trijodthyronin	
Anmerkungen	Seit dem 01.07.2007 ist die Bestimmung von Gesamt T3 keine vertragsärztliche Leistung mehr und deshalb nicht mehr anforderbar. Alternative Untersuchung ist die Bestimmung von FT3.
T4 Thyroxin	
Anmerkungen	Seit dem 01.07.2007 ist die Bestimmung von Gesamt T3 keine vertragsärztliche Leistung mehr und deshalb nicht mehr anforderbar. Alternative Untersuchung ist die Bestimmung von FT3.

Tacrolimus (FK 506)																																															
Probenmaterial	1 ml EDTA																																														
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)																																														
Normalwerte	therap. Bereich 4 – 15 ng/ml Therapeutische Bereiche für Tacrolimus (Talkonzentration, LC-MS/MS) nach Transplantation: <table border="1"> <tr><td colspan="2">Nierentransplantation:</td></tr> <tr><td colspan="2">mit Corticosteroiden und Mycophenolat</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>4 - 12 µg/l</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>4 - 9 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">mit Corticosteroiden und Everolimus</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>4 - 7 µg/l</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>2 - 4 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">Lebertransplantation:</td></tr> <tr><td colspan="2">mit Corticosteroiden und Mycophenolat/od. Everolimus</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>6 - 10 µg/l</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>5 - 8 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">Monotherapie</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>10 - 15 µg/l</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>5 - 10 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">Herztransplantation:</td></tr> <tr><td colspan="2">mit Corticosteroiden und Mycophenolat</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>10 - 15 µg/l</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>5 - 12 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">mit Corticosteroiden und mTOR Inhibitor</td></tr> <tr><td>Initialtherapie:</td><td>keine Angaben</td></tr> <tr><td>Erhaltungstherapie:</td><td>3 - 8 µg/l</td></tr> <tr><td colspan="2">Stammzellen:</td></tr> <tr><td>mit Methotrexat</td><td>10 - 20 µg/l</td></tr> </table> Literatur: IATDMCT Konsensus Dokument 2019: doi: 10.1097/FTD.0000000000000640; ISHLT Leitlinie 2023: doi: 10.1016/j.healun.2022.10.015	Nierentransplantation:		mit Corticosteroiden und Mycophenolat		Initialtherapie:	4 - 12 µg/l	Erhaltungstherapie:	4 - 9 µg/l	mit Corticosteroiden und Everolimus		Initialtherapie:	4 - 7 µg/l	Erhaltungstherapie:	2 - 4 µg/l	Lebertransplantation:		mit Corticosteroiden und Mycophenolat/od. Everolimus		Initialtherapie:	6 - 10 µg/l	Erhaltungstherapie:	5 - 8 µg/l	Monotherapie		Initialtherapie:	10 - 15 µg/l	Erhaltungstherapie:	5 - 10 µg/l	Herztransplantation:		mit Corticosteroiden und Mycophenolat		Initialtherapie:	10 - 15 µg/l	Erhaltungstherapie:	5 - 12 µg/l	mit Corticosteroiden und mTOR Inhibitor		Initialtherapie:	keine Angaben	Erhaltungstherapie:	3 - 8 µg/l	Stammzellen:		mit Methotrexat	10 - 20 µg/l
Nierentransplantation:																																															
mit Corticosteroiden und Mycophenolat																																															
Initialtherapie:	4 - 12 µg/l																																														
Erhaltungstherapie:	4 - 9 µg/l																																														
mit Corticosteroiden und Everolimus																																															
Initialtherapie:	4 - 7 µg/l																																														
Erhaltungstherapie:	2 - 4 µg/l																																														
Lebertransplantation:																																															
mit Corticosteroiden und Mycophenolat/od. Everolimus																																															
Initialtherapie:	6 - 10 µg/l																																														
Erhaltungstherapie:	5 - 8 µg/l																																														
Monotherapie																																															
Initialtherapie:	10 - 15 µg/l																																														
Erhaltungstherapie:	5 - 10 µg/l																																														
Herztransplantation:																																															
mit Corticosteroiden und Mycophenolat																																															
Initialtherapie:	10 - 15 µg/l																																														
Erhaltungstherapie:	5 - 12 µg/l																																														
mit Corticosteroiden und mTOR Inhibitor																																															
Initialtherapie:	keine Angaben																																														
Erhaltungstherapie:	3 - 8 µg/l																																														
Stammzellen:																																															
mit Methotrexat	10 - 20 µg/l																																														
Indikationen	Zielwerte abhängig vom Zeitpunkt nach Transplantation, der Art des Transplantats sowie der Kombination mit anderen																																														

Tacrolimus (FK 506)	
	Immunsuppressiva. Empfehlungen des transplantierenden Zentrums beachten!
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TACR Ansatztage: 3 x / Woche Di., Do., Fr. Abnahme unmittelbar vor der nächsten Medikation bzw. vor der Morgendosis bei zwei Einnahmen am Tag
TAK Thyreoglobulin-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ < 40 U/ml
Indikationen	Verdacht auf Autoimmunerkrankung der Schilddrüse
Anmerkungen	s. a. TPO; Schilddrüsen-Ak Analyt Kürzel: TAKW Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Im selben Quartal nicht zusammen mit dem Parameter TPO abrechenbar
Tau-Protein°	
Probenmaterial	1 ml Liquor
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	< 445 pg/ml
Indikationen	Alzheimererkrankung, kombinierte Bestimmung mit β -Amyloid zur Abgrenzung gegenüber Nicht-Alzheimerdemenz
Anmerkungen	° Fremdleistung
Taurin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	6 - 126 μ mol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Testosteron, freies°

Probenmaterial	1 ml Serum																												
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)																												
Normalwerte	<table><tr><td colspan="2">weiblich</td></tr><tr><td>von 0 - 9 Jahre</td><td>< 1,70 pg/ml</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 13 Jahre</td><td>< 2,30 pg/ml</td></tr><tr><td>von 14 Jahre - 18 Jahre</td><td>< 4,30 pg/ml</td></tr><tr><td>von 19 Jahre - 38 Jahre</td><td>< 3,40 pg/ml</td></tr><tr><td>von 39 Jahre - 59 Jahre</td><td>< 2,30 pg/ml</td></tr><tr><td>von 60 Jahre - 120 Jahre*</td><td>< 2,10 pg/ml</td></tr><tr><td colspan="2">männlich</td></tr><tr><td>von 0 - 9 Jahre</td><td>0,31 - 1,30 pg/ml</td></tr><tr><td>von 10 Jahre - 13 Jahre</td><td>0,82 - 15,40 pg/ml</td></tr><tr><td>von 14 Jahre - 18 Jahre</td><td>8,30 - 21,60 pg/ml</td></tr><tr><td>von 19 Jahre - 38 Jahre</td><td>7,00 - 22,70 pg/ml</td></tr><tr><td>von 39 Jahre - 59 Jahre</td><td>6,30 - 17,80 pg/ml</td></tr><tr><td>von 60 Jahre - 120 Jahre*</td><td>2,50 - 17,80 pg/ml</td></tr></table>	weiblich		von 0 - 9 Jahre	< 1,70 pg/ml	von 10 Jahre - 13 Jahre	< 2,30 pg/ml	von 14 Jahre - 18 Jahre	< 4,30 pg/ml	von 19 Jahre - 38 Jahre	< 3,40 pg/ml	von 39 Jahre - 59 Jahre	< 2,30 pg/ml	von 60 Jahre - 120 Jahre*	< 2,10 pg/ml	männlich		von 0 - 9 Jahre	0,31 - 1,30 pg/ml	von 10 Jahre - 13 Jahre	0,82 - 15,40 pg/ml	von 14 Jahre - 18 Jahre	8,30 - 21,60 pg/ml	von 19 Jahre - 38 Jahre	7,00 - 22,70 pg/ml	von 39 Jahre - 59 Jahre	6,30 - 17,80 pg/ml	von 60 Jahre - 120 Jahre*	2,50 - 17,80 pg/ml
weiblich																													
von 0 - 9 Jahre	< 1,70 pg/ml																												
von 10 Jahre - 13 Jahre	< 2,30 pg/ml																												
von 14 Jahre - 18 Jahre	< 4,30 pg/ml																												
von 19 Jahre - 38 Jahre	< 3,40 pg/ml																												
von 39 Jahre - 59 Jahre	< 2,30 pg/ml																												
von 60 Jahre - 120 Jahre*	< 2,10 pg/ml																												
männlich																													
von 0 - 9 Jahre	0,31 - 1,30 pg/ml																												
von 10 Jahre - 13 Jahre	0,82 - 15,40 pg/ml																												
von 14 Jahre - 18 Jahre	8,30 - 21,60 pg/ml																												
von 19 Jahre - 38 Jahre	7,00 - 22,70 pg/ml																												
von 39 Jahre - 59 Jahre	6,30 - 17,80 pg/ml																												
von 60 Jahre - 120 Jahre*	2,50 - 17,80 pg/ml																												
Indikationen	bei der Frau: Virilismus, Hirsutismus, androgenbildender Tumor beim Mann: Fertilitätsstörungen, Störung der Sexualentwicklung, Kontrolle bei Substitutionstherapie und bei Hypogonadismus Allgemein ist bei der Testosteronbestimmung darauf zu achten, dass die Konzentrationen bei Männern stark altersabhängig sind, bei Frauen hingegen zyklusabhängig variieren. Auch sollte wegen zirkadianer Konzentrationsschwankungen eine Blutentnahme immer morgens erfolgen. Die Testosteronkonzentration kann nach kurzfristiger starker körperlicher Belastung ansteigen, hingegen bei längerer Belastung abfallen.																												
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: FTES Ansatztage: nach Bedarf Es empfiehlt sich die parallele Bestimmung von Gesamt-Testosteron sowie SHBG. Damit ist eine rechnerische Ermittlung des freien Testosterons möglich. Achtung: In den meisten klinischen Konstellationen ist die Berechnung zuverlässig. Nur eingeschränkt verertbar ist die Berechnung bei Beeinträchtigung der SHBG-Bindungskapazität, z.B. Schwangerschaft, Hormonsubstitutionsbehandlung bei Männern u.ä.																												

Testosteron, freies°

**Im gleichen Quartal nicht zusammen mit Testosteron
abrechenbar.**

Testosteron im Serum							
Probenmaterial	2 ml Serum Abnahme morgens						
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)						
Normalwerte	weiblich: 0 Monate 0,20 - 0,64 ng/ml von 1 Monat - 4 Jahre < 0,20 ng/ml von 5 Jahre - 10 Jahre < 0,27 ng/ml von 11 Jahre - 12 Jahre < 0,42 ng/ml von 13 Jahre - 16 Jahre < 0,70 ng/ml von 17 Jahre - 17 Jahre < 0,38 ng/ml von 18 Jahre - 49 Jahre < 0,48 ng/ml von 50 Jahre - 120 Jahre* < 0,41 ng/ml männlich: 0 Monate 0,75 - 4,00 ng/ml von 1 Monat - 4 Monate < 1,77 ng/ml von 5 Monate - 4 Jahre < 0,20 ng/ml von 5 Jahre - 9 Jahre < 0,24 ng/ml von 10 Jahre - 10 Jahre < 0,90 ng/ml von 11 Jahre - 13 Jahre < 4,80 ng/ml von 14 Jahre - 17 Jahre 1,00 - 8,70 ng/ml von 18 Jahre - 34 Jahre 2,50 - 8,40 ng/ml unterer Graubereich gemäß Empfehlungen von ISA, ISSAM, EAU, EAA und ASA: 2.3 - 3.5 ng/ml [8 - 12 nmol/l] von 35 Jahre - 49 Jahre 2,50 - 8,40 ng/ml unterer Graubereich gemäß Empfehlungen von ISA, ISSAM, EAU, EAA und ASA: 2.3 - 3.5 ng/ml [8 - 12 nmol/l] von 50 Jahre - 120 Jahre* 2,30 - 7,40 ng/ml METHODENWECHSEL!Bitte beachten Sie die geänderten Referenzbereiche!						
Indikationen	V.a. Androgenmangel oder Überproduktion						
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TES Ansatztage: täglich Mo. - Fr. s. auch LH, FSH und Prolaktin SHBG Im gleichen Quartal nicht zusammen mit freies Testosteron abrechenbar. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lagerung:</td></tr> <tr> <td>Temperatur</td><td>Dauer</td></tr> <tr> <td>-20°C</td><td>6 Monate</td></tr> </table>	Lagerung:		Temperatur	Dauer	-20°C	6 Monate
Lagerung:							
Temperatur	Dauer						
-20°C	6 Monate						

Testosteron im Serum			
	2-8 °C	14 Tage	
	Raum Temperatur	5 Tage	
Testosteron im Urin°			
Probenmaterial	10 ml vom 24-h-Urin		
Methode	LIA (Lumineszenz-Immuno-Assay)		
Normalwerte	Frauen 10 µg/d Männer 35 – 100 µg/d präpubertäre Knaben < 5 µg/d		
Indikationen	V.a. Androgenmangel oder Überproduktion		
Anmerkungen	Tagesmenge angeben s. auch LH, FSH und Prolaktin SHBG ° Fremdleistung		
Tetanus-Toxoid-Ak			
Probenmaterial	1 ml Serum		
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)		
Normalwerte	< 0.1 IU/ml kein Impfschutz oder fraglicher Impfschutz, Auffrischung empfohlen; Titerkontrolle nach 4-6 Wochen 0.11 – 1.0 IU/ml ausreichender Impfschutz; Titerkontrolle in 2 Jahren empfohlen 1.01 – 5.0 IU/ml langfristig schützender Bereich; Titerkontrolle nach 5-10 Jahren empfohlen > 5.0 IU/ml langfristig schützender Bereich; Titerkontrolle nach 10 Jahren empfohlen		
Indikationen	Überprüfung des Tetanus-Impfschutzes		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TETA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf (Meldepflicht IfSG) Impfkontrolle 4-8 Wochen nach Grundimmunisierung		
Tetrahydrocannabinol, THC/Haschisch, Marihuana			
Probenmaterial	5 ml Urin		
Anmerkungen	siehe Drogenanalytik		

Theophyllin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	therap. Bereich 10 – 20 µg/m
Indikationen	Indikation: Behandlung obstruktiver Ventilationsstörungen Apnoe Frühgeborener
Anmerkungen	Es bestehen beträchtliche individuelle Unterschiede in der Pharmakokinetik Toxizitätserscheinungen sind ab 15 µg/ml möglich Analyt Kürzel: THE Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Threonin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	102 - 190 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Thrombinzeit	
Probenmaterial	4 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Koagulometrisch
Normalwerte	10,3 - 16,6 sec
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TZT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Versand gefroren Angabe der Abnahmezeit erforderlich Gerinnungsuntersuchungen Die Referenzbereiche gelten für Erwachsene. Die Referenzbereiche für Kinder können altersabhängig abweichen. Befundkonstellationen, mögliche Ursachen und weiteres Vorgehen: aPTT verlängert, Quick, Thrombinzeit und Thrombozytenzahl normal, keine Gabe von Heparin: Mögliche Ursachen: Verminderung einer der Faktoren VIII, IX, XI, XII Inhibitoren gegen Gerinnungsfaktoren von Willebrand-Syndrom (vWS) Lupusantikoagulanzen (anamnestisch Thrombosen, Aborte) Weitere Diagnostik: Bestimmung der Einzelfaktoren: F VIII (Hämophilie A) und Faktor IX (Hämophilie B) ggf. Faktor XI und XII Diagnostik des von-Willebrand-Syndroms (u.a. Blutungszeit und von-Willebrand-Aktivität/Ristocetin-Cofaktor) Antiphospholipid-Ak, Lupus-Antikoagulans Inhibitor-Nachweis

Thrombophiliediagnostik°	
Probenmaterial	Lupus Antikoagulanz (Citratplasma gefroren (CP)) Protein C-Aktivität (Citratplasma gefroren (CP)) Cardiolipin-Ak (IgG+IgM) (Serum (S)) Prothrombin (Faktor II)-Genmutation (EDTA-Blut (EB)) Faktor V-Genmutation (Faktor V-Leiden) (EDTA-Blut (EB)) Beta-2-Glykoprotein-1-Ak (IgG+IgM) (Serum (S)) Antithrombin (Citratplasma gefroren (CP)) Protein S-Ag, frei (Citratplasma gefroren (CP))
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: THRDIA Bitte das - bis zur Markierung exakt - gefüllte Citratröhrchen zur Vermeidung von Gerinnseln direkt nach der Entnahme mehrfach vorsichtig schwenken. Nach frühestens 30 Minuten zentrifugieren (mindestens 15 min. bei mindestens 1500 x g). Plasma / Überstand vorsichtig unter Benutzung einer Pipette abheben und in ein Zweitröhrchen ohne Zusatzstoffe (Nativröhrchen) überführen. Das Röhrchen bitte als Citratplasma kennzeichnen, einfrieren und gefroren versenden. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. Bei zusätzlicher Anforderung von Gerinnungsfaktoren (Faktor II bis XIII) wird zusätzlich mindestens ein weiteres Röhrchen gefrorenes Citratplasma benötigt. Abklärung einer Thromboseneigung. Beachte: Im akuten Geschehen und unter Antikoagulation können die genetischen Ursachen (Prothrombin- und Faktor V-Leiden-Mutation) sicher bestimmt werden. Alle anderen Parameter sind am besten im antikoagulationsfreien Intervall nach Beendigung der Behandlung zu untersuchen. Hereditäre Thrombophilien werden bei bis zu 50% der Patienten mit Thrombose gefunden - es lohnt sich diese Dispositionen abzuklären, um Klarheit zu schaffen Zusätzlich dazu sind die erworbenen Thrombophilien zu nennen. hereditäre Thrombophilien: • Antithrombin-Mangel • Protein C-Mangel • Protein S-Mangel • Faktor V Leiden-Mutation / APC-Resistenz

Thrombophiliediagnostik°

- Faktor II-Genmutation (Prothrombinmutation)
- Dysfibrinogenämie

erworbene Thrombophilien:

- Antiphospholipidsyndrom mit Lupus-Antikoagulanz / Cardiolipin-Antikörpern / beta-2-Glykoprotein-Antikörpern
- HIT - Heparin induzierte Thrombozytopenie - führt nicht zu einer Blutung, sondern zu schwersten Thrombosen
- Schwangerschafts-bedingte Thromboseneigung

sonstige erworbene Thrombophilien:

- Operationen
- Hormonersatztherapie
- Kontrazeptiva
- Malignome
- Reisetrombose
- Adipositas
- Immobilisierung allgemein
- Sectio caesarea

Thromboplastinzeit TPZ Quick

Probenmaterial	2 ml frisches Citratplasma
Methode	Koagulomerisch
Normalwerte	70 – 130 % Bei Antikoagulation 20 – 35 %
Indikationen	Therapie mit Vitamin K Antagonisten (Marcumar®) Vitamin K-Mangel, verminderte Leber syntheseleistung (Hepatitis, Leberzirrhose)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TPZ Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Angabe der Abnahmezeit erforderlich Plasma sofort ins Labor schicken Gerinnungsuntersuchungen Die Referenzbereiche gelten für Erwachsene. Die Referenzbereiche für Kinder können altersabhängig abweichen.

Thrombozyten		
Probenmaterial	EDTA-Blut Citratröhrchen sind nicht geeignet!	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Alter	Werte in x 1000/ul
	0 - 6 Monate	240 - 550
	7 - 12 Monate	240 - 520
	1 - 2 Jahre	220 - 490
	3 - 4 Jahre	200 - 460
	5 - 6 Jahre	200 - 445
	7 - 11 Jahre	180 - 415
	12 - 15 Jahre	170 - 400
	16 - 17 Jahre	160 - 385
	18 - 65 Jahre	150 - 370
	ab 66 Jahre	160 - 370
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TBZ Ansatz tage: täglich Mo. - Fr.	
Thrombozyten-Ak°, freie		
Probenmaterial	2ml Serum	
Anmerkungen	Einsendung Mo – Do	
	bei Thrombozytenwerten unter 50 000/nl ist kein Nachweis mehr möglich. ° Fremdleistung	
Thrombozyten-Ak°, gebundene		
Probenmaterial	EDTA-Blut	
Anmerkungen	Einsendung Mo – Do	
	bei Thrombozytenwerten unter 50 000/nl ist kein Nachweis mehr möglich ° Fremdleistung	

Thrombozyten aus Thromboexakt

Probenmaterial	ThromboExact	
Methode	Durchflusszytometrie	
Normalwerte	Kinder	
	0 - 6 Monate	240 - 550 x 1000/ul
	7 - 12 Monate	240 - 520 x 1000/ul
	1 - 2 Jahre	220 - 490 x 1000/ul
	3 - 4 Jahre	200 - 460 x 1000/ul
	5 - 6 Jahre	200 - 445 x 1000/ul
	7 - 11 Jahre	180 - 415 x 1000/ul
	12 - 15 Jahre	170 - 400 x 1000/ul
	16 - 17 Jahre	160 - 385 x 1000/ul
	Erwachsene	
	18 - 65 Jahre	150 - 370 x 1000/ul
	ab 66 Jahren	160 - 370 x 1000/ul
Indikationen	EDTA-induzierte Thrombozytopenie (Pseudothrombozytopenie) ist ein Laborphänomen. Autoantikörper gegen Thrombozyten des EDTA-antikoagulierten Blutes führen zur Aggregation der Thrombozyten. Nur die nicht aggregierten Thrombozyten werden vom Hämatologieautomaten erkannt und gezählt.	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TBZX Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Thrombozyten im Citrat		
Probenmaterial	Citrat	
Normalwerte	siehe Befund	
Indikationen	Bei V. a. Pseudothrombozytopenie bitte Thrombo-Exakt Röhrchen anfordern	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TBZC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Thymidinkinase°										
Probenmaterial	1 ml Serum									
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)									
Normalwerte	< 7.5 U/l									
Indikationen	Therapie- und Verlaufskontrolle bei Tumoren mit hoher Proliferationsrate, z. B. lymphatische und myeloische Leukämien und maligne Lymphome.									
Anmerkungen	° Fremdleistung Bioscientia MVZ Ingelheim Analyt Kürzel: THYM Ansatztage: Mi., Fr.									
	Erhöht bei: • malignen Erkrankungen, z. B. Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome, akute und chronische Leukämien • Virus-Infektionen aus der Herpesgruppe wie EBV- bzw. CMV-Infektionen									
Thyreoglobulin°										
Probenmaterial	1 ml Serum									
Methode	Immunfluoreszenzassay									
Normalwerte	1.6 – 61.3 ng/ml bei Tumornachsorge: < 2 ng/ml									
Indikationen	Verlaufs- und Therapiekontrolle bei Schilddrüsentumoren (papillär/ follikulär)									
Anmerkungen	°Fremdleistung Analyt Kürzel: THYR Ansatztage: Mo., Mi., Fr.									
	Falsch negative Ergebnisse können durch Autoantikörper gegen Thyreoglobulin (Nachweis siehe TAK) entstehen									
Thyroxinbindendes Globulin° TBG										
Probenmaterial	1 ml Serum GEFROREN!									
Methode	CLIA (Chemolumineszens-Immunoassay)									
Normalwerte	<table><tr><th>Referenzbereich / Entscheidungsgrenze</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Schwangerschaft</td><td>27 - 66 µg/mL</td></tr><tr><td>bis 15 Jahre</td><td>20 - 30 µg/mL</td></tr><tr><td>ab 15 Jahre</td><td>13 - 39 µg/mL</td></tr></table>	Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert	Schwangerschaft	27 - 66 µg/mL	bis 15 Jahre	20 - 30 µg/mL	ab 15 Jahre	13 - 39 µg/mL	
Referenzbereich / Entscheidungsgrenze	Wert									
Schwangerschaft	27 - 66 µg/mL									
bis 15 Jahre	20 - 30 µg/mL									
ab 15 Jahre	13 - 39 µg/mL									
Indikationen	Schilddrüsendiagnostik ergänzende Untersuchung bei Bestimmung von T3 gesamt und T4 gesamt									
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: TBG Ansatztage: 1 x je Woche Testdauer: 24 Std.									
	Haltbarkeit: 2 Tage bei 2-8°C, 1 Monat bei -20°C									

Tiagabin	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	therapeutischer Bereich: 20 - 200 ng/ml
Tianeptin im Serum	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	30 - 80 µg/l toxisch > 160 µg/l Die biologische Halbwertszeit von Tianeptin beträgt 2,5h.
Tiaprid°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich: 1,0 - 2,0 mg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: TIAP2 Ansatztage: Mo., Mi., Fr. Testdauer: 24 Std. Blutentnahme im steady state 1 - 3 Std. nach Gabe. HWZ 2,9-3,6 Std.
Tilidin°	
Probenmaterial	2 ml Serum, kühl und lichtgeschützt
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich 50 - 120 µg/L komatös / fatal: > 1700 µg/L
Indikationen	Analgetikum, Therapiekontrolle
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: TIL Ansatztage: 2 x je Woche Testdauer: 24 Std.
Tilidin im Urin	
Probenmaterial	Urin
Normalwerte	< 50 ng/ml
Titan°	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 3,0 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Titin AK°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIA (Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	negativ
Indikationen	Thymuskarzinom (epitheliales Thymom) bei Myasthenia gravis
Anmerkungen	° Fremdleistung, Medizinisches Labor Nord Analyt Kürzel: TITI Ansatztage: nach Bedarf Titin ist ein Bestandteil der quergestreiften Muskulatur und ein hochspezifischer Marker für Thymusneoplasien bei Myasthenia-gravis-Patienten. Da etwa 10 - 15 % der Myasthenia-gravis-Patienten ein Thymuskarzinom (epitheliales Thymom) entwickeln, ist die Bestimmung der AK gegen Titin bei diesen Patienten differentialdiagnostisch sinnvoll.
Tobramycin°	
Probenmaterial	1 ml Serum BE vor turnusmäßiger Injektion
Normalwerte	Spitzenwert 6 – 10 ug/ml minimal 0.5 - 2.0 ug/ml toxisch ab 12 ug/ml
Indikationen	Antibiotikum, Überwachung der Minimalkonzentration besonders bei Nierenschäden
Anmerkungen	° Fremdleistung

Tollwut-Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA
Anmerkungen	° Fremdleistung, Labor Augsburg MVZ Analyt Kürzel: TOLL Ansatzstage: Mo., Do. Überprüfung des Impfschutzes nach durchgeführter Tollwutschutzimpfung Tollwutantikörper sind nicht zum Ausschluss einer Tollwutinfektion geeignet. Bei Exposition sofortige aktive bzw. aktiv/passive Immunprophylaxe in Abhängigkeit von der Art der Exposition durchführen (siehe auch aktuelle STIKO-Empfehlung) (Meldepflicht IfSG) Die Tollwut (Rabies, Lyssa) ist eine weltweit verbreitete Erkrankung von Tieren. Die Übertragung der Tollwutviren auf den Menschen erfolgt durch Kratz- und Bisswunden. Immunität anzunehmen ab 0,5 EU/ml
Topiramate	
Probenmaterial	1 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich: 2 - 10 µg/ml toxischer Bereich: ab 16 µg/ml
Indikationen	z.B. Topamax®, Antiepileptikum
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TOPI Ansatzstage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 19 - 23 Std.

Toxocara canis-Ak° IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	IgG-Ak < 8.5 U/ml
Anmerkungen	Hundespulwurm, betroffen sind vor allem Kinder, Übertragung erfolgt durch Aufnahme der Wurmeier direkt vom Tier oder indirekt durch Erde ° Fremdleistung
Toxocara canis° IgG/IgM-Blot	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	negativ
Indikationen	Hundespulwurm, betroffen sind vor allem Kinder, Übertragung erfolgt durch Aufnahme der Wurmeier direkt vom Tier oder indirekt durch Aufnahme aus kontaminierter Erde
Anmerkungen	Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest ° Fremdleistung
Toxocara IgG-Blot°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest ° Fremdleistung
Toxocara IgM-Blot°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest ° Fremdleistung
Toxoplasmose Aviditätsbestimmung	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Aviditätstest
Anmerkungen	Zur Eingrenzung des Infektionszeitpunktes insbesondere bei positiver Serologie in der Schwangerschaft

Toxoplasmose IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 IU/ml grenzwertig 10 – 20 IU/ml positiv > 20 IU/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TOXG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf Ausschluss einer latenten Infektion
Toxoplasmose IgG-Avidität	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Hinweis auf Infektionszeitpunkt, insbesondere bei Fragestellung Infektion in der Schwangerschaft
Toxoplasmose IgG im Liquor°	
Probenmaterial	Liquor
Methode	< 1:2
Anmerkungen	° Fremdleistung
Toxoplasmose IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 300 IU/ml grenzwertig 300 – 350 IU/ml positiv > 350 IU/ml
Indikationen	V.a. frische Infektion
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TOXM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Toxoplasmose Suchtest	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	Suchtest zum Ausschluss einer Infektion mit Toxoplasma gondii wenn positiv - Toxoplasmose IgM-Ak

TPHA	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	indir. Hämaggl.-Test (IH
Normalwerte	< 1:80 nicht reaktiv
Anmerkungen	nicht reaktiv Suchtest zum Ausschluss einer Infektion, 2-3 Wochen nach der Infektion reaktiv, bleibt meist auch nach adäquater Therapie lebenslang positiv.
TPO-Ak (Anti-Thyreoidale Peroxidase)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 20 IU/ml
Indikationen	Verdacht auf Autoimmunerkrankung der Schilddrüse Hypothyreose, Hashimoto-Thyreoiditis, atypische Autoimmunthyreoiditis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ATPO-R Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Im selben Quartal nicht zusammen mit dem Parameter TAK abrechenbar
TPS/TPA Tissue-Polypeptide-Specific-Ag°	
Probenmaterial	1 ml Serum gefroren
Methode	LIA
Normalwerte	< 80 U/l
Indikationen	Therapie und Verlaufskontrolle bei Lungen-Ca und Blasen-Ca unspezifischer Tumormarker, der bei Zell- Proliferation und Zellzerfall nachweisbar ist TPS sollte immer in Verbindung mit anderen Tumormarkern bestimmt werden auch erhöht bei Leberzirrhose, Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz.
Anmerkungen	° Fremdleistung
Tramadol°	
Probenmaterial	1 ml Serum 10 ml Urin° Fremdleistung
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	Therapeutischer Bereich 100 - 800 µg/l Tox. Bereich: >1000 µg/l Letal: >2000 µg/l
Indikationen	Drogenanalytik
Anmerkungen	° Fremdleistung

Tramadol EDTA-Blut	
Probenmaterial	EDTA-Blut
Normalwerte	< 50 pg/ml
Tränendrüsenangepithel Ak°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Sjögren-Syndrom
Anmerkungen	° Fremdleistung
Transferrin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	200 – 360 mg/dl
Indikationen	Leberparenchymschäden, akute und chronische Entzündungen, Nephrotisches Syndrom Eisenmangel
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TRA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Transferrin Heparin Plasma	
Probenmaterial	Heparin Plasma
Methode	Tina-Quant, CRM 470 (1)
Normalwerte	siehe Befund
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TRAH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Transferrin-Rezeptor, löslicher°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	0.83 – 1.76 mg/l
Indikationen	Anämiediagnostik
Anmerkungen	° Fremdleistung
Transferrinsättigung	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	16 – 45 %

Transglutaminase - IgA-Ak (tTG-IgA-AK)		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Methode	FEIA (Fluoreszenz-enzym-Immunoassay)	
Normalwerte	negativ < 7 U/ml grenzwertig 7 – 10 U/ml	
Indikationen	Gewebsrtransglutaminase Zöliakie-Suchtest	
Anmerkungen	jährliches Screening bei Hochrisikopatienten Abfall unter Diät (binnen ca. 3. Monate), bitte auch bei Ersttestung beachten! Zusätzlich ist die Bestimmung des Gesamt-IgA empfohlen (Ausschluß eines IgA-Ak-Mangels)	
	Analyt Kürzel: CELI_A Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Transglutaminase - IgG-Ak (tTG-IgG-AK)		
Probenmaterial	Serum	
Methode	FEIA (Fluoreszenz-enzym-Immunoassay)	
Normalwerte	negativ < 7	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: CELI_G Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
Tranlylcypromin°		
Probenmaterial	Serum	
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)	
Normalwerte	Therapeutischer Bereich min.	1 - 50 µg/L
	Toxischer Bereich	> 100 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: TRCY Ansatztage: Mo., Mi. Fr. Testdauer 24 Std.	
	Hinweis: Referenzwerte für Talspiegel 8-12 Std. nach Gabe. HWZ ca. 1-3 Std.	
Trazodon		
Probenmaterial	Serum	
Normalwerte	Therap. Ber.: 0.7-1.0 ug/ml Kritisch ab: 1.2 ug/ml	
Treponema pallidum IgM Blot		
Probenmaterial	1 ml Serum	
Methode	Westernblot (Immunoblot)	
Normalwerte	nicht reaktiv	
Indikationen	V.a. Frischinfektion	
Anmerkungen	Treponema pallidum ssp. pallidum IgM Blot (Lues, Syphilis)	
	Analyt Kürzel: TPHM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	

Trichinose, Trichinella spiralis°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA Immunoblot
Normalwerte	IgG-Ak negativ gG-Blot negativ IgM-Blot negativ
Indikationen	Nematoden-Infektion
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) Antikörper frühestens ab der 3. Erkrankungswoche nachweisbar Bestätigungstest für positive Ergebnisse im Suchtest ° Fremdleistung
Trichomonas vaginalis-PCR	
Probenmaterial	- Morgendlicher Erststrahlurin oder 1. Urinportion nach nach 4-stündiger Miktionskarenz - Urethralabstrich (ohne Gel) (zuvor angefeuchtet mit sterilem 0,9% NaCl/Aqua dest.) - Ejakulat (nativ) - Vaginal-/Zervikalabstrich (keine Gel-Röhrchen verwenden!) (Sekret aus dem hinteren Scheidengewölbe, der Vaginalwand und dem Zervikalkanal)
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion)
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage Seit 01.07.22 ist der molekularbiologische Nachweis von T. vaginalis GKV-Leistung. Der bisher durchgeführte mikroskopische Nachweis mittels Giemsa-Färbung wurde mangels Sensitivität eingestellt.
Triglyceride	
Probenmaterial	1 ml Serum, nüchtern 12-Std. Nahrungskarenz
Methode	Photometrie
Normalwerte	bis 170 mg/dl Zielwert < 150 mg/dl
Indikationen	Fettstoffwechselstörungen Alkoholabusus Diabetes mellitus
Anmerkungen	Analyt Kürzel: NFT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. s. auch Cholesterin, HDL- und LDL- Cholesterin

Trimipramin	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Therap.Ber.:150-300 ng/ml Kritisch ab:600 ng/ml
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TRIM Ansatztage: 2 - 3 x / Woche keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 23 - 24 Std. aaktiver Metabolit Nortrimipramin

Trizyklische Antidepressiva

Probenmaterial	je 2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.																																		
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)																																		
Indikationen	Amitriptylin, Clomipramin, Desipramin, Doxepin, Imipramin, Nortriptylin, Protriptylin, Trimipramin, Maprotilin weitere Medikamentenanalysen auf Anfrage.																																		
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AU084 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Analyt</th><th>biologische Halbwertszeit (HWZ) t_{1/2}</th><th>Kommentar</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amitriptylin (AMIT)</td><td>10 - 28 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Nortriptylin (NORT)</td><td>10 - 44 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Clomipramin (CLOM)</td><td>16 - 60 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Norclomipramin (NDCI)</td><td>37 - 43 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Doxepin (DOXE)</td><td>15 - 20 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Nordoxepin (NDOX)</td><td>15 - 20 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Desipramin (DESI)</td><td>15 - 18 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Imipramin (IMIP)</td><td>11 - 25 Std.</td><td></td></tr> <tr> <td>Trimipramin (TRIM)</td><td>23 - 24 Std.</td><td>aktiver Metabolit Nortimipramin</td></tr> <tr> <td>Maprotilin (MAPR)</td><td>20 - 58 Std.</td><td>aktiver Metabolit N-Desmethylnmaprotilin</td></tr> </tbody> </table>	Analyt	biologische Halbwertszeit (HWZ) t _{1/2}	Kommentar	Amitriptylin (AMIT)	10 - 28 Std.		Nortriptylin (NORT)	10 - 44 Std.		Clomipramin (CLOM)	16 - 60 Std.		Norclomipramin (NDCI)	37 - 43 Std.		Doxepin (DOXE)	15 - 20 Std.		Nordoxepin (NDOX)	15 - 20 Std.		Desipramin (DESI)	15 - 18 Std.		Imipramin (IMIP)	11 - 25 Std.		Trimipramin (TRIM)	23 - 24 Std.	aktiver Metabolit Nortimipramin	Maprotilin (MAPR)	20 - 58 Std.	aktiver Metabolit N-Desmethylnmaprotilin	
Analyt	biologische Halbwertszeit (HWZ) t _{1/2}	Kommentar																																	
Amitriptylin (AMIT)	10 - 28 Std.																																		
Nortriptylin (NORT)	10 - 44 Std.																																		
Clomipramin (CLOM)	16 - 60 Std.																																		
Norclomipramin (NDCI)	37 - 43 Std.																																		
Doxepin (DOXE)	15 - 20 Std.																																		
Nordoxepin (NDOX)	15 - 20 Std.																																		
Desipramin (DESI)	15 - 18 Std.																																		
Imipramin (IMIP)	11 - 25 Std.																																		
Trimipramin (TRIM)	23 - 24 Std.	aktiver Metabolit Nortimipramin																																	
Maprotilin (MAPR)	20 - 58 Std.	aktiver Metabolit N-Desmethylnmaprotilin																																	

Troponin T hs (high sensitive)	
Probenmaterial	1 ml Serum Stabilität 2-8 °C: 24h
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 0.014 ng/ml
Indikationen	prognostischer Marker bei instabiler Angina pectoris, Diagnostik ischämischer Herzerkrankungen, V.a. akuten Myokardinfarkt (Frühphase, Reinfarkt), Therapiebeurteilung bei Lysetherapie des Myokardinfarktes
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TROT Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Stabilität 2-8 °C: 24h
Trypsin°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	Normwert 160 – 600 µg/l
Indikationen	akute, rezidivierende und chronische Pankreatitis, Pankreaskarzinom, zystische Pankreasfibrose zusätzlich Lipase und Amylase sinnvoll; bei V.a. Pankreas-Ca CA 19-9, CEA, CA 72-4
Anmerkungen	° Fremdleistung
Tryptase	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)
Normalwerte	< 11.4 µg/l Anaphylaxierisiko 10 – 20 µg/l systemische Mastose > 20 µg/l
Indikationen	Tryptase-Anstieg wenige Stunden nach anaphylaktischer Reaktion - Risikomarker für anaphylaktische Reaktion Vergleich mit Basiswert
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TRYP Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Das Untersuchungsmaterial sollte 15 Min. bis 3 Std. nach der vermuteten Mastzellaktivierung gewonnen werden
Tryptophan°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	30 - 95 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

TSH basal	
Probenmaterial	Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	0 - 59 Tage: 0,8 - 10,0 uIE/ml 2 - 11 Monate: 0,4 - 7,0 uIE/ml 1 - 5 Jahre: 0,4 - 7,0 uIE/ml 6 - 20 Jahre: 0,35 - 5,0 uIE/ml ab 21 Jahren: 0,27 - 4,2 uIE/ml
TSH-Rezeptor-Ak TRAK	
Probenmaterial	1 ml Serum
Normalwerte	< 1,8 IU/L
Indikationen	Hyperthyreose Marker für Morbus Basedow
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TRAK Ansatztage: täglich Mo. - Fr. ein Bestehenbleiben bei Therapie deutet auf Relaps. Bei HLA-DR-positiven Patienten Hinweis auf geringe Ansprechbarkeit antithyreoidaler Therapie, Indikation zur ¹³¹ Jod-Therapie oder Operation
TSH Stimulationstest, TRH-Test	
Probenmaterial	Je 1 ml 1. und 2. Serum
Normalwerte	2 – 30 µIE/ml bei Hyperthyreose Anstieg < 2 µIE/ml
Indikationen	TRH z.B. Antepan® Überprüfung der TSH-Sekretion bei Schilddrüsenfunktionsstörung
Anmerkungen	bitte deutlich beschriften! 1. Abnahme nüchtern, dann i.v. 200 µg TRH, Kinder 7 µg/kg Körpergewicht 2. Abnahme nach 30 Min.
TSH Thyreoidea-stimulierendes Hormon	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	0,27 – 4,2 µU/ml Hyperthyreose < 0,1 µU/ml Hypothyreose > 5,0 µU/ml Zielbereich unter Hypothyreosetherapie: 0,5 – 2,0 µU/ml Sgl. bis 3. Lebensstag < 20 µU/ml Kinder altersabhängig
Indikationen	V.a. Schilddrüsendysfunktion Ausschluss einer (latenten) Hyper- oder Hypothyreose
Anmerkungen	Analyt Kürzel: TSH Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Tuberkulose°	
Methode	PCR (Polymerase-Chain-Reaktion), Mikroskopie, Kultur, ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) °Fremdleistung Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: Quantiferon: 3 - 4 Tage TB-Mikroskopie/PCR: 2 Tage, TB-Kultur: Zwischenbefund bei Keimnachweis, Endergebnis nach 8 Wochen
Tubulus-Basalmembran	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	Interstitielle Nephritis Glomerulonephritis
Typhus	
Probenmaterial	Stuhlkulturen
Anmerkungen	Bei Patienten mit V.a. Typhus sind Stuhlkulturen erst ab der 2. Woche sinnvoll. In der akuten Phase erfolgt bei Typhus die Diagnose über Blutkulturen (siehe Blutkulturen)
Typhus abdominalis	
Anmerkungen	(Meldepflicht IfSG) siehe Mikrobiologie
Typ I Diabetes	
Probenmaterial	1 ml Serum
Anmerkungen	Analysen: GAD-AK (GADII-AK), Tyrosin-Phosphatase-AK (IA2), Inselzellen-AK, Insulin IgG-AK (IAA)
Tyrosin	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	35 - 84 µmol/l
Tyrosin im Serum	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	0 - 16 Jahre: 0,2 - 2,8 mg/dl ab 17 Jahre: 0,7 - 1,8 mg/dl
Tyrosinphosphatase° IA2-AK	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RIA (Radioimmunoassay)
Normalwerte	< 1.0 U/ml
Indikationen	Antikörper gegen Inselzell-spezifische Tyrosinphosphatase; V.a. Diabetes mellitus Typ I
Anmerkungen	° Fremdleistung

Urin-Sediment	
Probenmaterial	10 ml frischer Spontan-Urin
Methode	Mikroskopie
Indikationen	Erkrankungen der Niere und der ableitenden Harnwege. Beurteilt werden Leukozyten, Erythrozyten, Epithelien, Zylinder, Kristalle, Bakterien Pilze, dysmorphe Erythrozyten (Akanthozyten) – nur nach Anforderung
Urinstatus - Harnstatus, Spez. Gewicht, pH-Wert, Leukozyten, Nitrit, Harn-Eiweiß, Harn-Zucker, Aceton, Urobilinogen, Bilirubin, Blut	
Probenmaterial	frischer Urin
Methode	qualitativer Nachweis
Anmerkungen	Teststreifen/Substrattest

Mittelstrahlurin

Mittelstrahlurin gilt als Methode der Wahl zur Diagnostik einer Harnwegsinfektion. Zwischen Gewinnung der Urinprobe und der letzten Miktion sollten mind. 3 Std. liegen (am besten erster Morgenurin). Eine sachgerechte Entnahmetechnik ist erforderlich, um Verunreinigungen durch Bakterien aus Urethra/Präputium/Vagina/Vulva/Perineum sowie von den Händen zu vermeiden. Vor der Uringewinnung hat eine gründliche Reinigung der Urethralmündung/-umgebung zu erfolgen:

Männer: Hände und Vorhaut mit Seife waschen, Vorhaut zurückziehen, Glans mit Wasser reinigen und einem Tupfer abtrocknen.

Frauen: Äußeres Genitale gründlich mit Seife waschen, mit Wasser abspülen, Urethralmündung mit feuchten, sterilen Tupfern reinigen und abtrocknen.

Die ersten ml der Urinportion sind zu verwerfen und anschließend ca. 10 ml in einem sterilen Gefäß aufzufangen. Eine Verunreinigung durch Becherrand, Hand oder Kleidung ist zu vermeiden.

Uriline

Mittelstrahlurin gewinnen (siehe Mittelstrahlurin). Urin in sterilem Gefäß (z.B. Urinbecher) auffangen.

Nährbodenträger kurz in Urin eintauchen, sodass die Agarschichten vollständig mit Urin benetzt werden. Nach Herausziehen überschüssigen Urin abtropfen lassen, Nährbodenträger in Urilineröhrchen zurückschieben und Deckel fest zuschrauben.

Wird der Uriline-Träger nicht eingetaucht, sondern lediglich in den Urinstrahl gehalten, ergeben sich falsche Keimzahlen.

Es muss strikt darauf geachtet werden, dass kein Resturin im Transportbehältnis bleibt. Dieser könnte die Agaroberfläche mehrfach benetzen und damit eine falsch hohe Keimzahl vortäuschen.

Der Uriline kann bei 36°C vorbebrütet werden. Die Inkubationszeit sollte 24 Std. nicht überschreiten (ggf. danach bis zum Transport bei 2-8°C lagern).

Verwendung von Urilines nur bei Verzögerung bis zum Transport um mehr als 24 Std.

Nachteile Uriline:

- Keine keimspezifische Keimzahlbestimmung
- Zeitverlust in der Bearbeitung, da Subkulturen notwendig werden
- Keine Bestimmung der Leukozyturie möglich, wie nach aktuellen Leitlinien gefordert

Einmalkatheterurin

Sollte nur angewendet werden, wenn eine einwandfreie Gewinnung von Mittelstrahlurin nicht möglich ist, da jede Katheterisierung eine zusätzliche Infektionsgefahr birgt. Eine Blasenpunktion kann alternativ in Betracht gezogen werden, siehe Blasenpunktionsurin. Zwischen Gewinnung der Urinprobe und der letzten Miktion sollten mind. 3 Std. liegen (am besten erster Morgenurin). Wie bei Mittelstrahlurin gründliche Reinigung der Urethralmündung/-umgebung. Die ersten ml der Urinportion sind zu verwerfen und anschließend ca. 10 ml in einem sterilen Gefäß aufzufangen.

Dauerkatheterurin

Die Uringewinnung erfolgt nach sorgfältiger Desinfektion der bereits für die Punktion vorgesehenen Einstichstelle am Ab-leitungssystem. Die Urinprobe darf auf keinen Fall aus dem Urin-Sammelbehälter entnommen werden.

Blasenpunktionsurin

Voraussetzung ist eine gut gefüllte Harnblase (im Zweifelsfall sonographische Kontrolle). Nach sorgfältiger Hautdesinfektion wird die Harnblase 1-2 Querfinger oberhalb der Symphyse punktiert. Bei dieser Art der Uringewinnung ist jede Keimzahl diagnostisch signifikant, da eine Kontamination der Probe nahezu ausgeschlossen ist.

Normalwerte

Interpretation des Urinbefundes

Die Bewertung des Urinbefundes erfolgt individuell in der Zusammenschau des Nachweises einer Leukozyturie, der Anzucht typisch oder potentiell uropathogener Keime sowie der in der Probe vorhandenen Keimzahl.

Blasenpunktionsurin Jede Keimzahl gilt als signifikanter Hinweis auf eine Harnwegsinfektion.

Bewertung des Hemmstoff-Tests

Urin und Uriline	
	Bei Urin wird zum Nachweis antibakterieller Substanzen ein Hemmstofftest durchgeführt. Ein positiver Testausfall bedeutet, dass antibakterielle Substanzen im Urin vorhanden sind. Hierdurch sind falschnegative kulturelle Befunde bzw. Befunde mit falsch niedriger Keimzahl möglich. Eine Kontrolleinsendung wird empfohlen. Sterile Leukozyturie Bei wiederholter Leukozyturie und negativer Urinkultur sollten auch folgende Erreger als Ursache ausgeschlossen werden: Mykobakterien (Urogenital-TBC), Chlamydien, Mykoplasmen/ Ureaplasmen, Gonokokken, sehr selten Anaerobier (Blasenpunktionsurin erforderlich) und nach Auslandsaufenthalt ggf. auch Schistosomen (Blasenbilharziose siehe 2.8). Immunsupprimierte weisen selten auch Harnwegsinfektionen durch Viren auf, z.B. hämorrhagische Zystitis durch Adenoviren oder BK-Viren (Polyomaviren): PCR aus Urin oder Blasenwandbiopsie.
Indikationen	Harnwegsinfektionen (z.B. Zystitis, Pyelonephritis)
Anmerkungen	Entnahme / Lagerung Probengewinnung möglichst vor Beginn einer antibakteriellen Therapie bzw. mind. 3 Tage nach letzter Antibiose. Lagerung von Urin bei 2-8°C bis max. 24 Std.. Bei längerer Lagerung sollte ein Eintauchobjektträger (Uriline) verwendet werden, um die Keimzahl zum Zeitpunkt der Uringewinnung zu fixieren, siehe Uriline.
Urobilinogen	
Probenmaterial	Spontanurin
Methode	Combur-Test
Anmerkungen	Analyt Kürzel: UBGC Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Valin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma GEFROREN!
Normalwerte	Kinder altersabhängig Erwachsene: 144 - 269 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung

Valproinsäure											
Probenmaterial	1 ml Serum BE morgens vor nächster Dosis										
Methode	FEIA (Fluoreszenz-Enzym-Immunoassay)										
Normalwerte	therap. Ber. 50 – 100 µg/ml										
Indikationen	Antiepileptikum										
Anmerkungen	Eliminationshalbwertszeit ca. 8 – 15 h Analyt Kürzel: NAV Ansatztage: täglich Mo. - Fr.										
Vancomycin°											
Probenmaterial	1 ml Serum (vor nächster Dosis) 1 ml Serum (1 h nach Infusionsende)										
Methode	enzymatisch										
Normalwerte	therapeut. Bereich Talspiegel: 10-15 ug/ml therapeut. Bereich Talspiegel MRSA: 15-20 ug/ml therapeut. Bereich Spitzenspiegel: 20-40 ug/ml toxisch ab 80 ug/ml										
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VANK Ansatztage: nach Bedarf										
Vanillinmandelsäure VMS im Urin°											
Probenmaterial	1 mL Urin aus 24-Std.-Menge, gesammelt über 5-10 mL Eisessig. Spontanurin bei Kindern < 4 Jahre.										
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)										
Normalwerte	<table border="1"> <tr> <td>Erwachsene (> 16 Jahre)</td><td>< 7,0 mg/d</td></tr> <tr> <td>Kinder:</td><td></td></tr> <tr> <td>0 - 1 Jahre</td><td>< 17,1 mg/g Krea.</td></tr> <tr> <td>1 - 4 Jahre</td><td>< 11,0 mg/g Krea.</td></tr> <tr> <td>4 - 16 Jahre</td><td>< 4,80 mg/d</td></tr> </table>	Erwachsene (> 16 Jahre)	< 7,0 mg/d	Kinder:		0 - 1 Jahre	< 17,1 mg/g Krea.	1 - 4 Jahre	< 11,0 mg/g Krea.	4 - 16 Jahre	< 4,80 mg/d
Erwachsene (> 16 Jahre)	< 7,0 mg/d										
Kinder:											
0 - 1 Jahre	< 17,1 mg/g Krea.										
1 - 4 Jahre	< 11,0 mg/g Krea.										
4 - 16 Jahre	< 4,80 mg/d										
Indikationen	Phäochromozytom, Neuroblastom Medikamenten-Effekte beachten										
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: VMSM/VMSLM Ansatztage: nach Bedarf										
Varizella-Zoster-DNA PCR°											
Probenmaterial	Liquor EDTA-Blut als separates Röhrchen Abstriche, Bläschenflüssigkeit steril										
Indikationen	virale Retinitis, neurologische Komplikationen bei Windpocken und Herpes zoster										
Anmerkungen	° Fremdleistung										

Varizella-Zoster-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 35 U/ml grenzwertig 35 – 50 U/ml
Indikationen	bei Reaktivierung (Herpes Zoster)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VARA Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Varizella-Zoster-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	intrathekal gebildete VZR-spez.
Normalwerte	normal 0.7 - 1.3 positiv >1.5 positiv
Indikationen	Kontakt zu VZV, Ausschluss einer Reaktivierung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VAEG Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf
Varizella-Zoster-IgG-Ak i. Liquor°	
Probenmaterial	1 ml Liquor und taggleiches Serum für Indexbestimmung erforderlich
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0.7 – 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Indikationen	ZNS-Beteiligung erregerspezifischer Ak im Liquor
Anmerkungen	° Fremdleistung
Varizella-Zoster-IgM-Ak	
Probenmaterial	1 ml Liquor und taggleiches Serum für Indexbestimmung erforderlich
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	negativ < 10 U/ml grenzwertig 10 – 15 U/ml positiv > 15 U/ml
Indikationen	V.a. akute Windpockenerkrankung
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VAEM Ansatztage: min. 1 x / Woche, nach Bedarf

Varizella-Zoster-IgM-Ak i. Liquor°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	EIA (Enzymimmunoassay)
Normalwerte	negativ 0.7 – 1.5 AI positiv > 1.5 AI
Indikationen	ZNS-Beteiligung erregerspezifischer Ak im Liquor
Anmerkungen	° Fremdleistung
Vasoakt. intest. Polypeptid	
Probenmaterial	EDTA Plasma, gefroren
Normalwerte	< 30 pg/ml Angabe bezieht sich auf mit Trasylol stabilisiertes EDTA-Plasma im Glasröhrchen. Ohne Trasylol-Zusatz findet man meist deutlich niedrigere Werte.
VDRL - CMF	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Indirekte Agglutination (RPR-Test)
Normalwerte	nicht reaktiv
Anmerkungen	Veneral Disease Research Laboratory Test Cardiolipinmikroflockungstest ca. 4 -6 Wochen nach Infektion Verlaufskontrolle bei Lues-Therapie Bewertung der Erkrankungsaktivität bzw. Therapiebedürftigkeit

Venlafaxin	
Probenmaterial	2 ml Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Summe aus Venlafaxin und Desmethylvenlafaxin: therapeutischer Bereich: 100-400 ng/ml toxischer Bereich: ab 800 ng/ml
Indikationen	Trevilor® Antidepressivum Medikamentenspiegel
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VENS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Wir weisen darauf hin, dass es bei der Verwendung von Blutentnehmeröhrchen mit Trenngel aufgrund einer möglichen Adsorption von Arzneimitteln an die Gelbarriere zu einer Unterschätzung der in vivo Konzentration kommen kann. Ikterische, lipämische und hämolytische Plasma- und Serumproben müssen für die Analyse von Antidepressiva mit LC-MS/MS ausgeschlossen werden. Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 4 - 14 Std. o-Desthylvenlafaxin ist der aktive Metabolit von Venlafaxin

Vigabatrin°	
Probenmaterial	2 ml Serum, Blutentnahme 2-4 h nach Medikamenteneinnahme
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	therap. Bereich 2 – 10 µg/ml toxischer Bereich > 20 µg/ml
Indikationen	Antiepileptikum, Medikamentenspiegel
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: VIGA Ansatztage: täglich Di., Mi., Do., Fr., Sa. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu vermeiden; Blutentnahme unmittelbar vor nächster Gabe Therapeutisches Drug Monitoring (Compliancekontrolle, unerwünschte Arzneimittelwirkungen, ausbleibende Wirkung).
Virale Arthritiden	
Anmerkungen	CMV, EBV, HBV, HCV, Parvo B19, Röteln
Virologische Untersuchung	
Probenmaterial	Stuhl
Indikationen	Adenoviren Noroviren Rotaviren
Anmerkungen	Angefordert werden können folgende viralen Erreger: Adeno-/Noro-/Rota-/Astro-/Sapoviren. Die Stuhl Diagnostik sollte innerhalb von 3 Tagen nach Probenentnahme erfolgen. Probe bis zum Transport im Kühlschrank lagern.

Vitamin A Retinol		
Probenmaterial	2 ml Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Messbereich	0,0314 - 3,09 mg/l
	Kinder (1 - 12 Jahre)	0,19 - 0,49 mg/l
	Jugendliche (13 - 18 Jahre)	0,26 - 0,75 mg/l
	Erwachsene	0,29 - 0,80 mg/l
Indikationen	Vit. A-Mangel, Malabsorption Lebererkrankungen, chron. Pankreatitis Überwachung einer Vit. A-Zufuhr	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITA Ansatztage: 1 - 2 x / Woche	
	Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
	Für alle Vitaminanalysen bitten wir Sie, die Versandboxen grundsätzlich mit einem Kühlelement auszustatten. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten.	
	Aufgrund der eingeschränkten Stabilität sind Nachforderungen von Vitaminanalysen in der Regel nicht mehr sinnvoll und sollten möglichst vermieden werden.	
Vitamin B12 Cobalamin		
Probenmaterial	1 ml Serum Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 48h	
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)	
Normalwerte	200 – 1000 pg/ml	
Indikationen	V.a. perniziöse Anämie, atrophische Gastritis, Malabsorption, Chronische Leber- und Nierenerkrankungen, Alkoholabusus bei Werten < 400 pg/ml HTC Holotranscobalamin empfohlen	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: B12 Ansatztage: täglich Mo. - Fr.	
	Versand Lichtschutz gekühlt Stabilität 2-8 °C: 48h	

Vitamin B1 Thiaminpyrophosphat

Probenmaterial	3 ml EDTA-Blut gefroren Für diese Analyse ist eine separate Probenentnahme in ein eigenes Röhrchen erforderlich. Die Probe ist konsequent lichtgeschützt zu behandeln.	
Methode	HPLC - FD	
Normalwerte	Messbereich	3,37 – 444 ng/l
	Referenzbereich	28 – 85 ng/ml
Indikationen	Vit. B1-Mangel, Malabsorption hämatologische Erkrankungen	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITAB1 Ansatztage: 2 - 3 x / Woche Stabilität Raumtemperatur: 5 STD, 2 -8 °C: 1 Tag Vitamin B1 (Thiamin) unterliegt aufgrund seiner eingeschränkten Stabilität gesonderten präanalytischen Anforderungen. Für diese Analyse ist eine separate Probenentnahme in ein eigenes Röhrchen erforderlich. Die Probe ist konsequent lichtgeschützt zu behandeln und gefroren zu versenden. Aus nicht gefrorenen EDTA-Blut wird nicht mehr gemessen. Für alle Vitaminanalysen bitten wir Sie, die Versandboxen grundsätzlich mit einem Kühlelement auszustatten. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten. Aufgrund der eingeschränkten Stabilität sind Nachforderungen von Vitaminanalysen in der Regel nicht mehr sinnvoll und sollten möglichst vermieden werden.	

Vitamin B2 FAD (Flavinadenindinukleotid)		
Probenmaterial	3 ml EDTA Vollblut gefroren mit Lichtschutz Stabilität 2 - 8 °C: 7 Tage	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Analyt Kürzel:	VITAB2
	Messbereich	15,6 - 524 ng/ml
	Referenzbereich	204,2 - 306,4 ng/ml
Indikationen	Malabsorption, Lebererkrankungen, Alkoholabusus	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITAB2 Ansatztage: 1 - 2 x / Woche	
	Stabilität: Raumtemperatur: 24 Std. 2 - 8 °C: 7 Tage	
	Für alle Vitaminanalysen bitten wir Sie, die Versandboxen grundsätzlich mit einem Kühlelement auszustatten. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten.	
	Aufgrund der eingeschränkten Stabilität sind Nachforderungen von Vitaminanalysen in der Regel nicht mehr sinnvoll und sollten möglichst vermieden werden.	
Vitamin B3 (Nicotinamid)°		
Probenmaterial	Serum GEFROREN!	
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)	
Normalwerte	8,0 - 100,0 µg/l	
Indikationen	Verdacht auf Niacin (Vitamin B3)-Mangel	
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: NICO Ansatztage: bei Bedarf	
Vitamin B5 (Pantothensäure)°		
Probenmaterial	Serum mit Lichtschutz Stabilität 2 - 8 °C: 48h	
Normalwerte	Einheit: µg/l siehe Befund	
	Bestimmt wird der Anteil freier Pantothensäure.	
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: PANS Stabilität 2 - 8 °C: 48h	

Vitamin B6 Pyridoxal-5'-phosphat

Probenmaterial	3 ml EDTA-Plasma gefroren mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Messbereich	0,740 - 89,4 ng/l
	Referenzbereich	5,2 - 34 ng/l
Indikationen	Malabsorption, Diabetes mellitus, Schwangerschaft	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITB6G Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Stabilität: Raumtemperatur: 24 Std.; 2 - 8 °C: 7 Tage Für alle Vitaminanalysen bitten wir Sie, die Versandboxen grundsätzlich mit einem Kühlelement auszustatten. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten. Aufgrund der eingeschränkten Stabilität sind Nachforderungen von Vitaminanalysen in der Regel nicht mehr sinnvoll und sollten möglichst vermieden werden.	

Vitamin C Ascorbinsäure

Probenmaterial	1 ml Serum mit Lichtschutz GEFROREN! Stabilität -20 °C: 48 Std.	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	4 – 15 mg/l Mangel: < 2 mg/l	
Indikationen	Malabsorption, Mangelernährung, Alkoholabusus, Schwangerschaft	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITC Ansatztage: 1 - 2 x / Woche Stabilität -20 °C: 48 Std. nach Gerinnung sofort abseren, Versand gefroren. Die Bestimmung erfordert ein separates Serum (gefroren) nur für Vitamin C!	

Vitamin E Tocopherol		
Probenmaterial	1 ml Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	Messbereich	0,491 - 50,1 mg/l
	Kinder (1 - 12 Jahre)	3,0 - 9,0 mg/l
	Jugendliche (13 - 19 Jahre)	6,0 - 14,2 mg/l
	Erwachsene	5,2 - 18,1 mg/l
Indikationen	α-Tocopherol, Malabsorption	
Anmerkungen	Analyt Kürzel: VITE Ansatztage: 1 - 2 x / Woche	
	Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
	Für alle Vitaminanalysen bitten wir Sie, die Versandboxen grundsätzlich mit einem Kühlelement auszustatten. Die Transportboxen unserer Kurierfahrer werden zusätzlich gekühlt, um einen sicheren Probentransport zu gewährleisten.	
	Aufgrund der eingeschränkten Stabilität sind Nachforderungen von Vitaminanalysen in der Regel nicht mehr sinnvoll und sollten möglichst vermieden werden.	
Vitamin K1°		
Probenmaterial	1 ml Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: nicht stabil Stabilität -20 °C: Aufbewahrung und Transport	
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)	
Normalwerte	110 – 1150 ng/l	
Indikationen	Vit. K-Mangel: zystische Fibrose, Zöliakie, Malabsorption	
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: VITK	
	mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: nicht stabil Stabilität -20 °C: Aufbewahrung und Transport	
Vitamin K2 (MK-4)°		
Probenmaterial	Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)	
Normalwerte	0,1 - 0,86 µg/l	
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: VITK24	
	Stabilität 2-8 °C: 7 Tage	

Vitamin K2 (MK-7)°	
Probenmaterial	Serum mit Lichtschutz Stabilität 2-8 °C: 7 Tage
Methode	LC/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	0,1 -0,82 µg/l
Anmerkungen	° Fremdleistung Analyt Kürzel: VITK27 Stabilität 2-8 °C: 7 Tage

von-Willebrand-Diagnostik°	
Probenmaterial	2 ml Citratplasma GEFROREN!
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	Das von Willebrand-Syndrom (vWS) ist die häufigste Ursache einer angeborenen Blutungsneigung. Das von Willebrand-Syndrom kann auch medikamenteninduziert (häufig bei Valproat) oder erworben sein, z. B. durch Autoantikörper und bei lymphoproliferativen Erkrankungen. Klassifikation des Hereditären vW-Syndroms: Typ 1: Quantitativer partieller Mangel an vWF Häufigkeit ca. 70 - 80 %, Vererbung autosomal dominant Typ 2: Qualitativer Defekt / Mangel an vWF Häufigkeit ca. 15 - 20%, Vererbung autosomal dominant oder rezessiv. Der Typ 2 kann in 4 verschiedene Subtypen differenziert werden, die in der Regel durch die Multimerenanalyse differenziert werden können. Typ 3: Quantitativer (fast) kompletter Mangel an vWF Völliges Fehlen des vWF (allenfalls sind Spuren von vWF:Ag nachweisbar), hierdurch verkürzte Halbwertszeit des Faktor VIII. Die Typen 1 bis 3 können durch die u.g. Quotienten-Bildungen differenziert werden: Ein Quotient aus FVIII/vWF:Ag unter 0,6 weist auf einen Typ 2N hin. Ein Quotient aus vWF:Ac/vWF:Ag unter 0,6 weist auf einen Typ 2 hin.

von-Willebrand-Diagnostik°

	Bei rein quantitativen Verminderungen, also Typ 1 und Typ 3, sind die Konzentrationen von vWF:Ag, Faktor VIII und vWF:Ac in gleichem Maße vermindert, der Quotient ist also in der Regel normal.				
Indikationen	Abklärung unklarer Blutungsneigungen: typisch sind Neigung zu Nasenbluten (Epistaxis) und Schleimhaut-Blutungen, z. B. Blutungen nach Zahnextraktionen oder starke Menorrhagien. Wichtig sind Hinweise in der Familien-Anamnese. Übliche Globaltests wie Quick-Wert, PTT oder TZ sind häufig normal.				
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: VWF / RIST / RVWF Ansatztage: täglich, Mo. - Fr. <table><tr><td>Beinhaltet folgende Untersuchungen:</td><td>VWF: von Willebrand-Faktor-Antigen (vWF:Ag) CP (Citratplasma gefroren (CP)) RIST: vWF:Ac (von Willebrand-Faktor Aktiv.) (Citratplasma gefroren (CP)) RVWF: vWF: Ac / vWF: Ag Quotient (Citratplasma gefroren (CP))</td></tr><tr><td>Präanalytik/ Hinweise:</td><td> Citrat-Blut abnehmen, nach Entnahme zentrifugieren und Citrat-Plasma in neues Röhrchen überführen, Röhrchen entsprechend beschriften, einfrieren und gefroren versenden. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. Bei zusätzlicher Anforderung von Gerinnungsfaktoren (Faktor II bis XIII) wird zusätzlich mindestens ein weiteres Röhrchen gefrorenes Citratplasma benötigt. </td></tr></table>	Beinhaltet folgende Untersuchungen:	VWF: von Willebrand-Faktor-Antigen (vWF:Ag) CP (Citratplasma gefroren (CP)) RIST: vWF:Ac (von Willebrand-Faktor Aktiv.) (Citratplasma gefroren (CP)) RVWF: vWF: Ac / vWF: Ag Quotient (Citratplasma gefroren (CP))	Präanalytik/ Hinweise:	Citrat-Blut abnehmen, nach Entnahme zentrifugieren und Citrat-Plasma in neues Röhrchen überführen, Röhrchen entsprechend beschriften, einfrieren und gefroren versenden. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. Bei zusätzlicher Anforderung von Gerinnungsfaktoren (Faktor II bis XIII) wird zusätzlich mindestens ein weiteres Röhrchen gefrorenes Citratplasma benötigt.
Beinhaltet folgende Untersuchungen:	VWF: von Willebrand-Faktor-Antigen (vWF:Ag) CP (Citratplasma gefroren (CP)) RIST: vWF:Ac (von Willebrand-Faktor Aktiv.) (Citratplasma gefroren (CP)) RVWF: vWF: Ac / vWF: Ag Quotient (Citratplasma gefroren (CP))				
Präanalytik/ Hinweise:	Citrat-Blut abnehmen, nach Entnahme zentrifugieren und Citrat-Plasma in neues Röhrchen überführen, Röhrchen entsprechend beschriften, einfrieren und gefroren versenden. Kein Blut aus liegenden Kathetern abnehmen. Bei zusätzlicher Anforderung von Gerinnungsfaktoren (Faktor II bis XIII) wird zusätzlich mindestens ein weiteres Röhrchen gefrorenes Citratplasma benötigt.				

Wegenersche Granulomatose

Probenmaterial	1 ml Serum
Anmerkungen	siehe ANCA

Wurmerkrankungen

Probenmaterial	1 g Stuhl
Anmerkungen	siehe Mikrobiologie

Würmer, Wurmeier und Parasiten	
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Anmerkungen	Wegen der oft intermittierenden Ausscheidung von Parasiten/ Wurmeiern wird zur Erhöhung der diagnostischen Sensitivität die Einsendung von insgesamt 3 Stuhlproben empfohlen, wobei der Abstand zwischen den Probenentnahmen 1-3 Tage betragen sollte. Aufgrund der Ungleichverteilung der Parasiten, sollte die Entnahme an jeweils 3 verschiedenen Stellen des Stuhls erfolgen, bevorzugt weiche/flüssige Stuhlanteile bzw. blutig-schleimige Auflagerungen. Bei V.a. Bandwurmgliedern (Proglottiden) im Stuhl, sollten diese unter Beachtung der Infektionsgefahr (Tragen von Handschuhen) in 0,9% NaCl-Lsg. eingesandt werden. Bei V.a. Oxyuren bitte keinen Stuhl, sondern ein Analabklatschpräparat (durchsichtiger Tesafilm auf Objektträger) einsenden. Bei Anforderung einer Untersuchung auf Lamblien und/ oder Amöben im Stuhl, wird vom Labor ein Antigennachweis mittels ELISA durchgeführt.
Xylose Belastung°	
Probenmaterial	1 ml vom 5 h-Urin
Normalwerte	Urinausscheidung > 4 g
Indikationen	Verdacht auf Malabsorptions-Syndrom
Anmerkungen	D-Xylose oral (Angabe der Xylosedosis und 5 h-Harn-Menge) Dosis: Erwachsene 25 g D-Xylose oral Kinder 5 g D-Xylose oral ° Fremdleistung
Xylose Belastung als Serumtest	
Probenmaterial	1 ml Serum, Abnahme 2 h nach Testbeginn
Normalwerte	> 30 mg/dl
Anmerkungen	D-Xylose oral Dosis: Erwachsene 25 g D-Xylose oral Kinder 5 g D-Xylose oral
Yersinia-Blot-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Bestätigungstest V.a. akute Infektion; reaktive Arthritis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: YEBA Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Yersinia-Blot-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Immunoblot
Indikationen	Z.n. Infektion; Bestätigungstest V.a. akute Infektion; reaktive Arthritis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: YEBG Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Yersinia-IgA-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	<10 U/ml negativ 10-15 U/ml grenzwertig >15 U/ml positiv
Indikationen	V.a. akute Infektion; Yersinien-bedingte Komplikationen (z.B. reaktive Arthritis)
Anmerkungen	Test wird nicht mehr durchgeführt (ab 13.02.2024)
Yersinia-IgG-Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunosorbent-Assay)
Normalwerte	<10 U/ml negativ 10-15 U/ml grenzwertig >15 U/ml positiv
Indikationen	Z.n. Infektion; Yersinien-bedingte Komplikationen (z.B. reaktive Arthritis)
Anmerkungen	Test wird nicht mehr durchgeführt (ab 13.02.2024)
Yersinia-IgM°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IgM-Antikörpernachweis
Normalwerte	siehe Befund.
Anmerkungen	° Fremdleistung
Yersinia spp.	
Probenmaterial	1 g Stuhl
Methode	Kultureller Nachweis
Indikationen	akute Enteritis
Anmerkungen	Mikrobiologie Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Bearbeitungsdauer: 2 - 3 Tage

Yo-Antikörper	
Probenmaterial	Serum
Methode	IFT
Normalwerte	< 1 : 1000
Yo-Antikörper im Liquor	
Probenmaterial	Liquor
Normalwerte	< 1 : 1000
Zelldifferenzierung	
Probenmaterial	Punktat/Dialysat
Methode	Mikroskopie
Normalwerte	< 90 % Mononukleäre Zellen (Lymphozyten u. Monozyten) < 25 % polymorphkernige Granulozyten
Indikationen	entzündl./seröser/infektiöser Erguss Arthritis urica parainfektiöser, postinfektiöser Erguss Gelenkbeteiligung bei rheumatischen Erkrankungen Kollagenosen
Anmerkungen	weitere Untersuchungen: Immunglobuline (IgG, IgA, IgM), Keime, evtl. Tbc
Zellkern-Ak/ANF/ANA	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	IFT
Indikationen	SLE Kollagenosen Autoimmunhepatitis
Zellzahl (Erythrozyten) im Liquor	
Probenmaterial	Liquor
Normalwerte	Angabe in Zellen / µl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ZEER Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
Zellzahl im Liquor	
Probenmaterial	3 ml frischer Liquor im Polypropylenröhrchen
Methode	Mikroskopie, Kammerzählung
Normalwerte	< 4 Zellen/µl
Indikationen	DD: Schrankenstörung, infektiöse Meningitis, Enzephalitis, Hirnabszess, chronisch entzündliche Prozesse
Zellzahl (Leukozyten) im Liquor	
Probenmaterial	Liquor
Normalwerte	Angabe in Zellen / µl
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ZEL Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

Zentromere Ak	
Probenmaterial	1 ml Serum
Indikationen	CREST-Syndrom
Zielaufträge	
Anmerkungen	Wird nur die gezielte Untersuchung auf bestimmte Keime oder Keimgruppen gewünscht, können die sog. Zielaufträge mit einem eingeschränkten Untersuchungsumfang (z.B. nur auf Salmonellen/ Shigellen, MRSA, β -hämolisierende Streptokokken, TBC) angefordert werden.
Zika-Virus IgG IIFT°	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	<1:20, negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung
Zika-Virus IgM IIFT°	
Probenmaterial	Serum
Methode	IIFT
Normalwerte	<1:20, negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung
Zink im Serum	
Probenmaterial	1 ml hämolysefreies Serum
Methode	AAS
Normalwerte	60 – 120 µg/dl
Indikationen	Zinkmangel, Acrodermatitis enteropathica Resorptionsstörungen exsudative Verluste Überwachung einer Zink-Zufuhr
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ZNS Ansatztage: täglich Mo. - Fr. binnen 30 Minuten abseren (Vermeidung der Diffusion von Zn aus den Erythrozyten) Bei Abnahme mit BD-Vakkumsystem bitte nur Spurenelement-Röhrchen vom Labor verwenden
Zink im Urin	
Probenmaterial	10 ml Urin
Methode	AAS
Normalwerte	150 – 1200 µg/
Indikationen	Überdosierung, berufliche Belastung
Anmerkungen	s.a. DMPS-Test

Zinn°	
Probenmaterial	2 ml Serum 10 ml Urin
Methode	ICP/MS (Inductively Coupled Plasma/Massenspektrometrie)
Normalwerte	Serum < 2 µg/l Urin < 2 µg/l
Indikationen	Beurteilung der Zinnbelastung, chronische Intoxikation
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: ZINS/ZINU Ansatztage: 1 - 2 x wöchentlich
Zolpidem	
Probenmaterial	Serum
Normalwerte	Therapeut. Bereich: 80 - 160 ng/ml kritischer Bereich: > 320 ng/ml
Zonisamid	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State.
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	10 - 40 µg/ml
Indikationen	Antiepileptika
Anmerkungen	Analyt Kürzel: ZONI Ansatztage: täglich Mo. - Fr. keine Gel-Röhrchen verwenden! Blutentnahme vor nächster Medikamenteneinnahme (Talspiegel) im Steady-State. Biologische Halbwertszeit: 49 - 77 Std.

Zonulin°							
Probenmaterial	ZONUS: Stuhl und/oder ZONU: Serum GEFROREN!						
Indikationen	Zonulin im Stuhl ist ein etablierter Biomarker, der bei Störungen der Darmpermeabilität („leaky gut“) ansteigt. Dies ist bei vielen gastrointestinalen Erkrankungen (Zöliakie, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen u. a.) der Fall (Sturgeon & Fasano, Tissue Barriers 2016). Zonulin im Stuhl wird hier zur Diagnosestellung und Therapiesteuerung erfolgreich eingesetzt. Zonulin in Serum nicht eindeutig geklärt. Zwar gibt es Berichte über Korrelationen von Serum-Zonulin mit Insulinresistenz (Moreno-Navarrete et al., PLoS ONE 2012), Adipositas oder Diabetes (Zak Golab et al., International Journal of Endocrinology 2013; Sapone et al., Lancet 2006), die steigende Serum-Zonulin-Konzentrationen mit pathologischen Zuständen assoziieren. Gleichzeitig finden sich jedoch auch Arbeiten, die zirkulierendem Zonulin eine prognostisch günstige Bedeutung zuschreiben: So korreliert Plasma-Zonulin negativ mit Markern der Glucooxidation und negativ mit Kynurenin, einem Marker des kardiorenenalen Risikos. Bei HIV Patienten wird ein erhöhtes zirkulierendes Zonulin sogar als Hinweis auf eine verminderte Mortalität angesehen (Hunt et al., Journal of Infectious Diseases 2014).						
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ZONU/ ZONUS Ansatztage: nach Bedarf <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stabilität:</td></tr> <tr> <td>Stuhl:</td><td>3 Tage</td></tr> <tr> <td>Serum:</td><td>24 Stunden</td></tr> </table> Zonulin ist ein essentieller Regulator von „tight junctions“ und damit der Grenzflächenpermeabilität im Körper (Review Sturgeon & Fasano, Tissue Barriers 2016). Zonulin kann prinzipiell in Stuhl, aus Serum oder Plasma bestimmt werden.	Stabilität:		Stuhl:	3 Tage	Serum:	24 Stunden
Stabilität:							
Stuhl:	3 Tage						
Serum:	24 Stunden						

Zopiclon°	
Probenmaterial	Serum
Methode	LC-MS (Liquid-Chromatographie)
Normalwerte	55 - 85 µg/L Toxischer Bereich > 300 µg/L
Anmerkungen	° Fremdleistung MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH Analyt Kürzel: ZOPI Ansatztage: Mo., Mi., Fr. Präanalytik: Tiefgefroren, Blutentnahme ca. 2h nach Gabe für Spitzenspiegel
Zuclopenthixol°	
Probenmaterial	Serum, keine Gel-Röhrchen verwenden!
Methode	LC-MS/MS (Liquid-Chromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	4,0 - 50,0 µg/l
Indikationen	Antipsychotika, Neuroleptika
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: ZUCL Ansatztage: Di., Do. Wir empfehlen für die Blutentnahme die Verwendung von gelfreien Röhrchen, um eine mögliche Adsorption des Analyten an einer Gelbarriere zu verwenden.
Zytoplasma IgG Blot°	
Probenmaterial	Serum
Methode	Lineblot
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung, Labor Augsburg MVZ Analyt Kürzel: ZYPLB Ansatztage: nach Bedarf Zytoplasma IgG Lineblot enthält: AMA M2 (nativ) IgG; AMA M2-3E BPO (rekomb) IgG; rib. P-Protein IgG; Jo-1 IgG; SRP IgG; PL-7 IgG; PL-12 IgG; EJ IgG; OJ IgG; Ro-52 IgG

α Alpha 1-Antitrypsin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Turbidimetrie
Normalwerte	90 – 200 mg/dl
Indikationen	Hepatopathien panlobuläres Lungenemphysem hereditärer Antitrypsinmangel Akute-Phase-Protein V.a. Proteinase-Inhibitor-Mangel unklare Lebererkrankung im Kindesalter Lungenemphysem frühes Erwachsenenalter Lebernekrose unklarer Genese
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AAT Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
α Alpha 1-Antitrypsin-Phänotyp°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Isoelektrische Fokussierung
Normalwerte	s. Bericht
Indikationen	mehr als 75 genetische Varianten bekannt häufigster Typ MM; die Varianten S und Z haben erniedrigten α1-Antitrypsinspiegel im Blut ZZ und Z0 (Null-) Merkmalsträger haben einen angeborenen manifesten Mangel an α1-Antitrypsin
Anmerkungen	° Fremdleistung
α Alpha 1-Fetoprotein AFP	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 5,8 IU/mL
Indikationen	Primäres Leberzellkarzinom Kontrolle bei Leberzirrhosepatienten Keimzelltumoren (Hoden, Ovar, extragonadal) Schwangerschaft (Risiko für Neuralrohrdefekte, 15.-20. SSW, bitte SSW angeben)
Anmerkungen	Analyt Kürzel: FAP Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
α Alpha-1-Globulin	
Probenmaterial	Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	2,9 % - 4,9 %
α Alpha 1-Glykoprotein, saures° (Urosomucoid)	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	RID
Normalwerte	0.5 – 1.2 g/l
Indikationen	saures Mukopolysaccharid „akute-Phase-Protein“
Anmerkungen	° Fremdleistung

α Alpha 1-Mikroglobulin°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	24 - 46 mg/l
Anmerkungen	Leitprotein - tubuläre Proteinurie - niedermolekulare Proteine (unter 50 000 Dalton) sind frei filtrierbar und erscheinen im Endharn, wenn im Rahmen eines interstitiellen Nierenschadens die Reabsorptionsleistung im proximalen Tubulus nachlässt. ° Fremdleistung
α Alpha 1-Mikroglobulin im Urin/die	
Probenmaterial	24 h - Sammelurin
Methode	Turbidimetrie, Immunologischer Trübungstest
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MIDI Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
α Alpha 1-Mikroglobulin im Urin pro Liter	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin oder 2. Morgenurin
Methode	Turbidimetrie Immunologischer Trübungstest
Normalwerte	< 12 mg/l
Indikationen	• Marker der tubulären Resorptionsfunktion • Erhöht bei z.B. Glomerulopathien mit interstitieller Mitbeteiligung • bei tubulärer Überlaufproteinurie
Anmerkungen	Analyt Kürzel: MIA1 Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Nachforderbarkeit: max. 7 Tage
α Alpha-2-Globulin	
Probenmaterial	Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	7,1 % - 11,8 %

α Alpha 2-Makroglobulin°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Nephelometrie
Normalwerte	Kinder: altersabhängig Erwachsene: 1.0 – 2.60 g/l
Indikationen	Diabetes, Nephropathie, postrenale Schädigung
Anmerkungen	° Fremdleistung
α Alpha Amylase im Serum	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	Photometrie
Normalwerte	28 – 100 U/l
Indikationen	Pankreaserkrankungen:akute und chronische Pankreatitis
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
α Alpha Amylase im Urin	
Probenmaterial	5 ml Urin
Methode	Enzymtest
Normalwerte	Frauen: 21 – 447 U/l Männer: 16 – 491 U/l
Indikationen	Erkrankungen und chirurgischen Eingriffen (ERCP), Pankreas-Ca
Anmerkungen	Analyt Kürzel: AMU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
α Alpha Hexachlorcyclohexan°	
Probenmaterial	10 ml EDTA-Blut im Lindan-Röhrchen
Methode	GC/MS (Gaschromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	< 0.01 µg/l
Anmerkungen	Lindan-Röhrchen im Labor anfordern Lindan Holzschutzmittel ° Fremdleistung

α Alpha Hydroxybutyrat-Dehydrogenase	
Probenmaterial	1 ml Serum hämolysefrei innerhalb einer Stunde abseren
Methode	Photometrie
Normalwerte	72 – 182 U/l
Indikationen	Herzinfarkt Lungenembolie hämolytische und megaloblastäre Anämien
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HBD Ansatztage: täglich Mo. - Fr. erhöhte Werte nach körperlicher Belastung und bei Hämolyse
β Beta -1-Globulin	
Probenmaterial	Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	4,7 % - 7,2 %
β Beta 2-Globulin	
Probenmaterial	Serum
Methode	Elektrophorese
Normalwerte	3,2 - 6,5 %
β Beta -2-Glykoprotein IgG/IgM°	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ELISA (Enzym-Linked-Immunsorbent-Assay)
Normalwerte	siehe Befund
Indikationen	Antiphospholipidsyndrom habituelle Aborte Thromboseneigung; s. auch Lupus Antikoagulans
Anmerkungen	° Fremdleistung, Bioscientia Ingelheim Analyt Kürzel: B2GLY/ B2GLYM Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
β Beta 2-Mikroglobulin	
Probenmaterial	2 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 2.5 mg/l bis 59 Jahre < 3.0 mg/l ab 60 Jahre
Indikationen	Plasmozytom Lymphome Früherkennung einer Niereninsuffizienz Kontrolle nach Nierenoperationen und transplantationen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: β2MS Ansatztage: täglich Mo. - Fr.

β Beta 2-Mikroglobulin im Urin	
Probenmaterial	10 ml Spontanurin
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	< 300 µg/l
Indikationen	renale tubuläre Schädigung durch Schwermetalle wie Cadmium und Quecksilber tubulo-interstitielle Nierenerkrankungen
Anmerkungen	Analyt Kürzel: β2MU Ansatztage: täglich Mo. - Fr.
β Beta -Alanin°	
Probenmaterial	EDTA Plasma, gefroren
Normalwerte	0 - 7 µmol/l
Anmerkungen	° Fremdleistung
β Beta -Amyloid°	
Probenmaterial	1 ml Liquor
Normalwerte	> 375 pg/ml
Indikationen	Demenzdiagnostik, kombinierte Bestimmung mit Tau-Protein und 14-3-3 Protein
Anmerkungen	° Fremdleistung
β Beta -Carotin°	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	150 – 1250 ng/ml
Indikationen	V. a. Malabsorptionssyndrom, Steatorrhoe
Anmerkungen	° Fremdleistung
β Beta -CrossLaps°	
Probenmaterial	1 ml Serum 8-9 Uhr nüchtern
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	Frauen prämenopausal < 0.59 µg/l Frauen postmenopausal < 1.008 µg/l Männer < 0.704 µg/l
Indikationen	Osteoporosediagnostik Marker für gesteigerten Knochenabbau
Anmerkungen	° Fremdleistung

β Beta -HCG Humanes Choriongonadotropin	
Probenmaterial	1 ml Serum
Methode	ECLIA (Elektrochemischer Lumineszenzimmunoassay)
Normalwerte	Frauen < 1 U/l bei Schwangerschaft siehe Befund Männer < 2 U/l
Indikationen	Schwangerschaftsdiagnostik: Früherkennung der Schwangerschaft (1 – 2 Wochen nach Konzeption) Ektope Schwangerschaft Abortdiagnostik Keimzelltumoren von Hoden und Ovar Chorion-Ca Blasenmole
Anmerkungen	Analyt Kürzel: HCG_R Ansatztage: täglich Mo. - Fr. Angabe von SSW und Diagnose
β Beta -Hexachlorcyclohexan°	
Probenmaterial	10 ml EDTA-Blut im Lindan-Röhrchen
Methode	GC/MS (Gaschromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	altersabhängige Grenzwerte
Anmerkungen	Lindan-Röhrchen im Labor anfordern Lindan Holzschutzmittel ° Fremdleistung
β Beta Interferon°	
Probenmaterial	Serum
Methode	EIDA
Normalwerte	negativ
Anmerkungen	° Fremdleistung, MVZ Labor Volkmann Karlsruhe Analyt Kürzel: BINF Ansatztage: nach Bedarf
γ-Hexachlorcyclohexan°	
Probenmaterial	10 ml EDTA-Blut im Lindan-Röhrchen
Methode	GC/MS (Gaschromatographie/Massenspektrometrie)
Normalwerte	< 0.1 µg/l
Anmerkungen	Lindan-Röhrchen im Labor anfordern Lindan Holzschutzmittel ° Fremdleistung

δ-Aminolävulinsäure°	
Probenmaterial	10 ml vom 24-Std.-Urin kühl gesammelt, 4°C Tagesmenge angeben
Methode	HPLC (High-Performance-Liquid-Chromatography)
Normalwerte	< 6 mg/d
Indikationen	Porphyrie, Bleiintoxikation,
Anmerkungen	s. auch Porphobilinogen, Porphyrine ° Fremdleistung

Index

1

1-Butanol im Blut°	75
1-Methylhistidin°	75
1.25-dihydroxyvitamin D	72
10-OH-Cabazepin	72
11-Desoxycortisol°	72
14-3-3-Protein°	73
17-Hydroxyprogesteron°	73
17-Ketosteroide°	74
17-OH-Pregnenolon°	74
18-Hydroxy-Corticosteroide°	74

3

3-Methoxytyramin	76
3-Methoxytyramin im Urin°	77
3-Methoxytyramin im Urin°	77
3-Methylhistidin°	77

5

5-Aminosalicylsäure°	78
5-Hydroxy-Tryptophan im Urin°	78
5-Hydroxyindoleessigsäure (5-HIES) im Urin pro Tag°	78
5-S-Cysteinyldopa i. Plasma°	78

6

6-Acetylmorphin°	78
6-Monoacetylmorphin°	78

9

9-OH-Risperidon	79
9-Tetrahydrocannabinol°	79

A

a-Aminoadipinsäure°	79
a-Aminobuttersäure°	79
AB0-System, Rhesus-Faktor	80
Acetaminophen°	80

Aceton im Blut°	80
Aceton im Urin°	81
Acetylcholin-Rezeptor-Ak°	81
ACTH Adrenocorticotropes Hormon	81
Adalimumab Ak°	82
Adalimumab°	81
Adenoviren (Meldepflicht IfSG)°	83
Adenovirus-IgA-Ak°	83
Adenovirus-IgG-Ak°	83
ADH	83
Adiponektin°	83
Adrenalin im Urin°	84
Adrenalin/Noradrenalin im Plasma°	84
Aeromonas spp.	84
Ajmalin°	85
Aktinomykose	85
Aktinomyzeten	86
aktivierte Protein C-Resistenz (APCR)	86
Alanin°	86
ALAT, ALT, Alaninaminotransferase	87
Albumin im Liquor	87
Albumin im Serum	87
Albumin im Stuhl°	87
Albumin im Urin die	88
Albumin im Urin pro Liter	88
Albumin Kreatinin Quotient im Urin	88
Albumin-IgG-Quotient	87
Albumin-Quotient	89
Aldolase°	89
Aldosteron i. Urin°	92
Aldosteron im Plasma	90
Aldosteron-Renin-Quotient (ARQ)	92
Alkalische Leukozytenphosphatase°	93
alkalische Phosphatase	93
Alkalische Placenta Phosphatase°	93
Alkohol (Ethanol)	94
Allo-Isoleucin	94
Aluminium°	94

Alveolen-Basalmembran-AK°	94	Anti-Mi 2-AK°	114
AMA Antimitochondriale-Ak	95	Anti-Müller-Hormon°	115
AMA-M2	95	Anti-PM1 AK	117
Ameisensäure°	95	Antiarrhythmika	103
Amikacin im Serum°	95	Antibiogramm	104
Aminosäuren im Plasma°	95	Antibiotikaassoziierte Diarrhoe	
Aminosäuren im Urin°	96	(AAD)	108
Amiodaron	96	Antidepressiva	109
Amisulprid	96	Antiepileptika	111
Amitriptylin	97	Antikonvulsiva	113
Ammoniak	97	Antikörper-Suchtest MuVo	114
Amphetamine im Serum CEDIA°	99	Antimon im Serum°	114
Amphetamine im Urin	99	Antimon im Urin°	114
Amphetamine, Amphetamin,		Antimykogramm	117
Methamphetamin, MDA, MDMA,		Antimykotika	117
MDE	99	Antistaphylolysin (qualitativ/	
Amphetamine°	99	quantitativ) ASA ASAQ°	118
Amylase-Isoenzyme Pankreas-		Antistreptodornase B°	118
Amylase°	99	Antistreptolysin O ASL quantitativ	119
Amylase-Isoenzyme Speichel-		Antithrombin III Aktivität	119
Amylase°	100	AP, knochenspezifisch Ostase°	120
Amyloid A° (SAA)	100	AP-Isoenzyme°	119
Amöben IgG-Ak°	97	Apolipoprotein A1°	120
Amöben IgM-Ak°	98	Apolipoprotein A2°	120
Amöben Mikrobiologie	98	Apolipoprotein B°	121
ANCA	100	Apolipoprotein E-Genmutation°	122
Androgen-Index	101	aPTT (aktivierte Partielle	
Androgene im Urin, Androsteron,		Thromboplastinzeit)	123
Ätiocholanon, Pregnantriol,		Aquaporin 4 AK im Serum°	124
DHEAS, Testosteron	100	Aquaporin 4 im Liquor AK °	124
Androstendion	102	Arginin°	124
Androsteron°	103	Aripiprazol im Serum	125
Angiotensin Converting Enzyme		Arsen im Serum°	125
(ACE)°	103	Arsen im Urin°	125
Anti CENP Antikörper (Centromer		Articain°	125
Protein B)	108	Ascaris lumbricoides im Stuhl	126
Anti HBc	112	Ascaris lumbricoides-IgG-Ak°	125
Anti HBc-IgM	112	Asparaginsäure°	126
Anti HBs	113	Asparagin°	126
Anti HBs quant.	113	Aspergillus spp.	126
Anti HCV	113	Aspergillus-IgE-Ak	126
Anti RNP70 Antikörper (70 kDa)	118	Aspergillus-IgG-Ak°	126
Anti Sm Antikörper (SmD3-Peptid)	118	Asthma/Rhinitis SAISONAL	127
Anti U1RNP Antikörper (RNP70, A,		Asymmetrisches Dimethylarginin°	127
C)	119	Atomoxetin°	127
Anti-FXa-Aktivität°	112	Autoimmun/system-Erkrankungen	132

Autoimmundiagnostik	128
Autoimmunthrombozytopenie°	135
Azathioprin als 6-Mercaptopurin°	136

B

Baclofen°	136
Bakteriologische Untersuchung	137
Barbiturate (Einzelnachweis)	137
Bartonella quintana-Ak IgG und IgM°	138
Basophile	138
Basophile absolut	138
Bence-Jones-Proteine	138
Benzodiazepine im Serum°	138
Benzodiazepine im Urin	139
Benzol°	139
Benzoyllecgonin im Haar (GCMS)°	139
Bicarbonat	139
Bilirubin - indirekt	140
Bilirubin gesamt	140
Bilirubin im Fruchtwasser	140
Bilirubin im Urin	140
Bilirubin – direkt	140
Biotin Vitamin H°	141
Biperiden°	141
Blasenbilharziose / Bilharziose (Schistosomen)°	142
Blei	143
Blut im Stuhl, IFOBT, immunologischer Stuhltest	143
Blut im Urin	144
Blutgruppenbestimmung	143
Blutkulturen	145
Bor im Urin°	149
Bordetella parapertussis IgA-Ak°	148
Bordetella parapertussis IgG-Ak°	148
Bordetella parapertussis PCR°	148
Bordetella pertussis PCR°	148
Bordetella pertussis Toxin IgA-Ak	149
Bordetella pertussis Toxin IgG-Ak	149
Borrelie DNA°	149
Borrelie IgG-Blot	150
Borrelie IgM-Blot	151
Borrelie-IgG-Ak im Liquor°	150
Borrelie-IgG-Ak im Serum	150

Borrelie-IgM-Ak im Liquor°	151
Borrelie-IgM-Ak im Serum	151
Brivaracetam (LC-MS/MS)	151
Bromazepam°	152
Bromid°	152
Brucella-IgA-Ak°	152
Brucella-IgG-Ak°	152
BSG	
Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit°	153
bullöses Pemphigoid AK°	153
Bupropion im Serum	154
Bupropion im Urin°	155

C

C-ANCA Anti-Neutrophilen Cytoplasmatische Antikörper	163
C-Peptid	188
C1-Esteraseinhibitor	155
C1-Inhibitor (Aktivität)°	155
C1q-Komplement°	155
C3-Komplement	155
C3-Nephritis-Faktor°	156
C4-Komplement	156
CA 125	157
CA 15-3 Carbohydrate Antigen 15 - 3	158
CA 19-9	158
CA 50°	159
CA 72-4 Cancer Antigen	159
Cadmium i. Blut°	159
Cadmium i. Urin°	159
Calcitonin	160
Calcitonin-Stimulationstest	
Pentagastrin-Test (jeweils Serum für Calcitonin)	160
Calcium im Serum	160
Calcium im Urin	161
Calcium ionisiert°	161
Calcium-Kanal-Protein-Ak (P/Q-Typ) (Serum (S))°	162
Calprotectin	162
Campylobacter fetus-Ak°	163
Campylobacter jejuni-Ak°	163
Campylobacter spp.	163
Candida albicans	163

Candida albicans-IgA-Ak°	164	Cholinesterase-Varianten°	175
Candida albicans-IgG-Ak°	164	Chromogranin A°	176
Candida albicans-IgM-Ak°	164	Chromosomenanomalie	176
Cannabis	164	Chrom°	176
Cannabis, als THC-COOH, als THC,		Citalopram	177
als THC-COOH	164	Citrat°	177
Carbamazepin	165	Citrullin°	177
Carbamazepinepoxid°	165	CK (Creatin-Kinase)	178
Carbidopa°	165	CK-Isoenzyme°	178
Carbimazol (Thiamazol)°	166	Clomethiazol°	178
Cardiolipin IgG/IgM°	166	Clomipramin	179
Cardiolipin-IgA-Ak°	166	Clonazepam°	179
Cardiolipin-IgG-Ak°	166	Clostridium difficile	179
Cardiolipin-IgM-Ak°	167	Clostridium difficile-Toxin	180
Carnitin, frei°	167	Clozapin	180
Carnosin°	167	CO-Hämoglobin°	181
CDT Carbohydrate-Deficient-		Cocaethylen i. Haar (GCMS)°	180
Transferrin	167	Codein im Serum	181
CEA Carcinoembryonales Antigen	168	Codein°	180
Chikungunya-Virus IgG°	168	Codein° im Urin	181
Chikungunya-Virus IgM°	168	Coeruloplasmin	181
Chinidin°	169	Colitis ulcerosa	181
Chlamydia pneumoniae-IgA-Ak	169	Coombs-Test direkt	182
Chlamydia pneumoniae-IgA-Blot	169	Coombs-Test indirekt	182
Chlamydia pneumoniae-IgG-Ak	169	Coombs-Test indirekt	
Chlamydia pneumoniae-IgG-Blot	170	Antikörpersuchtest	182
Chlamydia psittaci-IgA-Ak-Blot	170	Copeptin° COA CT-proAVP/	
Chlamydia psittaci-IgG-Ak-Blot	170	Copeptin	183
Chlamydia trachomatis IgA-AK	171	Cortisol ACTH-Stimulationstest	
Chlamydia trachomatis IgA-AK-		(Kurztest)	184
Blot	171	Cortisol im Serum	186
Chlamydia trachomatis IgG-AK	171	Cortisol-Dexamethasonhemmttest	
Chlamydia trachomatis IgG-AK-		(Kurz-Test 2 mg)	185
Blot	171	Cotinin im Urin°	187
Chlamydia trachomatis-PCR°	172	Cotinin°	187
Chlamydien und Gonokokken	173	Coxsackie Virus IgG-Ak	187
Chlamydien-PCR STD (sexual		Coxsackie Virus IgM-Ak	187
transmitted disease)	172	Creatin-Kinase-MB	188
Chlorid im Liquor°	173	CRP C-reaktives Protein	188
Chlorid im Serum	173	CRP sensitiv	188
Chlorid im Urin	174	Cryptococcus neoformans	188
Chlorprothixen°	174	Cyclosporin A	189
Cholera	174	CYFRA 21-1	189
Cholesterin	175	Cystathionin	189
Cholesterin, gesamt	175	Cystatin C	189
Cholinesterase (CHE)	175	Cystin (frei) im Plasma°	190

Cystin frei im Urin°	190
Cystin frei/Kreatinin im Urin°	190
Cystin im Serum°	190
Cystische Fibrose	191
Cytomegalie DNA°	191
Cytomegalie IgG-Ak	192
Cytomegalie IgM-Ak	192
Cytomegalie pp65° Lower Matrix Protein°	192
Cytomegalievirus (CMV) PCR°:	193

D

D-Dimere	194
Darm-AP	193
Darmbilharziose / Bilharziose (Schistosomen)°	193
Dehydro-aripiprazol im Serum	194
Dehydroapiprazol im Serum	194
Dehydroepiandrosteron-Sulfat	
DHEA-S	195
Delpech Blau Quotient	196
Dengue Virus IgG/IgM°	196
Dengue-Virus Antigen°	196
Desethylamiodaron	196
Desipramin	197
Desmethylclozapin	197
Desmethyldiazepam°	197
Desmethyfluoxyetin	198
Desmethylnortazapin	198
Desoxy-Pyridinolin°	199
DFS 70 IgG AK°	199
Diagnostik von IgE-vermittelten Allergien	200
Diaminoxidase DAO (REA)°	201
Diazepam°	202
Diclofenac	202
Differentialblutbild / Großes Blutbild	203
Digitoxin	203
Digoxin	203
Dihydrocodein im Serum	204
Dihydrocodein/Dihydromorphen	204
Dihydrocodein°	203
Dihydrotestosteron°	204
Diltiazem°	204

Dimorphe Pilze	204
Diphtherie Corynebacterium diphtheriae°	205
Diphtherie-Toxoid-Ak	205
DKK3 (Dickkopf 3) Konzentration°	205
DMPS-Test (Dimival®-Test) Probe I: Zink-Bestimmung	206
DNS-AK (Doppelstrang-DNA)	206
Dobrava Belgrad-IgG /-IgM-Ak	
DOBV	206
Dopamin°	207
Doxepin/Nordoxepin°	207
Doxycyclin	207
Drogen-Suchtest	209
Drogen-Suchtest-Barbiturate	209
Drogenanalytik	209
Duloxetine	210

E

EBNA-1-IgG-Ak	210
EBV-DNA°	211
EBV-VCA-IgG-Ak	211
EBV-VCA-IgM-Ak	212
Echinokokken-Ak, IgG-Ak, IgG-Blot	212
Echinokokken-IgG Blot°	213
Echinokokken-IgG-Ak	212
ECP Eosinophil Cationic Protein°	213
EHEC Enterohämorrhagischer E. coli (EHEC)°	214
Einzelallergene, spez. IgE	215
Einzelnachweis Medikamente/ Drogen	216
Einzelstrang-DNA (ssDNA)-Ak°	216
Eisen	216
Eisensorptionstest	217
Eisenstoffwechsel, Anämiediagnostik	217
Eiweiß im Liquor	218
Eiweiß im Urin	218
Eiweiß-Elektrophorese im Serum	218
Elastase 1 im Serum°, E 1 im Serum	218
Elastase 1 im Stuhl, E 1 im Stuhl	219
EMA Test°	219

ENA-Ak, Autoantikörper gegen		Ferritin	242
Extrahierbare Nukleäre Antigene	220	Fettstoffwechsel-Diagnostik	243
Endomysium-AK IgA (IFT)°	221	Fisteln	243
Endomysium-AK IgG (IFT)°	221	Flecainid°	244
Enteroviren IgG-Ak°	221	Fluorid°	244
Enteroviren IgM-Ak°	221	Fluoxetin	245
Eosinophile	222	Flupentixol°	245
Eosinophile absolut	222	Fluphenazin	245
EPEC (Meldepflicht IfSG), Entero-		Fluspirilen°	246
Pathogener E. coli (EPEC)°	223	Fluvoxamin	246
Epidermale Basalmembran Ak°	223	Folsäure	246
Erregerspezifischer		Freie-κ-Leichtketten im Serum	249
Antikörperindex	223	Freie-κ-Leichtketten im Urin	249
Erythromycin	223	Freie-λ-Leichtketten im Serum	249
Erythropoetin EPO°	224	Freie-λ-Leichtketten im Urin	249
Erythrozyten	224	freies 25-OH-Vitamin D°	246
Erythrozyten Protoporphyrine°	224	freies Cortisol im Serum°	247
Erythrozyten Verteilungsbreite	225	freies Cortisol im Speichel°	247
Erythrozyten-Resistenz	224	freies Cortisol im Urin°	248
Erythrozytenfragmente	224	freies Hämoglobin	248
Erythrozytenzählung im Urin	225	freies Protein S-Ag	248
Escitalopram	225	freies PSA	248
Eslicarbazepin	225	freies Valproat	249
Ethanolamin	225	Fructosamine	249
Ethosuximid	226	Fruktosamin	249
Ethylglucuronid (ETG)°	226	Fruktose im Ejakulat°	250
Etiocolanolon° , Ätiocolanolon°	226	Fruktoseintoleranz°	250
Etoricoxib°	227	FSH Follikelstimulierendes	
Everolimus	227	Hormon	251
F		FSME PCR°	253
Faktor I (Fibrinogen)	228	FSME-IgG-Ak	252
Faktor II Aktivität°	229	FSME-IgM-Ak	253
Faktor II-Mutation		FT3 Freies Trijodthyronin	253
(Prothrombinmutation)°	230	FT4 Freies Thyroxin	254
Faktor IX°	231	FTA-ABS	254
Faktor V Aktivität°	233	FTA-ABS-19S-IgM IFT°	254
Faktor V Mutation°	237	Furmecyclo (Xyligen B)	254
Faktor VIII°	236	G	
Faktor VII°	235	GAD-Ak° Glutamat Decarboxylase-	
Faktor XIII Antigen°	241	Ak	254
Faktor XII°	240	gamma-Globulin	254
Faktor XI°	239	Gamma-GT γ-Glutamyltransferase	255
Faktor X°	238	Gastrin°	255
Felbamät im Serum°	242	Gefässendothel-Ak°	255

Gentamicin	255
gesamt-25-Hydroxyvitamin D	256
Gesamt-IgE	257
Gesamteiweiß	256
Gesamteiweiß im Urin	256
Glatte Muskulatur Ak Titer	257
Glatte Muskulatur-Ak	257
Gliadin IgE	258
Gliadin-IgA-Ak	257
Gliadin-IgG-Ak	258
Glomerulus-Basalmembran Ak°	259
glomeruläre Basalmembran (GBM)	258
Glomeruläre Filtrationsrate GFR (MDRD/ CKD-EPI-Formel) Serum	259
Glomeruläre Filtrationsrate GFR (Urin)	259
Glucose im Serum - Analyse wird nicht mehr durchgeführt	260
Glucose postprandial	261
Glucose Tagesprofil	262
Glucose, nüchtern	260
Glukagon°	262
Glukose im Liquor	263
Glukose im Urin	263
Glukose im Urin / Liter	263
Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase°	263
Glutamat-Dehydrogenase	264
Glutaminsäure°	264
Glutamin°	264
Glutathion°	264
Glycin°	264
Gonokkokken-PCR STD (sexual transmitted disease)	265
Gonokokken-Infektion	266
Gonokokken-Kultur STD (sexual transmitted disease)	267
GOT, ASAT AST	
Aspartataminotransferase	268
GPT, ALAT ALT	
Alaninaminotransferase	268
Guanfacin°	268

H

Haemophilus influenzae	268
Haemophilus influenzae Typ b-IgG-Ak°	268
Haloperidol	269
Hantaan-IgG /-IgM-Ak HTNV	273
Haptoglobin	273
Harnkonkrement°	273
Harnstoff im Serum	274
Harnstoff im Urin	274
Harnstoff-Clearance	274
Harnsäure im Serum	273
Harnsäure im Urin	274
Haut-Ak°	274
HAV-PCR°	275
HbA1c (IFCC)	276
HBe Antigen	276
HBs Antigen	277
HBs-Antigen in der Schwangerschaftsvorsorge	277
HBV-DNA PCR	277
HBV-DNA quantitativ Viruslast	277
HCV Blot	278
HCV-Ak	277
HCV-Genotypisierung°	278
HCV-RNA PCR qualitativ	278
HCV-RNA PCR quantitativ	279
HDL-Cholesterin	279
HE4 (Ovar) Tumormarker°	280
Helicobacter pylori	
Antigennachweis im Stuhl	281
Helicobacter pylori	
Antikörpernachweis (ELISA) im Serum	282
Helicobacter pylori Kultur und Resistenzbestimmung (Magenbiopsie)°	283
Helicobacter pylori-IgA-Ak	282
Helicobacter pylori-IgG-Ak	282
Helicobacter-13C-Atemtest°	280
Helicobacter-Antigen	281
Helicobacter-Kultur°	281

Heparininduzierte		Homocystein	297
Thrombozytopenie HIT II		Homovanillinsäure HVS im Urin°	297
Diagnostik aus Serum°	284	HSV-1-AI (IgG)°	298
Hepatitis A-Ak gesamt	285	HSV-1-AI (IgM)°	298
Hepatitis A-IgM-Ak	285	HSV-1-IgG Blot	298
Hepatitis A-Virus-Antigen°	285	HSV-1-IgM Blot	298
Hepatitis B Diagnostik	286	HSV-1/2-IgG-Ak	297
Hepatitis C (HCV)	287	HSV-1/2-IgM-Ak	298
Hepatitis D-Virus-Ak°	288	HSV-2-IgG Blot	298
Hepatitis Delta (HDV)°	288	HSV-2-IgM Blot	299
Hepatitis Delta Ag°	287	Hu-ANNA Typ 1 Ak°	299
Hepatitis Delta-Ak°	287	Hu-Antikörper im Liquor°	299
Hepatitis Delta-IgM-Ak°	288	Hu-D im Serum Ak°	299
Hepatitis Delta-PCR°	288	Humanes Papillomvirus-DNA	
Hepatitis E (HEV)	289	(HPV-PCR)° STI (sexuell	
Hepatitis E-IgG-Ak	289	übertragbare Infektionen)	300
Hepatitis E-IgG-Ak-Blot	289	Hyaluronidase-Ak°	301
Hepatitis E-IgM-Ak	289	Hyaluronsäure°	301
Hepatitis E-IgM-Ak-Blot	289	Hydroxybupropion im Serum	302
Hepatitis E-PCR°	290	Hydroxylysin°	302
Hepcidin°	290	Hydroxyprolin°	303
Heroin	290	Hyperparathyreoidismus	303
Herpes simplex Ak im Liquor	290	Hyperthyreose	303
Herpes simplex-Virus-PCR°	290	Hypochrome Erythrozyten	303
Herzmuskel-Ak°	290	Hämatokrit	269
Hippursäure°	291	Hämochromatose Genotyp°	270
Histamin im Plasma°	291	Hämoglobin	270
Histamin im Stuhl°	291	Hämoglobin im Stuhl	271
Histamin im Urin°	291	Hämoglobin, frei° (Plasma	
Histamin im Vollblut°	291	Hämoglobin)	271
Histidin°	291	Hämoglobin-Elektrophorese°	271
Histone Ak	292	Hämoglobin-Verteilungsbreite	272
HIV I Blot	292	Hämoglobin/Haptoglobin-	
HIV I RNA-PCR°	292	Komplex°	271
HIV II Blot	292	Hämoglobinopathien°	272
HIV- Ag/Ak (HIV-1/2-Ak + p24-Ag)	292	Hämolytisch-urämisches Syndrom	
HLA B27	293	(HUS)	272
HLA Klasse I Iso-Ak°	295	Hämopexin°	272
HLA-Antigene	293		
HLA-B27-Genmutation°	294	I	
HLA-DQ-Antigene°	294	Ibuprofen im Serum	303
HLA-DR-Antigene°	294	IgA im Liquor	303
HLA-Typisierung°	295	IgA im Serum	303
HMG-CoA-Reduktase-AK°	295	IgA im Stuhl°	304
Holotranscobalamin	296	IgA sekretorisch°	304
Holzschutzmittel°	296		

IgA-Nephropathie	304
IgD im Serum°	304
IGFBP-3 Insulin-Like-Growth-Factor-Binding-Protein-3	304
IgG im Liquor	305
IgG im Serum	305
IgG im Urin	306
IgG im Urin / die	306
IGG im Urin / Liter	306
IgG-Antikörper gegen CCP	305
IgG4/IgG Quotient im Serum	304
IgM im Liquor	306
IgM im Serum	307
Imipramin	307
Immunfixationselektrophorese	307
Immunglobulin IgG-Subklassen,	
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4	308
Immunglobuline im Liquor	308
Immunglobuline im Serum	308
Immunkomplex-	
Glomerulonephritis	309
Immunkomplex-Vaskulitis	309
Immunkomplexe, zirkulierende°	308
Immunthrombozytopenie (M. Werlhof)	309
Infliximab Ak°	310
Infliximab°	309
Influenza A-B-Virus-RT-PCR	311
Influenza A-IgA-Ak	311
Influenza A-IgG-Ak	312
Influenza B-IgA-Ak	312
Influenza B-IgG-Ak	313
Influenza-Serologie	313
Inhalationsscreen SX1 (Phadiatop)	313
INR	314
Inseldzell-Ak°	314
Insulin	315
Insulin Resistenz HOMA-Index	316
Insulin-Autoantikörper (IAA)°	315
Interleukin-1- Beta β°	316
Interleukin-1-α°	316
Interleukin-2°	316
Interleukin-6°	317
Intrinsic-Faktor Ak	317
Isoleucin°	317

J

JAK2-Mutation V617F °	318
Jo-1 Antikörper	321
Jod im Serum°	321
Jod im Urin°	321

K

Kalium im Heparinplasma	321
Kalium im Serum	322
Kalium im Urin	322
Katecholamine im Plasma°	323
Katecholamine im Urin°	323
Katheterspitzen	324
Kawasaki-Syndrom	324
Kiwi IgE°	324
Kleines Blutbild	324
Kokain im Urin	325
Kokain, Kokain/Benzoyllecgonin	325
Kokain-Metabolite	325
Kokain°	325
Kollagenosen serologische Diagnostik	325
Komplement-Gesamtaktivität (CH50)°	326
komplexiertes PSA°	327
Kreatin im Serum°	327
Kreatin im Urin°	328
Kreatinin im Serum	329
Kreatinin im Urin	329
Kreatinin-Clearance	329
Kreatinin°	328
Kreuzprobe	
Blutgruppenverträglichkeit	330
Kryoglobuline	330
Kupfer im EDTA-Blut	330
Kupfer im Serum	330
Kupfer im Urin°	331
Kälteautoantikörper,	
Kälteagglutinine	322

L

L-Carnitin im Ejakulat°	334
L-Carnitin°, frei	334

Lacosamid	331	LUC	347
Lactat im Blut	331	Lupus Antikoagulanz°	348
Lactat im Liquor	332	Lymphozyten	349
Lactat-Dehydrogenase	331	Lymphozyten absolut	349
Lactoferrin im Stuhl°	332	Lymphozyten-Differenzierung, T-	
Lactose-Toleranztest	333	Lymphozyten (=CD3/CD45), T-	
Lactoseintoleranz°	332	Helferzellen (=CD3/CD4/CD45), T-	
Lamblien Giardia lamblia	333	Suppressorzellen (=CD3/CD8/	
Lamotrigin	334	CD45), T4/T8-Quotient (=CD4/CD8-	
LDH-Isoenzyme°	335	Quotient), Aktive T-Lymphozyten	
LDL-Cholesterin	335	(=CD3/HLA-DR/CD45), B-	
LE ANA IFT	336	Lymphozyten (=CD3/CD19/CD45),	
Lebermembran-Ak°	336	Natürliche Killerzellen (NK)	
Leflunomid als Metabolit	336	(=CD16+CD56/CD45)	350
Legionella spp.°	337	Lymphozyten-Transformations-	
Legionella-Antigen°	336	Test	350
Legionella-IgG-Ak	337	Lysin°	350
Legionella-IgM-Ak	337	Lysozym°	351
Legionellen PCR°	337	löslicher Interleukin-2-Rezeptor	
Leichtketten κ λ	337	sILR°	346
Leishmanien-Ak°, Indir.			
Hämaggglutination: IHA Titer, IgG-			
Ak, IgM-Ak	338		
Leptin°	338	M	
Leptospiren-IgG-Ak°	338	M. Addison	351
Leptospiren-IgM-Ak°	338	M. Basedow	364
Leucin	338	M. pneumoniae-PCR°	382
Leukozyten	339	M2-PK im Stuhl° Tumor M2-	
Leukozyten im Urin	339	Pyruvatkinase	351
Levetiracetam	339	Magnesium im Serum	351
Levodopa	340	Magnesium im Urin	351
LH Luteinisierendes Hormon	341	Malabsorptiononssyndrom	352
Lindan (γ -HCH)°	342	Malaria-Antikörper°	352
Lipase	342	Malaria-Blutausstrich	352
Lipidelektrophorese°	342	Malaria-Dicker Tropfen	352
Lipidperoxide°	342	Malondialdehyd, frei°	353
Lipopolysaccharide bind. Protein°	343	Mangan°	353
Lipoprotein (a) 2.Gen	343	Maprotilin	353
Liquordiagnostik, Liquorstatus	344	Masern im Liquor IgG, IgM°	354
Liquorproteine	345	Masern RNA-PCR°	354
Lithium (Medikamentenspiegel)	345	Masern-IgG-Ak	354
Lithium (Spurenelement)°	346	Masern-IgM-Ak	354
LK Liver-Kidney-Mikrosomen		Materialien aus dem	
(LKM) Ak	346	Augenbereich	355
Lorazepam°	346	Materialien aus dem	
LSD°	347	Gastrointestinaltrakt (Stuhl,	
		Magenbiopsien)	356

Materialien aus dem Genitaltrakt	357	Modifizierte Ratio bei	
Materialien aus dem Hals-Nasen-		Niereninsuffizienz	379
Ohren-Bereich	358	Molekulargenetische Analyse des	
Materialien aus dem unteren		GCDH-Gens Glutaryl-CoA-	
Respirationstrakt	361	Dehydrogenase°	380
Materialien aus dem		Mononukleose-Schnelltest	380
Zentralnervensystem (ZNS)	364	Monozyten	381
Medikamenten-induzierter		Monozyten absolut	381
systemischer LE	364	Morphin	382
Melisse	364	Morphin	382
Melperon im Serum°	365	MPO-AK (Myeloperoxidase-	
Metamizol°	365	Autoantikörper)	382
Metanephrin	366	MTHFR-Genmutation°	383
Metanephrin im Urin°	367	Mucor spp.	383
Methadon° im Haar	367	Mumps im Liquor IgG, IgM°	384
Methadon° im Serum	367	Mumps-IgG-Ak	383
Methadon° im Urin	368	Mumps-IgM-Ak	384
Methadon° im Urin und Serum	368	Mumps-RNA-PCR°	384
Methionin°	368	Mycoplasma hominis, Ureaplasma	
Methotrexat (MTX)°	368	urealyticum	384
Methsuximid als N-Desmethyl-		Mycoplasma pneumoniae PCR°	385
Methsuximid	369	Mycoplasma pneumoniae-IgG-Ak	385
Methylen-Tetrahydrofolat°	369	Mycoplasma pneumoniae-IgM-Ak	385
Methylhippursäuren gesamt		Myelin Ak°	385
(ortho-, meta-, para)°	369	Myeloperoxidase-Index	385
Methylhistamin im Urin°	370	Mykobakterien-/Tuberkulose-	
Methylmalonsäure°	370	Diagnostik°	386
Methylphenidat° (Ritalin®)	371	Mykoplasmen / Ureaplasmen	392
Methämoglobin°	368	Mykoplasmen / Ureaplasmen STD	
Metoclopramidtest-Prolaktin-		(sexual transmitted disease)	392
Stimulationstest	371	Myoglobin	392
Mi-2-Autoantikörper°	371	Myoglobin im Urin°	393
Mianserin°	371	Myositis°	393
Midazolam°	372		
Mikroalbumin im Urin	372	N	
mikrozytär/hypochrom-Quotient	372	Nachweis von Würmern und	
Mikrozytäre Erythrozyten	372	Protozoen im Stuhl	393
Milnacipran	373	Nagelspäne/Hautgeschabsel -	
Mirtazapin	374	Dermatophyten°	393
Mischallergene	375	Nahrungsmittelscreen fx5	394
Mittlere zelluläre		Naproxen°	394
Hämoglobinkonzentration	379	Natrium im Serum	394
mittleres Thrombozytenvolumen	376	Natrium im Urin	394
Mittleres zelluläres Hämoglobin	377	Nebennierenrinden-Ak°	395
Mittleres Zellvolumen	378		
Moclobemid	379		

Neisseria gonorrhoeae,		Osteocalcin°	410
Gonokokken	395	Oxalsäure°	412
Neisseria gonorrhoeae-DNA-PCR	395	Oxcarbazepin	413
Neisseria meningitidis,		Oxidative Belastung°	413
Meningokokken	395	Oxyuren (Enterobius vermicularis)	414
Neopterin°	395		
Neutrophile absolut	396	P	
Neutrophile/Segmentkernige	396	p-ANCA Anti-Neutrophilen	
Nickel im Serum°	397	Cytoplasmatische Antikörper	414
Nickel im Urin°	397	Paliperidon	414
Nitrazepam°	397	Pankreas (Azinuszellen) Ak°	414
Nitrit im Urin	397	Pankreas-Elastase	415
Noradrenalin im Urin°	397	Paracetamol-Phenacetin	415
Norcocain im Haar (GCMS)°	398	Parainfluenza 1-3 IgA-Ak°	415
Normetanephrin	399	Parainfluenza 1-3 IgG-Ak°	416
Normetanephrin im Urin°	400	Parasitologische Untersuchung	417
Noroviren Antigen	400	Parathormon (intakt)	418
Nortilidin in Urin	400	Paratyphus	418
Nortrimipramin	400	Parietalzellen-Ak	418
Nortriptylin	401	Paroxetin°	419
NSE° Neuronspezifische Enolase	401	Partielle Thromboplastinzeit PTT	419
		Parvovirus B 19 IgG Ak	419
O		Parvovirus B 19 IgM Ak	419
o-Desmethylvenlafaxin	402	Parvovirus-DNA-PCR°	420
Olanzapin	402	Pathogene Keime	420
Oligoklonale Banden (Liquor (L))°	403	PCB Nr. 138°	420
Oligoklonale Immunglobuline	404	PCB Nr. 153°	421
Omega-3 Fettsäuren	404	PCB Nr. 180°	421
Omega-3-Index	404	PCP Pentachlorphenol°	421
Omega-6 Fettsäuren	404	Pemphigus vulgaris	421
Opiate im Urin	404	Penicillin G	422
Opipramol°	405	Penicillin V	422
oraler Glucosetoleranztest oGTT		Penicillium chrysogenum	422
50g (Schwangere)	405	Pentachlorphenol i. Serum (PCP)	422
oraler Glucosetoleranztest oGTT		Perampanel im Serum	422
75g (nicht schwangere)	406	Perazin	422
oraler Glucosetoleranztest oGTT		Peritonealdialysat	423
75g (Schwangere)	407	Perphenazin	424
Organische Lösungsmittel°,		ph-Wert	428
Kohlenwasserstoffe,		Phenobarbital	424
Chlorkohlenwasserstoffe, Benzol,		Phenol°	425
Ethylbenzol, Toluol, Xylol, Styrol	407	Phenprocoumon	425
Ornithin°	407	Phenylalanin im Urin°	426
Osmolalität° in mosmol/kg H2O	408	Phenylalanin°	426
Ostase im Serum°	409	Phenytotin	427

Phosphat im Serum	427
Phosphat im Urin	428
Phosphat-Clearance	427
Phosphoethanolamin	428
Phospholipase-A2-Rez.-Ak (ELISA)°	428
Phospholipase-A2-Rez.-Ak (IFT)°	428
Phosphoserin	428
Phytansäure°	429
Picorna-Viren-Ak°	429
Piracetam	429
Placenta-AP	430
Plasminogen-Aktivator- Inhibitor°	
PAI	431
Plasminogen°	430
Pneumocystis jirovecii°	431
Pneumokokken	432
Pneumokokken IgG-Ak°	432
Poliomyelitis (Kinderlähmung),	
Polio-Virus-Ak Typ 1/3	432
Polychlorierte Biphenyle°	433
Polyneuropathie	433
Polyoma BK Virus-DNA quant.°	434
Porphobilinogen° (PBG)	434
Porphyrin-Fractionen°	435
Porphyrine im Stuhl°	434
Porphyrine, gesamt	434
PR3-AK (Proteinase 3-	
Autoantikörper)	435
Pregabalin im Serum	435
Pregnantriol°	436
Pregnenolon°	436
Primidon mit Phenobarbital als	
Metabolit	436
Probe II°: Kupfer-Bestimmung,	
Quecksilber-Bestimmung	437
proBNB NT-proBNP	437
Procalcitonin	438
Progesteron	442
proGRP Tumormarker°	443
Proinsulin, intakt°	443
Prokollag Typ I N-Propeptid°	444
Prokollagen-III-Peptid° P-III-P	443
Prolaktin	446
Prolin°	447
Propafenon°	447
Protein C	447

Protein Z°	447
Prothipendyl	448
Prothrom.-Polymorphismus°	449
Prothrombinfragment F1+2°	448
Protoporphyrin° erythrocytär	449
Protriptylin	449
PSA Prostataspezifisches Antigen	450
PTH-related-Peptid°	451
Punktate aus primär sterilen	
Bereichen	451
Puumala-IgG /-IgM-Ak PUUV	452
Pyridinolin°	452
Pyruvatkinase°	453
Pyruvat°	452

Q

Q-Fieber IgG AK (Coxiella burnetii	
- Phase I)°	453
Q-Fieber IgG AK (Coxiella burnetii -	
Phase II)°	453
Q-Fieber IgM AK (Coxiella burnetii	
- Phase I)°	454
Q-Fieber IgM AK (Coxiella burnetii	
- Phase II)°	454
Quantiferon	455
Quecksilber°	456
Quetiapin	456
Quotient (κ/λ) i.S.	456

R

RAST-Haselholz	457
reaktive Arthritis (REA)	457
Reduktase-Mangel	457
Reiberschema ohne Oligoklonale	
Banden°	458
Renin	460
Respiratory-Syncytial Virus (RSV)	
RT-PCR	461
Retikulozyten	461
Retikulozyten-Hb (CHR)	462
Retikulozyten-Produktions-Index	462
Retinolbindendes Protein°	462
Reverse T3°	462
Rheumafaktor RF, quantitativ	463
Rheumatoide Arthritis	463

Ri-Anna-Typ2- Ak im Liquor°	463	Selen im Serum	471
Ri-ANNA-Typ2-Ak°	463	Selen im Urin	471
Ribonukleinsäure (RNA)	463	Seoul-IgG /-IgM-Ak	472
Ribosomen Ak	463	Serin°	472
Rickettsia typhi IgG-Ak IFT°	464	Serotonin im Serum	472
Rickettsien-Ak°	464	Sertralin	473
Rifampicin im Serum	464	sFlt-1/PIGF-Quotient°	473
Risperidon	464	SHBG Sexualhormonbindendes	
Ritalinsäure im Serum°	465	Globulin	474
Rotavirus-Direktnachweis	465	Shigellen spp.	475
Rotigotin	466	Silicium°	476
RSV-Ak°	466	Sin Nombre-IgG /-IgM-Ak	476
Rufinamid°	467	Sirolimus Rapamycin	477
Röteln im Liquor IgG, IgM°	466	Skelettmuskel-Ak°	477
Röteln-Avidität	465	SLA Leber-Pankreas Ag - Ak	477
Röteln-IgG-Ak	465	Somatomedin C / IGF-1	477
Röteln-IgM-Ak	466	Speicheldrüsendangepithel Ak°	477
		Spermatozoen-Ak°	477
S		Spermien-Ak°	478
S100 - Tumormarker°	467	Spezifisches Gewicht	478
Saccharomyces cerevisiae-Ak (IgA)		SS-A / Ro Antikörper	478
Serum°	468	SS-B /La Antikörper	478
Saccharomyces cerevisiae-Ak (IgG)		Stachelzellendesmosomen Ak°	478
Serum°	468	Staphylokokken	478
Salicylsäure°	468	Steinanalyse°	479
Salmonellen Nachweis im Stuhl	468	Sterilitätskontrolle	479
Salmonellen-Ak°	468	STH-Somatotropes Hormon	
Sandfliegen-IgG /-IgM-Ak	469	Wachstumshormon/HGH	479
Sandfliegenfieber Virus-Ak,		Stiripentol	479
Serotyp Toskana	468	Streptokokken	479
Sarcosin°	469	Streptokokken-Ak	479
SARS-CoV-2 S (Spike) IgG/IgM AK		Styrol°	480
(ECLIA, Roche)	470	Sulfasalazin als Sulfapyridin	480
SARS-CoV-2-RNA PCR	469	Sulpirid	480
Saure Phosphatase	470	Sultiam	480
Saure Prostataphosphatase	470	symmetrisches Dimethylarginin°	481
SCC - Tumormarker°, Squamosus			
cell carcinoma antigen	470	T	
Schilddrüsen-Ak, Thyreoglobulin-		T3 Trijodthyronin	481
Ak, TPO-Ak (Anti-Thyreoidale		T3-Ak, T4-Ak°	481
Peroxidase), T3-Ak, T4-Ak, TSH-		T4 Thyroxin	481
Rezeptoren-Ak (TRAK)	470	Tacrolimus (FK 506)	482
Schwangerschaftsnachweis im		TAK Thyreoglobulin-Ak	483
Urin (β Beta -HCG im Urin)	471	Tau-Protein°	483
Scl-70 Ak	471	Taurin°	483

554	Index
-----	-------

V

Valin°	512
Valproinsäure	513
Vancomycin°	513
Vanillinmandelsäure VMS im Urin°	513
Varizella-Zoster-DNA PCR°	513
Varizella-Zoster-IgA-Ak	514
Varizella-Zoster-IgG-Ak	514
Varizella-Zoster-IgG-Ak i. Liquor°	514
Varizella-Zoster-IgM-Ak	514
Varizella-Zoster-IgM-Ak i. Liquor°	515
Vasoakt. intest. Polypeptid	515
VDRL - CMF	515
Venlafaxin	516
Vigabatrin°	517
Virale Arthritiden	517
Virologische Untersuchung	517
Vitamin A Retinol	518
Vitamin B1 Thiaminpyrophosphat	519
Vitamin B12 Cobalamin	518
Vitamin B2 FAD (Flavinadenindinukleotid)	520
Vitamin B3 (Nicotinamid)°	520
Vitamin B5 (Pantothersäure)°	520
Vitamin B6 Pyridoxal-5'-phosphat	521
Vitamin C Ascorbinsäure	521
Vitamin E Tocopherol	522
Vitamin K1°	522
Vitamin K2 (MK-4)°	522
Vitamin K2 (MK-7)°	523
von-Willebrand-Diagnostik°	524

W

Wegenersche Granulomatose	525
Wurmerkrankungen	525
Würmer, Wurmeier und Parasiten	526

X

Xylose Belastung als Serumtest	526
Xylose Belastung°	526

Y

Yersinia spp.	527
Yersinia-Blot-IgA-Ak	526
Yersinia-Blot-IgG-Ak	527
Yersinia-IgA-Ak	527
Yersinia-IgG-Ak	527
Yersinia-IgM°	527
Yo-Antikörper	528
Yo-Antikörper im Liquor	528

Z

Zelldifferenzierung	528
Zellkern-Ak/ANF/ANA	528
Zellzahl (Erythrozyten) im Liquor	528
Zellzahl (Leukozyten) im Liquor	528
Zellzahl im Liquor	528
Zentromere Ak	529
Zielaufträge	529
Zika-Virus IgG IIFT°	529
Zika-Virus IgM IIFT°	529
Zink im Serum	529
Zink im Urin	529
Zinn°	530
Zolpidem	530
Zonisamid	530
Zonulin°	531
Zopiclon°	532
Zuclopenthixol°	532
Zytoplasma IgG Blot°	532

Ö

Östradiol	411
Östron E1°	412

α

α Alpha Amylase im Serum	535
α Alpha Hexachlorcyclohexan°	535
α Alpha 1-Antitrypsin	533
α Alpha 1-Antitrypsin-Phänotyp°	533
α Alpha 1-Fetoprotein AFP	533
α Alpha 1-Glykoprotein, saures° (Urosomucoid)	533

α Alpha 1-Mikroglobulin im Urin pro Liter	534
α Alpha 1-Mikroglobulin im Urin/ die	534
α Alpha 1-Mikroglobulin°	534
α Alpha 2-Makroglobulin°	535
α Alpha Amylase im Urin	535
α Alpha Hydroxybutyrat- Dehydrogenase	536
α Alpha-1-Globulin	533
α Alpha-2-Globulin	534

β

β Beta -1-Globulin	536
β Beta -2-Glykoprotein IgG/IgM°	536
β Beta -Alanin°	537
β Beta 2-Globulin	536

β Beta Interferon°	538
β Beta -Amyloid°	537
β Beta -Carotin°	537
β Beta -CrossLaps°	537
β Beta -HCG Humanes Choriongonadotropin	538
β Beta -Hexachlorcyclohexan°	538
β Beta 2-Mikroglobulin	536
β Beta 2-Mikroglobulin im Urin	537

γ

γ-Hexachlorcyclohexan°	538
------------------------	-----

δ

δ-Aminolävulinsäure°	539
----------------------	-----